

nächste Mitteilung am 05.04.05

**Falscher Mehltau an Winterzwiebeln:** Durch die milde Witterung sowie Nebel oder Taubildung könnten an Winterzwiebeln jetzt die ersten Befallssymptome des Falschen Mehltaus auftreten. Kontrollieren Sie Ihre Kulturen. Typisch für den Falschen Mehltau ist ein grau-violetter, samtartiger Sporenrasen auf den Röhrenblättern.

	Schädling / Krankheit	Hinweis	Aktivitäten Stand		Pflanzenschutzempfehlungen für die genannten Kulturen		
			vor 7 Tagen	aktuell	HB Gemüse 2005	Homepage FAW*	Merkblätter FiBL**
	Blumen- und Kopfkohle / Chinakohl / Kohlrabi						
	Gefleckter Kohltriebrüssler ( <i>Ceutorhynchus quadridens</i> )		↗	+	S. 108 / 116 / 124	Kapitel 1-3	-
	Blumen- und Kopfkohle / Chinakohl / Kohlrabi / Rettich						
	Kohlflye ( <i>Delia radicum</i> )	1		-	S. 108 / 116 / 124 / 131	Kapitel 1-3, 5	S.12 (9)
	Lauch / Zwiebeln						
	Lauchmotte ( <i>Acrolepiopsis assectella</i> )	2	↗	+	S. 232 / 236	Kapitel 32, 33	S. 23 (3)

Botanisches Verzeichnis auf Seite 30 Handbuch Gemüse 2005.

Wegen lokalen Unterschieden bezüglich Auftreten und Intensität ersetzt diese Übersicht die Feldkontrolle nicht.

### Tabellenlegende:

Kein Problem: -	Zunehmend: ↗	Abnehmend: ↘	Vereinzelt: +	Vorhanden: ++	Probleme: +++
--------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

**BIO:** kennzeichnet Informationen, die speziell den Biologischen Anbau betreffen

\*Homepage FAW: <http://www.mitteilungen.faw.ch>

\*\*Homepage FiBL: <http://www.fibl.org/shop/show.php?art=1284>

- Kohlflye:** Im Kanton Zürich, Standort Wädenswil wurden in der letzten Woche in der Gelbschale noch keine Kohlflyen gefangen.
- Lauchmotte:** Der Hauptflug der 1. Generation hat in Wädenswil begonnen. Werden die Vliese vom Frühlauch heruntergenommen, so sollten zumindest im Bioanbau umgehend Netzabdeckungen angebracht werden.

Beiträge zu dieser Mitteilung lieferte folgende Person: S. Schnieper (Fachstelle Gemüse u. Beeren, AG)