

Aprikosensortenprüfung | Dezember 2012



Aprikosensorten- prüfung

Sorteneigenschaften – Baum + Blüte

Groupe de Travail Technique Abricots du Valais

Baum					Blüte					Baum- und Blüteneigenschaften	globale Sortenbeurteilung mit Erfahrung im Wallis Erfahrung im Wallis, aber mit Einschränkungen keine oder wenig Erfahrung im Wallis; abwarten
Sorten	Wuchsstärke	Astabgang	Ver- zweigungs- intensität	Basitonie	früher Ertrags- eintritt	späte Blütezeit	Blüh- intensität	Selbst- fruchtbar	Selbst- unfruchtbar		
Early Blush	6	8	7	7	7	4	8		x	Winterfrostopfindlichkeit	Gute Qualität für Reifezeit; schlechte Haltbarkeit
Wonder Cot	7	8	5	4	8	3	7		x		Frühe Reifezeit, Aussehen und Haltbarkeit
Magic Cot	8	4	7	6	7	3	6		x		Qualität und Fruchtgrösse
Chrisgold	7	6	7	7	8	4	8		x		Qualität durch gute Ausdünnung und Ernte fördern
Lilly Cot	7	7	6		8	4	5		x		Qualität und Lagerung
Flopria	7	5	7	5	8	2	8	x			Qualität, Haltbarkeit und Selbstfruchtbarkeit
Tom Cot	6	7	7	7	8	2	8	x			Selbstfruchtbarkeit; streng schneiden und ausdünnen
Robada	5	7	8	8	7	5	8		x		Empfindliche Epidermis
Orangered	8	7	8	7	6	5	7		x	auf Fremdbefruchtung angewiesen !	Nur für bevorzugte Lage; unregelmässige Produktion
Latica	8	5	8	4	7	6	7		x		Aussehen, Bakterienbrandtoleranz zu bestätigen
ACW 4353	7	6	6	8	7	6	7		x		Aussehen, Blütenmoniliatoleranz zu bestätigen
Big Red	7	5	7	5	7	3	6		x		Aussehen, Qualität und Haltbarkeit
Perle Cot	5	6	7		6	7	6		x		Aussehen und Qualität
Bergeval	6	5	6	7	6	7	5	x			Aussehen, Qualität und Selbstfruchtbarkeit
ASFCOT 0405	7	7	8	6	7	5	7		x		Qualität und Fruchtgrösse
Goldrich	7	4	7	6	7	2	7		x		Qualität nur bei guter Ausdünnung und Ernte
Sunny Cot	7	7	7	6	7	5	7		x		Aussehen, Haltbarkeit, Platzempfindlichkeit z. bestätigen
Kioto	3	8	8	8	8	9	8	x		Steinobststerben	Beachten von Schnitt, Ausdünnung und Ernte
ASFCOT 0409	7	7	8	7	7	5	7	x			Qualität und Selbstfruchtbarkeit
Bergarouge	7	6	5	4	7	2	7		x	auf Fremdbefruchtung angewiesen !	Nur für bevorzugte Lagen; unregelmässige Produktion
Candide	8	4	7	4	7	7	7	x			Qualität, Selbstfruchtbarkeit, Robustheit
Vertige	7	7	5	5	6	7	5	x		erhöhtes Astbruchrisiko	Qualität, Selbstfruchtbarkeit
Lady Cot	7	5	7	6	7	7	7	x			Qualität, Haltbarkeit, Platzempfindlichkeit z. bestätigen
Luizet	6	6	7	6	5	6	5	x			Gut angepasst im Wallis; schlechte Haltbarkeit
Bergeron	6	4	6	4	5	7	7	x			Stark ausdünnen
Harval	7	8	7	7	4	3	6	x		schlechte Affinität mit Myrobalane	Früh ausdünnen, nicht zu früh pflücken
Harogem	5	7	4	7	5	7	5	x		ESFY-tolerant z. bestätigen	Nicht zu früh pflücken
Tardif de Tain	7	3	4	4	5	8	6	x			Für bevorzugte Lagen (fruchtbare Böden)
Faralia	7	7	7	6	7	7	7	x			ESFY-Empfindlichkeit z. bestätigen
Tardif de Valence	7	5	5	5	7	8	7	x			Sehr gutes agronomisches Potential
Frisson	7	2	3	4	7	8	8	x			Qualität, Selbstfruchtbarkeit, Robustheit
Farely	7	5	7	6	7	6	7		x		Späte Reifezeit, Haltbarkeit
Farbaly	7	4	6	6	8	8	8	x			Späte Reifezeit, Haltbarkeit, Selbstfruchtbarkeit

Hinweis : steigende Intensitätsskala von 1 bis 9 für jedes Kriterium; entspricht objektiven Daten

Sorteneigenschaften - Frucht

Groupe de Travail Technique Abricots du Valais

Sorten mit Erfahrung im Wallis
Sorten mit Erfahrung im Wallis, aber mit Einschränkungen
mögliche zukünftige Sorten, keine oder wenig Erfahrung im Wallis

Sorten	Fruchtbeschreibung						geschmackliche Qualität					Lagerung	besondere Mängel auf Früchten
	Erntezeit (Wallis Tal)	Fruchtfall- risiko	Grösse	Grundfarbe	Deckfarbe	Attraktivität	Aroma	Festigkeit	Saftigkeit	Säure	Zucker	Lager- tauglichkeit	
Early Blush	20. Juni	7	5	7	6	8	7	4	7	7	7	3	
Wonder Cot	20. Juni	5	5	6	7	7	6	7	7	8	4	4	
Magic Cot	30. Juni	4	7	6	7	7	7	6	7	7	5	5	
Chrisgold	30. Juni	2	7	7	6	8	4	7	7	7	5	8	
Lilly Cot	05. Juli	3	7	6	6	6	6	7	7	7	5	7	
Flopria	05. Juli	2	6	7	7	7	7	8	7	8	6	7	
Tom Cot	05. Juli	2	4	7	2	7	7	7	7	8	8	8	
Robada	05. Juli	5	7	8	8	8	5	8	7	8	6	7	empfindliche Epidermis
Orangered	05. Juli	4	6	8	7	8	8	7	7	3	6	4	empfindliche Epidermis, besonders bei schwachem Behang
Latica	05. Juli	2	6	8	8	8	6	7	8	6	5	7	
ACW 4353	05. Juli	2	7	7	7	7	8	6	7	6	7	6	
Big Red	10. Juli	3	5	8	9	7	8	7	7	8	6	6	
Perle Cot	10. Juli	3	6	8	9	8	7	7	8	6	8	7	
Bergeval	10. Juli	3	6	7	8	7	8	7	7	6	7	7	
ASFCOT 0405	15. Juli	4	8	5	7	6	7	6	8	6	8	6	
Goldrich	15. Juli	2	9	7	2	7	6	8	7	8	8	9	Mehltauanfälligkeit, schwarze Fruchthautflecken
Sunny Cot	15. Juli	3	7	6	7	7	7	6	7		7	6	
Kioto	15. Juli	3	7	7	9	8	6	7	7	8	7	8	Risiko von Fruchtrissen an der Stielgrube
ASFCOT 0409	20. Juli	3	7	7	7	7	7	7	8	7	8	7	
Bergarouge	20. Juli	5	7	6	8	7	8	6	7	4	8	4	empfindliche Früchte, besonders bei schwachem Behang
Candide	20. Juli	3	6	6	3	5	7	5	7	4	8	5	
Vertige	25. Juli	3	7	4	4	5	9	6	8	5	8	7	
Lady Cot	25. Juli	3	7	7	6	6	6	7	7	7	8	7	
Luizet	01. August	7	6	6	6	6	8	6	6	7	7	4	
Bergeron	05. August	5	6	4	6	6	8	7	6	7	5	7	Fleischbräune, besonders bei Hitze
Harval	05. August	2	5	7	5	8	7	7	5	7	8	9	
Harogem	05. August	2	6	7	7	7	8	8	5	6	8	8	
Tardif de Tain	05. August	2	6	4	6	5	6	7	5	8	7	8	nicht steinlöslich
Faralia	10. August	2	7	5	7	6	7	7	7	8	7	7	
Tardif de Valence	10. August	3	7	4	6	6	7	7	7	8	7	8	Fruchtfall bei der Ernte
Frisson	15. August	2	6	4	6	7	8	7	7	8	8	7	
Farely	20. August	2	6	6	8	7	7	8	7	6	7	7	
Farbaly	30. August	2	8	7	8	8	7	8	7	7	8	7	

Hinweis : steigende Intensitätsskala von 1 bis 9 für jedes Kriterium; entspricht objektive Daten



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de
l'économie DFE
Station de recherche
Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Impressum

Herausgeber	Fachkommission für Obstsortenprüfung– Groupe de Travail Technique Abricots du Valais
-------------	---
