

2015

Pflanzenschutzmittelliste

Für die in den Beerenkulturen bewilligten

Herbizide

Fungizide

Insektizide, Akarizide und Molluskizide

Für SUISSE GARANTIE-Produktion

⇒ unbedingt Einschränkungen der SAIO beachten!

Schweizer Obstverband
Fruit-Union Suisse
Associazione Svizzera Frutta
www.swissfruit.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

Index

Lebende Organismen	2
Herbizide	3, 4
Fungizide	5, 6
Insektizide	7, 8
Übersichtstabelle Erdbeere / Himbeere	9, 10
Übersichtstabelle Brombeere / <i>Ribes</i> -Arten	11, 12
Übersichtstabelle Heidelbeere / Nebenwirkungen	13, 14

Neuigkeiten

Fungizide: 5

- Signum (Boscalid, Pyraclostrobin) – Himbeere (Freiland): Graufäule, 0.15%, 2 Wochen Wartefrist, max. 2 Behandlungen pro Jahr und Parzelle
- Cydeli Top (Difenoconazole, Cyflufenamid) – Erdbeere: Anthraknose, echter Mehltau, 0.1%, 3 Tage Wartefrist, max. 2 Behandlungen pro Jahr und Parzelle

Wird im 2015 noch nicht vermarktet !

- Moon Sensation (Trifloxystrobin, Fluopyram) – Erdbeere: Anthraknose, Blattfleckenkrankheiten, echter Mehltau, Graufäule, Lederfäule, 0.08%, 2 Wochen Wartefrist, max. 2 Behandlungen pro Jahr und Parzelle

Wird im 2015 noch nicht vermarktet, Vermarktung im 2016 ungewiss !

Insektizide und Akarizide: 7

- Envidor (Spirodiclofen) : Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr
 - Rubus Arten : Spinnmilben, Brombeermilbe, Himbeerblattmilbe; 0.04% , 0.4 l/ha ; Anwendung: Nach der Ernte.
 - Ribes : Spinnmilben ; 0.04% , 0.4 l/ha ; Wartefrist: 3 Wochen.
- Acramite 480 SC (Bifenazate)
 - Erdbeeren: Spinnmilben ; 0.025% ; 0.25l/ha ; Wartefrist: 3 Tage
- Majestik (Maltodextrine)
 - Erdbeeren : Spinnmilben ; 2,5% ; 25l/ha ; Wartefrist: 3 Tage
- Fresa / Berry Protect
 - Erdbeeren, Rubus Arten, Ribes Arten, Heidelbeere : Blattläuse ; Eine Dosis für 200m² ; mindestens 2 Freisetzen im Abstand von 21 Tage

Re-Evaluation gewisser Wirkstoffe

<http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/01867/index.html?lang=de>

Der oben aufgeführte Link verweist auf eine Internetseite, welche Angaben zu Änderungen betreffend den Distanzen und Vorsichtsmassnahmen aufführt.

Zu bemerken sind :

Cypermethrin : Rückzug der Bewilligung in Himbeere

Deltamethrin : Rückzug der Produkte, Aufbrauchfrist: 31.12.2016

Liste der in der Beerenkultur bewilligten lebende Organismen 2015

			Schadenerreger (Hauptschädlinge)															
			Erdbeeren						Himbeeren/Brombeeren					Johannis-, Stachel-, Heidelbeeren, Holunder				
Voll Wirkung: ● Teil Wirkung: ♦		Dosierung	Spinnmilben	Wickler, Raupen	Schnecken	Blattläuse	Thrips	Dickmaulrüssler	Spinnmilben	Wickler, Raupen	Thrips	Blattläuse	Dickmaulrüssler	Spinnmilben	Wickler, Raupen	Dickmaulrüssler	Blattläuse	Thrips
Lebende Organismen																		
Amblyseius cucumeris	Andermatt, Omya, LeuGygax	50-200 org/m ²	♦				●		♦		●			♦				●
Amblyseius californicus im Gewächshäuser	Andermatt,	1-6 /m ²	●						●					●				
Aphidius colemani im Gewächshäuser	Andermatt, Omya,	0.5-5 colemani /m ²				●												
Aphidoletes aphidimyza	Andermatt, Omya	0.5 Aphidoletes/m ²				●						●					●	
Feltiella acarisuga im Gewächshäuser	Andermatt, Omya	250 Feltiella pro Befallsherd	●						●									
Heterorhabditis bacteriophora, Photorabdus luminescens	Nematop, Larvanem	500000 Nem/m ²						●					●			●		
Heterorhabditis megidis, Photorabdus luminescens	Dickmaulrüssler-Nematoden	40 000 Nem./pfl.						●										
Orius laevigatus	Omya	0.5 - 5 Orius /m ²	♦				●		♦		●			♦				●
Orius majusculus	Omya	0.5 - 5 Orius /m ²	♦				●		♦		●			♦				●
Phasmarhabditis hermaphrodita	Coop Oecoplan Biocontrol, Bioslug, Maag BioNematoden	300'000-500'000 /m ²			●													
Phytoseiulus persimilis	Andermatt Biocontrol, Leu Gygax	5-10/m ²	●						●					●				
Steinernema carpocapsae	nemoV, Sanoplant Aelchen, Nematop Käferstop Fenaco	40000 Nem./pfl 1 Falle/4m ²						●										
Fresa-, Berryprotect	Andermatt	1 tubus/200m ²				●						●					●	
Bakterien Präparate																		
Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Baktur,Delfin	0.05–0.1		●						●					●			
Bacillus thuringiensis var. aizawai	Xen Tari	0.05–0.1		●														
Metarhiziumanisopliae	Met52	500g/m ²						●					●			●		

Liste der in den Beerenkulturen bewilligten Herbizide 2015

[illegible]

Liste der in den Beerenkulturen bewilligten Fungizide 2015

Agroscope (Vincent Michel)

[illegible]

Liste der in der Beerenkulturen bewilligten Insektizide, Akarizide und Molluskizide 2015

Agroscope (Catherine Baroffio)

[illegible]

Erdbeeren: Fungizide 2015

Nach der Ernte beziehungsweise
nach der Neupflanzung

Erste neue Blätter

Erste Blütenanlagen

Beginn Blüte

Ende Blüte

Beginn
Ernte


Produkte <i>ohne</i> Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)	
Aliette, Aliette WG: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, max. 4 Behandlungen	
Ridomil Gold: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, max. 2 Behandlungen	
Kupfer: pilzliche Blattfleckenkrankheit, <u>Teilwirkung</u> : Eckige Blattfleckenkrankheit	
	Thiram: <u>Teilwirkung</u> : Blattfleckenkrankheit Schwarze Fruchtfäule
SSH Systhane C WG: Echter Mehltau, pilzliche Blattfleckenkrankheiten, max. 4 Behandlungen	
Schwefel: Echter Mehltau	

Produkte <i>mit</i> Wartefrist	
Zu beachten : Die Anzahl Behandlungen bezieht sich immer auf eine Wirkstoffgruppe Beispiel 1: Pro Parzelle und Saison dürfen maximal 3 x Strobilurine verwendet werden, z. Bsp. 3 x Amistar oder 3 x Flint oder 3 x Stroby, oder 2 x Flint und 1 x Stroby. Beispiel 2: Pro Parzelle und Saison dürfen die Produkte, die zur Gruppe der SSH gehören maximal 4 x angewendet werden, <u>z. Bsp.</u> 2 x Slick und 2 x Systane Viti oder 1 x Systhane C WG und 3 x Topas vino.	Aliette WG: Lederfäule, max. 3 Behandlungen
	Wartefrist 4 Wochen
	SSH Slick, Difcor 250 EC, Systhane Viti, Topas vino: Echter Mehltau, max. 4 Behandlungen
	Wartefrist 3 Wochen
	Legend: Echter Mehltau, max. 4 Behandlungen
	Wartefrist 2 Wochen
	Strobilurine Flint, Tega: Echter Mehltau, pilzliche Blattfleckenkrankheiten, <u>Teilwirkung</u> : Graufäule, max. 3 Behandlungen Amistar: Echter Mehltau, <u>Teilwirkung</u> : Graufäule, max. 3 Beh., Stroby: Echter Mehltau, max. 3 Behandlungen
	SDHI Moon Privilege: Graufäule, max. 2 Behandlungen
	Rovral, Baldo: Graufäule, max. 1 Behandlung
	Wartefrist 2 Wochen
	Frupica, Scala, Switch, Pyrus 400: Graufäule Frupica, Scala, Pyrus max. 1 x; Switch max. 2 x
Teldor: Graufäule, max. 2 x., Wartefrist: 1 Woche	
Nimrod: Echter Mehltau, Wartefrist: 1 Woche	
Armicarb: Echter Mehltau, Wartefrist: 3 Tage	
Vacciplant: Echter Mehltau, <u>Teilwirkung</u> : Graufäule (Graufäule: max. 4 Behandlungen), Wartefrist: 0 Tage	

Erdbeere: Insektizide/Akarizide 2015

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winter-ruhe	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
Ende August- Anfangs September Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen),			Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)						
Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen) Movento Arbo: Spinnmilben, Erdbeermilbe			Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen) Movento Arbo: Spinnmilben, Erdbeermilbe						
				Produkte mit Wartefrist					
Vertimec, Zenar: Erdbeermilbe, Spinnmilben (alle Stadien) Magister: Spinnmilben (Larven, Nymph., Ad.) Kiron: Spinnmilben, Erdbeermilbe			Vertimec, Zenar: Erdbeermilbe, Spinnmilben (alle Stadien) Magister: Spinnmilben (Larven, Nymph., Ad.) Kiron: Spinnmilben, Erdbeermilbe						3 Wochen
			Pirimicarb 50 WG, Pirimor, Parexan N: Blattläuse Pyrethrum FS: Blattläuse, Raupen						
			Alanto: Blattläuse, Blütenstecher						
			Pyrinex, Pyrethrinoides: Thrips, Blütenstecher						
Apollo, Arabella, Envidor, Magister, Majestik, Milbecknock, Movento arbo, Kiron, Nissostar, Trévi, Vertimec, Zenar: um Resistenzproblemen vorzubeugen, maximal 1 Behandlung pro Parzelle, Jahr und Wirkstoffgruppe					Fettsäuren: Spinnmilben und Blattläuse				1 Woche
					Milbeknock: Spinnmilben, Erdbeermilbe				
				Arabella, Majestik: Spinnmilben (Eier, Larven)					3 Tagen
					Audienz, Bonga: Thrips				


Himbeere: Fungizide 2015



Himbeere: Insektizide/Akarizide 2015

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
	Paraffinöl, Rapsöl (nur Schildlaus): Spinnmilben, Schildlaus, Raupen								Bis zum Austrieb
		Pyrinex: Blütenstecher, Himbeerkäfer							
		Applaud: Zikaden							
Ende August- Anfangs September Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)		Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)							
Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)		Milbeknock: Spinnmilben, Himbeerblattmilben							
Envidor: Spinnmilben, Himbeerblattmilben									
Produkte mit Wartefrist									
		Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)							
		Pirimicarb 50 WG, Pirimor: Blattläuse Parexan N, Pyrethrum FS: Blattläuse, Raupen							
		Alanto: Blattläuse, Blütenstecher, Himbeerkäfer							3 Wochen
		Difuse 48 SC, Dimilin SC: Himbeerkäfer							
		Synthetische Pyrethroide (nicht bewilligt in IP): Blütenstecher, Himbeerkäfer							
Apollo, Envidor, Magister, Matarcar, Milbecknock, Kiron, Nissostar, Trévi, Zenar: um Resistenzproblemen vorzubeugen, maximal 1 Behandlung pro Parzelle, Jahr und Wirkstoffgruppe					Acides gras: Spinnmilben und Blattläuse				1 Woche
					Audienz, Bonga: Thrips				

Brombeere: Fungizide 2015



Brombeere: Insektizide/Akarizide 2015

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
	Paraffinöl, Rapsöl (nur Schildlaus): Spinnmilben, Schildlaus, Raupen								Bis zum Austrieb
		Netzschwefel: Brombeermilbe							
Ende August- Anfangs September Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)		Applaud: Zwergzikaden							
Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)		Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)							
Envidor: Spinnmilben, Himbeerblattmilben		Milbeknock: Spinnmilben , Brombeermilbe							
Produkte mit Wartefrist									
		Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)							3 Wochen
		Pirimicarb 50 WG, Pirimor: Blattläuse Parexan N, Pyrethrum FS: Blattläuse, Raupen							
		Alanto: Blattläuse und Blütenstecher							
Apollo, Envidor, Magister, Milbecknock, Kiron, Nissostar, Trevi, Zenar: um Resistenzproblemen vorzubeugen, maximal 1 Behandlung pro Parzelle, Jahr und Wirkstoffgruppe					Fettsäuren: Blattläuse, Spinnmilben				1 Woche

Ribes-Arten (rote und schwarze Johannisbeere, Stachelbeere): Fungizide 2015

Nach der Ernte bzw. nach Neupflanzungen bzw. nach dem Austrieb	Erste neue Blätter Erste Blütenanlagen	Beginn Blüte	Ende Blüte	Beginn Ernte
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)				
Delan WG: Mondscheinigkeit				
	SSH Systhane C: Rost, Echter Mehltau, Blattfallkrankheit, <i>max. 4 Behandlungen</i> ; Slick: Echter Mehltau <i>max. 4 Behandlungen</i>			
	Héliosoufre: Echter Mehltau (nur Stachelbeere)			
Produkte mit Wartefrist				
	Fenicur: <u>Teilwirkung</u> : Rost, Echter Mehltau			
	SSH Systhane Viti, Topas vino: Echter Mehltau, <i>max. 4 Behandlungen</i>			
	Maneb: Rost			
Kupfer: Blattfallkrankheit				
Zu beachten: Die Mittel sind normalerweise für alle <i>Ribes</i> -Arten zugelassen oder auf Johannisbeeren in deutsch und "groseiller" auf französisch (welches zusammen rote und schwarze Johannisbeeren sowie Stachelbeeren umfasst). Achtung: Gewisse Produkte sind jedoch nur auf Stachelbeeren oder nur auf Johannisbeeren zugelassen.	Strobilurine Amistar: Mondscheinigkeit, echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i> Stroby: Mondscheinigkeit, <i>max. 3 Behandlungen</i>			
	Legend: Echter Mehltau (nur Stachelbeere), <i>max. 1 Behandlung</i>			
	Strobilurine Flint, Tega: Echter Mehltau (nur Stachelbeere), Mondscheinigkeit, <i>max. 3 Behandlungen</i>			
	Nimrod: Echter Mehltau (nur Stachelbeere)			
Zu beachten: Die Anzahl Behandlungen bezieht sich immer auf eine Wirkstoffgruppe , Siehe dazu die detaillierten Erläuterungen Im Schema „Erdbeeren – Fungizide“		Teldor: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>		
		Switch: Mondscheinigkeit (nur rote und schwarze Johannisbeeren), <i>max. 2 Behandlungen</i>		
Armcarb: Echter Mehltau (nur schwarze Johannisbeere)				

Wartefrist 3 Wochen

Wartefrist 3 Wochen

Wartefrist 2 Wochen


Wartefrist 1 Woche

Wartefrist: 3 Tage


Ribes-Arten: Johannis-, Stachelbeere : Insektizide/Akarizide 2015

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Früchte innerhalb der Grappen angesetzt	Beginn der Verfärbung der Früchte	Fruchtausreife	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
	Paraffinöl, Rapsöl (nur Schildlaus): Spinnmilben, Schildlaus, Raupen								Bis Austrieb
		Anfangs Mai Isonet-Z: Johannisbeerglasflügler							
Ende August- Anfangs September Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)		Bacillus thuringiensis (div. Präparate): Frostspanner							
Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)		Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)							
		Produkte mit Wartefrist							
		Zenar, Envidor: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)							3 Wochen
		Pirimicarb 50 WG, Pirimor: Blattläuse Parexan N, Pyrethrum FS: Blattläuse und Frostspanner							
		Alanto: Blattläuse, Napfschildläuse							
		Parexan N, Pyrethrum FS: Blattwespe							
Apollo, Envidor, Matarcar, Magister, Milbecknock, Kiron, Nissostar, Trevi, Zenar: um Resistenzproblemen vorzubeugen, maximal 1 Behandlung pro Parzelle, Jahr und Wirkstoffgruppe					Fettsäuren: Blattläuse				1 Woche


Heidelbeere: Fungizide 2015



Holunder : Fungizide 2015



Mini-Kiwi: Fungizide 2015



Heidelbeeren: Insektizide/Akarizide 2015

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Früchte innerhalb der Grappen angesetzt	Beginn der Verfärbung der Früchte	Fruchtausreife	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
	Paraffinöl, Rapsöl (nur Schildlaus): Spinnmilben, Schildlaus, Raupen								Bis Austrieb
Ende August- Anfangs September Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)		Apollo: Spinnmilben (Eier) Trevi, Matarcar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)							
Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)									
		Produkte mit Wartefrist							
		Zenar: Spinnmilben (alle Stadien) Magister, Kiron: Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulten)							3 Wochen
		Pirimicarb 50 WG, Pirimor: Blattläuse, Teilwirkung: Gemeine Kommaschildlaus Parexan N, Pyrethrum FS: Blattläuse und Raupen							
Apollo, Magister, Matarcar, Kiron, Trevi, Zenar: um Resistenzproblemen vorzubeugen, maximal 1 Behandlung pro Parzelle, Jahr und Wirkstoffgruppe					Fettsäuren: Blattläuse, Spinnmilben				1 Woche

Nebenwirkungen der empfohlenen Fungizide, Insektizide und Akarizide (2015)

Zusammengestellt von Ch. Linder und adaptiert zu den Beeren

Fungizide	Raubmilben	Raub-wanzen	Florfliegen	Marien-käfer	Schweb-fliegen	Parasito-ide	Bienen	Wasser-organismen	Insektizide	Raubmilben	Raub-wanzen	Florfliegen	Marienkäfer	Schweb-fliegen	Parasito-ide
Azoxystrobine	N					N		▼	Abamectin	T	T				
Kaliumbicarbonat	N								Bacillus thuringiensis	N	N	N	N		N
Boscalid	N							▼	Chlorpyrifos-Ethyl	N-M	M	T	N-M		
Bupirimat	N	N	N	N	N	N		▼	Diflubenzuron	N	N	M-T	M		N
Captan + Myclobutanil	N							▼	Rapsöl	N	N				
Kupfer	N	N	N-M	N	N	N		▼	Paraffinol 3.5%	T					
Cyflufenamide	N	N	N			N		▼	Pirimicarb	N	N	N	N	M	M
Cyprodinil +Fludioxonil	T							▼	Kaliumsalze (+ Pyrethrin)	N	N	N	N-M		N
Difenoconazol	N	M	N	N		N		▼	Spinosad	N-M		N-M	N-M		M
Dithianon	N	N	N	N		N		▼	Thiacloprid	N	M-T	M	T	M-T	
Fenhexamid	N	N		N-M		N		▼							
Fluopyram	N	N				N		▼							
Folpet	N	N	N	M	M	N		▼							
Al-Fosethyl	N							▼							
Iprodion	N	N	N	N		N		▼							
Kresoxim-methyl	N	N		N		N		▼							
Mancozeb + Metalaxyl M	M	N	N	N	N	M		▼							
Maneb	T		N					▼							
Mepanipyrim	N	N						▼							
Penconazol	N	N	N	N		N		▼							
Pyrimethanil	N	N	N	N		N		▼							
Netzschwefel 0.1-0.3%	M	N	N	M											
Netzschwefel 0.5%	T	N	N	M		M									
Thiram	T		N		N			▼							
Trifloxystrobin	N	N-M	N-M			N		▼							

N: Neutral bis wenig giftig = 0-40% Mortalität
M: Mässig giftig = 41-60% Mortalität
T: Giftig = 60 - 100% Mortalität
Bienen und Wasserorgaismen: ▼ = giftig

Akarizide

Clofentezine	N	N	N	N	N	N
Etoxazole	M		M			N
Fenazaquin	M	M				
Fenpyroximate	M	M				
Hexythiazox	N	N	N	N		N
Maltodextrine	N	N	N	N	N	N
Milbemectine	M	M				
Spirodiclofene	N-M	N-M	N	N-M		N
Spirotetramate	M	M				
Tebufenpyrad	M	M				

Notzulassung gegen *D. suzukii* 2015

	Lambda-cyhalothrin			Thiacloprid		
	0.02%	SPe3	Anzahl Behandlungen	0.02%	SPe3	Anzahl Behandlungen
Erdbeere	7 Tage	20m	2	3 Tage	20m	2
Himbeere	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
Brombeere	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
Ribes-Arten	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
Heidelbeere	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
Holunder	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
Aronia (Apfelbeere)	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2
MiniKiwi	7 Tage	50m	2	3 Tage	50m	2

	Spinosad			Pyrethrine		
	0.02%	SPe3	Anzahl Behandlungen	0.15%	SPe3	Anzahl Behandlungen
Erdbeere	3 Tage		1	3 Tage		2
Himbeere	3 Tage		2	3 Tage		2
Brombeere	3 Tage		2	3 Tage		2
Ribes-Arten	3 Tage		2	3 Tage		2
Heidelbeere	3 Tage		2	3 Tage		2
Holunder	3 Tage	20m	2	3 Tage		2
Aronia (Apfelbeere)	3 Tage	20m	2	3 Tage		2
MiniKiwi	3 Tage	20m	2	3 Tage		2

Autoren:

André Ancay Agroscope
(Redaktion) E-Mail: andre.ancay@agroscope.admin.ch Tel. 058 481 35 50

Vincent Michel Agroscope
 E-Mail: vincent.michel@agroscope.admin.ch Tel. 058 481 35 35

Catherine Baroffio Agroscope
 E-Mail: catherine.baroffio@agroscope.admin.ch Tel. 058 481 35 18

Bemerkungen:

Dieses Dokument stützt sich auf das vom BLW im Internet publizierte Pflanzenschutzmittelverzeichnis ab. (Internetadresse: www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de). Die Ausverkaufs- und Aufbrauchsfristen von nicht mehr bewilligten Produkte sind ebenfalls im BLW-Pflanzenschutzmittelverzeichnis spezifisch für jedes Produkt aufgeführt. Infos Beeren unter: www.agroscope.admin.ch/baies/index.html?lang=de