

Cornarello

Disponible dès 2021



Synonymes

En Suisse: aucun.

Origine

Cépage obtenu à la Station de recherche Agroscope à Pully en 1995, à partir d'un croisement entre Humagne rouge et Gamaret (code de sélection MRAC 1626).

Phénologie

Débourrement: moyen

Maturité: 1^{re} époque tardive, proche de Diolinoir, 15-20 jours plus précoce qu'Humagne rouge. Profite avantageusement de vendanges retardées, qui améliorent la structure, la qualité des tannins ainsi que la complexité des vins.

Importance et répartition

En raison de son homologation très récente (2017), ce cépage n'est pour l'instant présent qu'en Suisse, dans le cadre d'un réseau de parcelles expérimentales.

Aptitudes culturales et agronomiques

Caractères végétatifs: vigueur assez élevée. Port semi-érigé à semi-étalé.

Potentiel de production: élevé, grappes d'assez grandes dimensions.

Maladies, ravageurs, carences, accidents physiologiques: sensibilité faible à la pourriture (proche de Garanoir). Légère tendance à la carence magnésienne sur feuillage en vignes jeunes et sur sols riches en potassium, comme Humagne rouge.

Terroirs de prédilection: les terroirs très fertiles et à disponibilités en eau très importantes sont à éviter, la plasticité d'adaptation de ce cépage reste malgré tout assez large. En fonction du niveau de maturité élevé requis pour l'élaboration de vins de qualité, il convient d'éviter des situations trop marginales.

Potentiel œnologique

Moût: neutre, moyennement sucré avec une acidité plutôt basse, comme l'Humagne rouge.

Vin: charpente moyenne, tannins tendres et soyeux, vins agréables dès leur jeunesse, mais possédant également un bon potentiel de garde. Bouquet assez complexe caractérisé par des notes de fruits noirs confiturés (cerise noire, mûre, fraise), caractère souvent assez épicé (épices douces), notes végétales de sous-bois et empyreumatiques de cuir.

Extrémité du rameau

Ouverture: complètement ouverte

Pigmentation anthocyanique: nulle à très faible

Densité des poils couchés: forte



Feuille adulte

Forme du limbe: pentagonale

Nombre de lobes: 5

Couleur de la face supérieure: vert foncé

Pigmentation des nervures: nulle à très faible


Cloûre: forte

Forme des dents: à deux côtés rectilignes

Ouverture du sinus pétiolaire: faible

Densité des poils couchés (face inférieure): faible

Densité des poils dressés des nervures (face inférieure): nulle à très faible



Face inférieure

Jeune feuille

Couleur (face supérieure): vert-jaune

Densité des poils couchés (face inférieure): forte



Face supérieure



Face inférieure

Rameau

Couleur de la face dorsale: vert

Couleur de la face ventrale: vert



Face dorsale



Face ventrale



Baie de référence
Chasselas



Grappe

Longueur: moyenne

Compacité: moyenne

Pédoncule: très court

Forme: conique

Nombre d'ailes: 0-1

Baie

Longueur: moyenne

Forme: elliptique courte

Couleur de l'épiderme: bleu-noir

Intensité de la couleur de la pulpe: nulle à très faible