

Chasselas cioutat




Origine, importance

Le Chasselas cioutat est mentionné dès le XVIII^e siècle en Suisse sous les appellations de Raisin d'Autriche ou de Ciouta Reymondin (1798). La plupart des ampélographes européens le signalent comme curiosité très anciennement connue sous des appellations très diverses (notamment Chasselas cioutat, Chasselas à feuilles laciniées, Chasselas à feuilles persillées). Galet (2000) indique que cette mutation se traduisant par des feuilles profondément découpées est causée par un caractère homozygote récessif qui est également connu chez d'autres cépages comme le Pinot noir, le Carignan, l'Alphonse Lavallée, Ugni blanc, la Folle blanche ou encore la Barbera.

Caractéristiques

Le Chasselas cioutat présente une vigueur inférieure à la moyenne. Les baies charnues de type fendant sont d'assez petite taille et ne dorment que modérément sur la face exposée au soleil. Le Chasselas cioutat présente une productivité un peu inférieure à la moyenne et fournit des moûts moyennement riches en sucres. Il n'est cultivé qu'à des fins ornementales comme curiosité.


Observations au conservatoire de Rivaz (moyennes 2012–2019)



Rameau herbacé face ventrale (à gauche) et dorsale (à droite).



Feuille adulte.



Baie (à droite) comparée à celle de référence du Chasselas fendant rouge (à gauche)