



Fiche variétale

Belle de Cacak

Origine: Wangenheimer x Pozegaca. FRI, Cacak, Serbie

Fruit

Pruneau bleu foncé à bleu noir, de forme homogène, pruline. Aspect très attractif. Chair jaune à orange verdâtre, ferme et juteuse. Saveur discrète et plutôt acidulée à maturité. Noyau non adhérent.

Culture

Arbre

Vigueur moyenne, port érigé; bel arbre, bien garni et bien ramifié. La taille devrait se concentrer sur le bois jeune (de l'année). La qualité des fruits est moins bonne sur le bois plus ancien.

Floraison et pollinisation

Floraison mi-précoce et abondante, autofertile.

Potentiel de production

Entrée en production précoce, rendements élevés et réguliers. Un éclaircissage est indispensable pour garantir la qualité des fruits.

Sensibilité

Robuste. Il peut arriver que les fruits se fendent (observation 2019). Sensible à la moniliose en cas de mesures insuffisantes contre la moniliose sur fleurs.

Récolte

Maturité: 3^{ème} à 4^{ème} semaine de la saison des pruneaux, environ deux semaines après Tegera. Lorsque les fruits ont viré au bleu, il faut les laisser encore au moins 15 jours sur l'arbre pour obtenir une bonne qualité. La fenêtre de récolte est très courte et dure au plus une semaine. En cas de récolte trop précoce, la chair se fend rapidement lorsque le pédoncule se détache.


Résumé

Belle de Cacak est une variété standard importante dans l'assortiment des pruneaux suisses. Ses rendements élevés et sa période de maturité intéressante en font un fruit de table de grande valeur. Pour assurer une production de qualité, il est toutefois nécessaire de bien éclaircir et de récolter au bon moment.




Belle de Cacak est une variété très attractive et homogène, tant en termes de calibre, de forme, que de couleur.


Diamètre [mm]



Fermeté [Durofel 25]



Brix



Qualité des fruits: les graphiques montrent l'intervalle interquartile (des 50 % moyens) des échantillons de fruits [4 ans].