

Agroscope Transfer | N° 624 / Janvier 2026



Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026

Document de référence pour les prestations écologiques requises (PER)

Auteur·e·s

Sarah Perren, Barbara Egger, Thomas Kuster,
Christian Linder, Andreas Naef

Partenaires

Offices d'arboriculture et services phytosanitaires cantonaux

Etat au 31 décembre 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Pour répondre aux exigences des prestations écologiques requises (PER) de l'arboriculture en Suisse, la directive «Prestations écologiques requises (PER) en culture fruitière en Suisse» ainsi que le présent document de référence «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026» s'appliquent. En agriculture biologique, selon le label, l'ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l'agriculture biologique) ou la liste des intrants de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) est applicable.

Le présent document est valable pour l'année 2026 (version imprimée et en ligne). Les changements en cours d'année et les éventuelles corrections seront consignés dans le document «Changements dans l'index phytosanitaire pour l'arboriculture 2026»: protection-arboriculture.agroscope.ch

de: pflanzenschutz-obstbau.agroscope.ch
it: protezione-frutticoltura.agroscope.ch

Impressum

Éditeur	Agroscope Müller-Thurgau-Strasse 29 8820 Wädenswil Suisse www.agroscope.ch
Rédaction	Thomas Kuster
Mise en page et impression	Valmedia AG, Pomonastrasse 12, 3930 Visp www.valmedia.ch
Photo de couverture	Chancré du pommier, photo: Perrine Gravalon
Tirage	2000 exemplaires
Fréquence de publication	Annuelle
Téléchargement	www.protection-arboriculture.agroscope.ch
Version	31 décembre 2025
Copyright	© Agroscope 2026
Reproduction	La reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'indication complète de la source
ISSN	2296-7222 (print), 2296-7230 (online)

Exclusion de responsabilité

Les informations contenues dans cette publication sont destinées uniquement à l'information des lectrices et lecteurs. Agroscope s'efforce de fournir des informations correctes, actuelles et complètes, mais décline toute responsabilité à cet égard. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en lien avec la mise en œuvre des informations contenues dans les publications. Les lois et dispositions légales en vigueur en Suisse s'appliquent aux lectrices et lecteurs; la jurisprudence actuelle est applicable.

Table des matières

Fongicides/bactéricides	5
Liste des fongicides et bactéricides en arboriculture en 2026	7
Insecticides et acaricides	12
Liste des insecticides et acaricides en arboriculture en 2026	14
Liste des phytorégulateurs en arboriculture en 2026	19
Liste des rodenticides en arboriculture en 2026	20
Herbicides	21
Liste des herbicides en arboriculture en 2026	22
Effets secondaires des fongicides, insecticides et acaricides en arboriculture 2026	24
Substances actives autorisées dans le cadre des PER pour les cultures de niche	25
Substances actives supplémentaires autorisées dans le cadre des PER	25
Produits avec un délai d'utilisation en 2026 et plus tard	26

Explication des symboles

Fongicides/bactéricides, insecticides/acaricides

● = Bonne efficacité

Le produit permet généralement un bon contrôle de la maladie ou du ravageur. Pour certains anciens produits, des variations d'efficacité peuvent être observées selon les cibles visées.

► = Efficacité partielle

L'efficacité peut être considérée comme suffisante si l'attaque du ravageur ou la pression de la maladie ne sont pas trop importantes. Cette efficacité réduite peut être compensée par certains avantages (par exemple un moindre impact sur l'environnement ou un faible risque pour les insectes auxiliaires).

L'efficacité des macro-organismes peut varier considérablement en fonction de la température, de l'humidité, de la culture, de la nourriture disponible et d'autres facteurs.

▲ = Efficacité secondaire

Efficacité contre une maladie ou un ravageur que l'on ne vise pas directement. Cette efficacité est généralement bonne pour les fongicides, plus variable avec les insecticides. Cette notion permet d'éviter l'adjonction d'un produit spécifique contre la maladie ou le ravageur en question.

Herbicides

● = Bonne efficacité

Le produit permet généralement un bon contrôle de la mauvaise herbe. Pour certains anciens herbicides, des variations d'efficacité peuvent être observées selon les cibles visées.

► = Efficacité partielle

L'efficacité peut être considérée comme suffisante si la pression d'infestation est modérée. Cette efficacité réduite peut être compensée par certains avantages (par exemple, un moindre impact environnemental ou un faible risque pour les insectes auxiliaires).

○ = Efficacité nulle ou insuffisante

Le produit est inefficace contre l'adventice concernée.

Explication des symboles de protection des utilisateurs pour les cultures spéciales

Protection de l'utilisateur	Symbol	Préparation de la bouillie	Application (ou cabine fermée)	Travaux successifs
Niveau 1	①	  	 	
Niveau 2	②	  	   	 
Niveau 3	③	La WebApp affiche les mesures de protection effectivement nécessaires pour chaque étape de travail		
	⚠	Produit spécial: voir le mode d'emploi		

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des utilisateurs dans le Guide phytosanitaire pour l'arboriculture fruitière 2026–2027. Des informations détaillées sur tous les produits sont disponibles sur: url.agridea.ch/epi.

Niveau 2: le couvre-chef et la visière ne sont mentionnées dans la WebApp que lorsqu'ils sont effectivement nécessaires.

Contribution au système de production pour le non-recours aux insecticides, acaricides et fongicides dans les cultures pérennes après la floraison.

L'utilisation de produits phytosanitaires après la floraison est limitée aux produits autorisés en agriculture biologique (Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique, annexe 1). Les produits autorisés sont marqués d'un  dans cette brochure. En outre, l'utilisation de cuivre ne doit pas dépasser la valeur

fixée par hectare et par an: 1.5 kg/ha pour les fruits à pépins, 3 kg/ha pour les fruits à noyau et à coque dure. Voir la Fiche d'information d'Agridea «Cultures pérennes – Ensemble de mesures pour une agriculture plus durable».

Substances de base

Les produits qui contiennent exclusivement des substances de base ne seront plus considérés comme des produits phytosanitaires à partir de 2026, conformément à la nouvelle ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh). Ils peuvent être utilisés en culture fruitière dans le cadre des PER.

Fongicides / bactéricides

Noms commerciaux	N° W	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
Airone	W-7035					3	11	Andermatt Biocontrol
Alfi WG	W-7605	6 m				1	10	Stähler
Alial 80 WG	W-6754	6 m				1	10	Stähler
Aliette WG	W-6325	6 m				1	10	Bayer
Amistar	W-5481, W-5481-2, W-5481-4	20 m		1 p.		1	5	Syngenta, Stähler, Omya
Amylo-X	W-7151					1	13	Andermatt Biocontrol
Armicarb	W-6432					1	13	Stähler
Atollan	W-5417-1	50 m		6 m		2	10	Stähler
Avatar	W-5218-2	20 m				2	4	Stähler
Bellis	W-6948	20 m		6 m		1	9	BASF
Blossom Protect	W-6533					1	13	Andermatt Biocontrol
Bogard	W-5056-1	20 m/ 60 m				1	7	Leu+Gygar
Bouillie bordelaise WG	W-7065					2	11	Schneiter
Bordeaux S	W-2116-1					2	11	Stähler
Captan 80 WDG	W-6635, W-6633-1							Leu+Gygar, Syngenta
Captan 80 WG	W-5706, W-6920							Méoc, Schneiter
Captan S WG	W-6246		20 m			3	1	Stähler
Captan WDG Omya	W-6635-1, W-7505							Omya
Captan WG	W-7201							Stähler
Celos	W-6873					1	12	Leu+Gygar
Champ Flow	W-7450					1	11	Stähler
Chorus	W-5363					1	4	Syngenta
Cidely	W-6592-2					1	10	Syngenta
Corsil	W-5460-1	6 m				1	5	Omya
Cupric Flow	W-2710-4					2	11	Stähler
Cuprofix 35	W-7018-4					3	11	Syngenta
Cuprofix fluid	W-6383-1					2	11	Syngenta
Cuproxat flüssig	W-2710					2	11	Leu+Gygar
Cuprum Flow	W-7450-1					1	11	Schneiter
Curatio	W-7161	50 m	50 m			2	10	Andermatt Biocontrol
Curenox 50 WG	W-6556					3	11	Schneiter
Cyflamid	W-6592					1	10	Stähler
D	Delan WG	W-6060, W-6060-3	50 m		6 m	2	10	BASF, Syngenta
	Delan Pro	W-7223	20 m		2 p.	2	10	BASF
	Difcor 250 EC	W-6452	20 m			1	7	Schneiter
	Difol	W-7237	50 m	20 m	1 p.	2	7	Schneiter
	Dithianon 70 WG	W-5417	50 m		6 m	2	10	Schneiter
	Divo	W-7342	20 m/ 60 m			1	7	SINTAGRO M. Eggen
E	Elosal Supra	W-986				1	12	Omya
	Espiro	W-7406-1	20 m	6 m		1	4	Omya
	Espiro Plus	W-7213-1	20 m	6 m	6 m	1	4	Omya
F	Faban	W-7213	20 m	6 m	6 m	1	4	BASF
	Fezan	W-6589-2	20 m			2	7	Stähler
	Flint	W-5994	50 m		1 p.	3 m	2	Bayer, Leu+Gygar, SINTAGRO M. Eggen
	Flowbrix	W-6383				2	11	Leu+Gygar
	Folpet Stähler WG	W-7203	20 m		6 m	3	1	Stähler
	Folpet 80 WG	W-6955	20 m		6 m	2	1	SINTAGRO M. Eggen
	Folpet 80 WDG	W-6680, W-6660, W-6660-1, W-6660-2, W-6897	20 m		6 m	2	1	Leu+Gygar, Bayer, Stähler, Syngenta, Schneiter
G	Funguran Flow	W-6393				2	11	Omya
	GHEKKO	W-7307-1				1	13	Syngenta
	Globaztar SC	W-7162	20 m		1 p.	1	5	Schneiter
H	Heliosoufre S	W-5323				2	12	Omya
K	Kocide 2000	W-7010-1				2	11	Stähler
	Kocide Opti	W-7102-1				3	11	Bayer
	Kudos	W-7620, W-7620-1				1	13	Stähler, Omya
	Kumulus WG	W-4458				1	12	BASF
	Kupfer-Bordo LG	W-2116				2	11	Leu+Gygar

Noms commerciaux	N° W	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
L Legado	W-7607	20 m		1 p.		1	5	Stähler
Legan WG	W-7127	50 m		6 m		2	10	Leu+Gygax
Lirus	W-6060-5	50 m		1 p.		2	10	Omya
LMA	W-6925					2	10	Omya
Lumino	W-7521	20 m				1	7	Omya
M Microthiol Spécial Disperss	W-7258-1					1	12	AGROLINE
Moon Experience	W-6856	20 m				2	9	Bayer
Moon Privilege	W-6828					1	9	Bayer
Moon Sensation	W-6961	50 m		1 p.	3 m	2	9	Bayer
Myco-Sin	W-5497					3	13	Andermatt Biocontrol
N Netzschwefel Stulln	W-7227					1	12	Andermatt Biocontrol
Nimrod	W-6641-1, W-6845	6 m				1	10	Leu+Gygax, Syngenta
Norec	W-7223-2	20 m		2 p.		2	10	Omya
O Oxykupfer 35	W-7018-2					3	11	Stähler
P Phaltan 80 WDG	W-6680-1	20 m		6 m		3	1	Omya
Pican	W-6592-1					1	10	Omya
Prolectus ^(A)	W-6865	6 m				1	6	Omya
Pyrus 400 SC	W-7406-3	20 m	6 m			1	4	Schneiter
Q Quartet Lux	W-6841-2					1	13	Syngenta
R Regalis Plus	W-7110-1		6 m			1	13	Stähler
Rondo Sky	W-7134-1	20 m				1	9	Syngenta
Rucolan	W-7127-2	50 m		6 m		2	10	Bayer
S Saphire	W-5361	20 m				1	10	Syngenta
Sercadis	W-7134	20 m				1	9	BASF
Sico	W-5056-3	20 m/ 60 m				1	7	Bayer
Slick	W-5056, W-5056-2	20 m/ 60 m				1	7	Syngenta, Stähler
Solfovit WG	W-4458-1					1	12	Bayer
Solofol	W-7008	20 m	6 m			2	1	Omya
Soufre 80 WG	W-4495					1	12	Schneiter
Soufre FL	W-5162					1	12	Médol
Stamina S	W-6841					1	13	Stähler
Stroby WG	W-5460	6 m				1	5	BASF
Sufralo	W-18-1					1	12	Stähler
Switch	W-5218	20 m				2	4	Syngenta, Leu+Gygax, SINTAGRO M. Eggen
Syllit	W-7402-1	50 m		6 m		1	10	Schneiter
T Tega	W-5994-3					2	5	Syngenta
Teldor	W-5751	20 m				1	6	Bayer
Thiovit Jet	W-18					1	12	Syngenta
Thiovit Liquid	W-5323-2					2	12	Syngenta
Tofa	W-7134-2	20 m				1	9	Stähler
Topas	W-6690		6 m			1	7	Syngenta
Topas Vino	W-4260		6 m			1	7	Syngenta
Trezor	W-5751-1	20 m				1	6	Stähler
V Vacciplant	W-6724					2	13	Stähler
Venturex	W-7213-2	20 m	6 m	6 m		1	4	Stähler
Vitigran 35	W-7018					3	11	Omya
Vitisan	W-6940					1	13	Andermatt Biocontrol

La liste des noms commerciaux ne contient pas de produits d'importation parallèle ni de produits qui ne sont pas en vente. Ces produits autorisés par l'OSAV peuvent être utilisés dans le cadre des PER, pour autant que la substance active soit mentionnée dans les PER conformément à la présente publication d'Agroscope «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026».

N° W = numéro de l'homologation W. Il est obligatoire de mentionner le numéro d'homologation (numéro W) directement dans le journal des traitements. Comme alternative autorisée, il est possible d'établir une liste des produits phytosanitaires disponibles dans l'exploitation avec le nom du produit et le numéro d'homologation. Le produit utilisé doit cependant toujours être clairement indiqué (numéro W).

Colonne jaune foncé: N° = groupe chimique selon pages 7 à 11

Colonne jaune clair: exigences en matière de distances de sécurité des eaux, des biotopes et de réduction du risque de ruissellement (cf. Guide phytosanitaire pour l'arboriculture fruitière 2026–2027)

ES = largeur de la zone tampon non traitée pour les eaux de surface (PER: distance minimale de 6 m pour tous les produits)

B = largeur de la zone tampon non traitée pour les biotopes

R = mesure visant à réduire les risques liés au ruissellement: points de réduction ou largeur de la zone tampon avec couverture végétale (PER: bandes herbeuses d'au moins 6 m pour tous les produits si la parcelle est distante de < 100 m des eaux de surface et pente > 2%)

Zones tampons par rapport aux plantes en fleurs (abeilles) et pour la protection des tiers: voir mode d'emploi

Colonne blanche PU = protection de l'utilisateur voir page 4

T = distance par rapport aux zones d'habitations et aux installations publiques (protection des tiers)

À propos du code FRAC

Le code FRAC permet de distinguer les fongicides en fonction de leur résistance croisée. Les fongicides partageant le même code font partie du même groupe de résistance et doivent être gérés ensemble quant au nombre maximum d'applications. Les limitations du nombre d'applications sont indiquées dans l'index. Des produits contenant plusieurs substances actives possèdent plusieurs codes FRAC.

Liste des fongicides et bactéricides en arboriculture en 2026

Respecter les charges relatives à la protection des eaux, des biotopes et des utilisateurs ainsi qu'au risque de ruissellement, voir pages 5-6

Groupes chimiques (N°)			Substances actives (code FRAC)			Indications générales			Maladies																																
Noms commerciaux									Arbres à pépins						Arbres à noyau																										
Formulation	Mode d'action	Mode d'application	Mode d'action: c = contact p = pénétrant s = systémique			Formulation: WP = poudre, WG = granulé SC = suspension concentrée EC = émulsion concentrée EW = émulsion, huile dans eau DC = concentré dispersable SL = concentré soluble dans l'eau SP = poudre soluble dans l'eau			Admis en culture: bio *	PER ■	PER avec restrictions	Délai d'attente (semaines, i. = jours)	Teneur en matière active (%)	Concentration d'utilisation (%)	Quantité de produit (kg ou l/ha) volume de la haie foliaire (TRV) p/10 000 m ³ /ha	Tavelure (pommier, poirier)	Oïdium (fruits à pépins)	Pourriture de la mouche (pommier)	Maladies de conservation	Suite culture de pomme	Maladie de la population Marsannina	Maladie des fleurs et fruits (pommier)	Rouille grillagée (pommier)	Entomophytose (cognassier)	Feu bactérien	Bactériose (pommier)	Chancre bactérien (cerisier)	Maladie cible	Maladie des fleurs et rameaux	Maladie des fruits	Pourriture amère (cerisier)	Cylindrospore (cerisier)	Rouille (prunier)	Maladie pochées (prunier)	Tavelure poche (pêcher)	Chancre (pêcher, nectacier)	Oïdium (pêcher)				
● = bonne efficacité ◆ = efficacité partielle ^(A) = produits avec délai d'utilisation																																									
6 Hydroxyanilide et pyrazolinone (code FRAC 17, délai d'attente: cultures avec protection contre la pluie: 3 semaines; sans protection contre la pluie: 10 jours)																																									
Prolectus ^(A) (max. 3 applications/année)	WG	p	fenpyrazamine (17)	■	—	50	0.075	1.2																		● ●															
Teldor, Trezor (max. 2 applications/année)	WG	p	fenhexamide (17)	■	—	50	0.1	1.6																	● ●																
7 ISS (inhibiteur de la synthèse des stérols, code FRAC 3, max. 4 applications/année)																																									
Fezan ①	EW	p	tébuconazole (3)	■		25.9	0.03	0.48																		●		pas autorisé sur prunier													
Slick, Bogard, Difcor 250 EC, Lumino, SICO, Divo + Captan ou Delan	EC	c, p	difénoconazole (3) + captane ou dithianon ②	■	3	250 g/l 80/70	0.015 0.02 0.03 0.48 0.1/0.03	0.24 0.32 0.48 1.6/0.48	0.015 0.02 0.03 0.48 0.1/0.03	● ●	● ●	du débourrement à fin juillet maximum															● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	cloque du pêcher sans mélange obligatoire au captane ou dithianon et sans délai d'attente pour applications jusqu'à la floraison	● ● ● ● ● ●											
Difol	SC	c, p	folpet (M04) + difénoconazole (3)	■	3	32.7 + 0.87	0.25	3.5	●	max. 3 applications, jusqu'au stade BBCH 70																															
Topas	EC	p	penconazole (3)	■	3	10.4	0.006	0.1																																	
Topas Vino																																									
9 SDHI (Inhibiteur de la succinate déshydrogénase, code FRAC 7)																																									
Bellis (compte aussi comme strobilurine)	WG	c, p	boscalid (7) + pyraclostrobine (11)	■	3	25.2/12.8	0.05	0.8											● max	3 applications																					
Bellis (compte aussi comme strobilurine) + Captan	WG	c, p	boscalid (7) + pyraclostrobine (11) + captane	■	3	25.2/12.8 80	0.05 0.1	0.8 1.6											● max	2 applications																					
Bellis (compte aussi comme strobilurine) + Captan ou Delan	WG	c, p	boscalid (7) + pyraclostrobine (11) + captane ou dithianon ②	■	3	25.2/12.8 80/70	0.05 0.1/0.03	0.8 1.6/0.48	● max	3 applications																															
Moon Experience (compte aussi comme ISS)	SC	c, p	fluopyram (7) + tébuconazole (3)	■	3	je 200 g/l	0.025 0.05 0.04	0.4 0.8 0.64	● max	3 applications									● max	3 applications	● max. 2 applications										maladie ciblée seulement sur prunier max. 2 applications	● ● ● ● ● ●									
Moon Privilege	SC	c, p	fluopyram (7)	■	2	500 g/l	0.01 0.02 0.025	0.16 0.32 0.4	● max	3 applications									● max	3 applications	● max. 3 applications, min. 14 jours entre les traitements									● max. 2 applications	● max. 2 applications										
Moon Privilege + Flint (compte comme strobilurine)	SC	c, p	fluopyram (7) + trifloxystrobine (11)	■	3	500 g/l	0.0175 0.0175	0.28 0.28																							● ● ● ● ● ●	délai d'attente cerisier 2 sem. max. 3 applications des groupes FRAC 9 et 15 ensembles									
Moon Privilege + Captan ou Delan	SC	c, p	fluopyram (7) + captane ou dithianon ②	■	3	500 g/l	0.01 0.1/0.03	0.16 1.6/0.48	● max	3 applications																															
Moon Sensation (compte comme strobilurine)	SC	c, p	trifloxystrobine (11) + fluopyram (7)	■	3	chacun 250 g/l	0.035	0.56																							● ● ● max. 3 applications cerisier: délai d'attente 2 sem.										
Rondo Sky, Sercadis, Tofa + Captan ou Delan	SC	c, p	fluxapyroxad (7) + captane ou dithianon ②	■	5	26.5 80/70	0.013 0.1/0.03	0.21 1.6/0.48	● max	3 applications																															

Groupes chimiques (N°)		Substances actives (code FRAC)			Indications générales			Maladies																											
Noms commerciaux								Arbres à pépins						Arbres à noyau																					
● = bonne efficacité	● = efficacité partielle	Formulation	Mode d'action	Mode d'action:	c = contact	p = pénétrant	s = systémique	Admis en culture: bio PER PER avec restrictions	Délai d'attente (semaines, i. = jours)	Teneur en matière active (%)	Concentration d'utilisation (%)	Quantité de produit (kg ou l/ha) volume de la haie foliaire (TRV) de 10 000 m ³ /ha	Tavelure (pommier, poirier)	Oïdium (fruits à pépins)	Pourriture de la mouche (pommier)	Maladies de conservation	Seule attaque de mouche	Maladie de la défoliation Marsonina	Moniliaose des fleurs et rameaux	Rotille grillagée (poirier)	Entomosporiose (pommier) (coquelicteuse)	Feu bactérien	Bactériose (poirier)	Chancre bactérien (cerisier)	Maladie cribrée	Moniliose des fleurs et rameaux	Moniliose des fruits	Pourriture amère (cerisier)	Cylindrospore (cerisier)	Rouille (prunier)	Maladie pochette (prunier)	Tavelure noire (pêcher)	Coquelicteuse (pêcher, nectarinier)	Oïdium (pêcher)	Oïdium (pêcheur, cerisier)
(A) = produits avec délai d'utilisation				Formulation:																															
Cuprofix 35, Oxykupfer 35, Vitigran 35	WP	c	cuivre (sous forme d'oxychlorure, M01)		-	35	0.125 0.188 0.43	2 3 6.9	●	avant fleur												●						●							
Flowbrix, Cuprofix Fluid	SC	c	cuivre (sous forme d'oxychlorure, M01)		-	380 g/l	0.06-0.125 0.125-0.25 0.25-0.4	0.96-2 2-4 4-6.4	● ●	avant fleur au débourrement												● ●					●		●						
Airone	WG	c	cuivre (sous forme d'hydroxyde, M01) + cuivre (sous forme d'oxychlorure, M01)		-	14 + 14	0.169 0.225	2.7 3.6	● ●	avant fleur au débourrement																		●							
Cuproxit flüssig, Cupric Flow	SC	c	cuivre (sous forme sulfate de cuivre tribasique, M01)		-	190 g/l	0.125-0.25 0.25-0.5 0.5-0.75	2-4 4-8 8-12	● ●	avant fleur au débourrement												● ●					●		●						
Bouillie bordelaise, Bordeaubrûhe WG, Bordeaux S, Kupfer-Bordo LG	WG	c	cuivre (sous forme de bouillie bordelaise, M01)		-	20	0.125-0.2 0.25-0.5 0.5-0.75	2-4 4-8 8-12	● ●	avant fleur au débourrement												● ●					●		●						
12 Soufre (code FRAC M02)																								⑥ délai d'attente: 3 semaines pour les fruits à noyau après fleur, sinon aucun; pas autorisé sur abricotier											
Celos, Elosal Supra, Kumulus WG, Microthiol Spécial Disperss, Netzschwefel Stulln, Schwefel 80 WG, Solfovit WG, Sufralo, Thiovit Jet	WG	c	soufre (M02)		-	80	0.75 0.5-0.75	12 8-12	● ●	au débourrement												●	avant fleur												
Héliosoufre S, Thiovit Liquid, Soufre FL	SC				⑥	700, 723 g/l	0.3-0.5	4.8-8.0	● ●	avant fleur pendant et après fleur											●	après fleur	●	●	●										
13 Autres fongicides à efficacité partielle																								③ uniquement contre la tavelure tardive ④ seulement pêcher et nectarine ⑤ en cas d'application dans une culture d'arbres fruitiers haute-tige											
Amylo-X	WG	k	Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum (NC)		1j.	25	0.16	2.4																	●	seul. sur pêcher/nectarinier et prunier									
Armicarb, GHEKKO	SP	c	Hydrogénocarbonate de potassium (NC) + 0.2 % soufre mouillable		8j.	85	0.3 0.2 0.2 0.2	4.8 3.2 3.2 3.2	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Vitisan + 0,2 % soufre mouillable	WP	c	Hydrogénocarbonate de potassium (NC)		8j.	99.6	0.31	5	● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Myco-Sin Ne pas mélanger avec du cuivre	WP	c	argile sulfuré (n.c.), extraits de prêle (n.c.) + 0.3 % soufre		3	65	0.5	8	● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Blossom Protect	WP	c	Aureobasidium pullulans (NC)		3j.	5×10 ⁹ ufc/g	0.09	1.5													●	contre le feu bactérien doit être utilisé avec Buffer Protect													

Groupes chimiques (N°)	Substances actives (code FRAC)		Indications générales		Maladies																									
					Arbres à pépins					Arbres à noyau																				
Noms commerciaux	Formulation	Mode d'action	Admis en culture: bio  *, PER  , PER avec restrictions  ,	Délai d'attente (semaines, j. = jours)	Teneur en matière active (%)	Concentration d'utilisation (%)	Quantité de produit (kg ou l/ha) volume de la haie foliaire (TRV) de 10 000 m ³ /ha	Tavelure (pommier, poirier)	Oïdium (fruits à pépins)	Pourriture de la mouche (pommier)	Maladies de conservation	Suie, croûte de mouche	Maladie de la défoliation Marssonina	Moniliose (des fleurs et trameaux)	Rouille grillagée (poirier)	Entomospore (cognassier)	Feu bactérien	Bactériose (poirier)	Chancre bactérien (cerisier)	Maladie ciblee	Moniliose des fleurs et trameaux	Moniliose des fruits	Pourriture amère (cerisier)	Cylindrosporose (cerisier)	Rouille (prunier)	Maladie pochettes (prunier)	Tavelure poirier (pêcher)	Oïdium (pêcher)	Oïdium (abricotier)	Cloue (pêcher, nectarinier)
Regalis Plus, Kudos Feu bactérien + inhibition de la croissance des pousses: max. 0,3 kg de prohexadione Ca par ha et par année	WG	s	prohexadone-calcium (NC)	 35j.	10	0.16	2.5	                            <img alt="red circle logo" data-b																						

Insecticides et acaricides

Noms commerciaux	N° W	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
Affirm	W-6748	50 m	100 m	6 m		1	33	Syngenta
Agroneem	W-5351-7					1	35	Agroline Bioprotect
Anthopak	W-7423					1	32	Agroline Bioprotect
Atac	W-6748-3	50 m	100 m	6 m		1	33	Stähler
Armicarb	W-6432					1	43	Stähler
Atilla	W-7473					1	43	Schneiter
Audienz	W-6020	20 m				2	33	Omya, Leu+Gygax
B	Bande de glu anti-chenilles						30	Andermatt Biocontrol
Beapro	W-7633					3	33	Andermatt Biocontrol
Beapro liquid	W-7528-2					3	33	Andermatt Biocontrol
Beauveria Maschinering	W-7378					3	33	Maschinering Graubünden
Blinker	W-7229					3	43	Omya
Braxol	W-5168-2					1	50	Andermatt Biocontrol
C	Capex 2 ^A	W-4234				1	34	Andermatt Biocontrol
	Carpovirusine Evo 2	W-6831				1	34	Stähler
	CheckMate CM-XL Dispenser	W-7064				1	31	Stähler
	CheckMate Puffer CM	W-7222				1	31	Stähler
	CheckMate Puffer Fruit Multi	W-7635				△	31	Stähler
	CheckMate Puffer Leaf Multi	W-7523				△	31	Stähler
D	Credo	W-6982-1	50 m	6 m		1	55	Leu+Gygax
Delfin	W-6552					1	33	Andermatt Biocontrol
Dipel DF	W-6777					1	33	Omya
E	Elvis	W-6020-2	20 m			2	33	Stähler
F	Flipper	W-7630	20 m			3	36	Bayer
G	Gazelle SG	W-6581	20 m	6 m		1	41	Stähler
	Genol Plant	W-5168				1	50	Syngenta, Andermatt Biocontrol
	GHEKKO	W-7307-1				1	43	Syngenta
	Glumalt SL	W-6936-4				1	43	Andermatt Biocontrol
H	Huile blanche Omya	W-2215				1	50	Omya
	Huile blanche S	W-4555				1	50	Schneiter, Andermatt Biocontrol
I	Isomate-C Plus	W-5331				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-C/OFM	W-6228				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-CTT	W-6093				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-CLR Max	W-6144				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-CLR/OFM	W-6362				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-OFM Rosso	W-5963				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isomate-P	W-6584				△	31	Andermatt Biocontrol
	Isonet-Z	W-6359				△	31	Andermatt Biocontrol
K	Kanemite	W-6632	20 m			2	55	Stähler
	Kiron	W-4579	50 m	20 m	6 m	3	55	Omya
L	LOTIQ	W-6107-2				1	36	Syngenta
M	Madex 2	W-4194				1	34	Andermatt Biocontrol
	Madex Top	W-6813				1	34	Andermatt Biocontrol
	Madex Twin	W-6814				1	34	Andermatt Biocontrol
	Majestik	W-6936				1	43	Omya
	Meginem Cold	W-7549				1	32	Andermatt Biocontrol
	Meginem Pro	W-6336-1				1	32	Andermatt Biocontrol
	Melonem	W-7551				1	32	Andermatt Biocontrol
	Milbeknock	W-7538	50 m			1	55	Omya
	Mister C	W-7241				△	31	Andermatt Biocontrol
	Misto 12	W-1454				1	50	Blaser
N	Movento SC ^A	W-6742				2	43	Bayer
	Natural	W-6107				1	36	Andermatt Biocontrol
	Naturalis-L	W-7316				3	33	Andermatt Biocontrol
	NeemAzal-T/S	W-5351				1	35	Andermatt Biocontrol
	Nemapom	W-6820				1	32	Agroline Bioprotect
	Nematop	W-5950				1	32	Agroline Bioprotect
	Nissostar	W-6982	50 m	6 m		1	55	Stähler
O	Oleate 20	W-5761				1	36	Stähler
	Oléc	W-1529				1	50	Méoc
	Oryx Pro	W-6581-3	20 m	6 m		1	41	Syngenta
	Ovitex	W-7120				1	50	Belchim
P	Parafol	W-1454-2				1	50	Agroline Bioprotect
	Parexan N	W-5959	100 m	6 m		1	35	Omya
	Piège à mouches de la cerise Agroline						30	Agroline Bioprotect
	Pirimicarb	W-1899-2	50 m	6 m		3	40	Omya
	Pirimicarb 50 WG	W-4367	50 m	6 m		2	40	Schneiter
	Pirimor	W-5105, W-1899, W-1899-1	50 m	6 m		3	40	Leu+Gygax, Syngenta, Stähler
	Pistol	W-6581-4	20 m	6 m		1	41	Omya
	Prev-AM	W-7141		6 m		1	35	Andermatt Biocontrol
	Priapak	W-7543				1	32	Agroline Bioprotect
	Pyrethrum FS	W-5777	50 m	6 m		1	35	Andermatt Biocontrol
Q	Quassan	W-5201				1	35	Andermatt Biocontrol

Noms commerciaux	N° W	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
RAK 3	W-6469					⚠	31	BASF
Rapid	W-6748-2	50 m	100 m	6 m		1	33	Leu+Gygax
Rampastop P							30	Agroline Bioprotect
Rebell amarillo							30	Andermatt Biocontrol
Rebell rosso							30	Andermatt Biocontrol
S	Sicid Neem	W-7490-1	20 m			2	35	Stähler
	Siva 50	W-4682				1	36	Omya
	Spray Oil 7E	W-2008				1	50	Leu+Gygax
	Statuspak	W-7556				1	32	Agroline Bioprotect
	Surround	W-6416				3	43	Stähler
T	Telmion	W-4678				1	50	Omya
	Teppeki	W-6555, W-6555-1, W-6555-2				1	43	Omya, Syngenta
	Traunem	W-5277				1	32	Andermatt Biocontrol
V	Vista	W-4682-1				1	36	Leu+Gygax
W	Wormox	W-7580				1	33	Stähler
X	XenTari WG	W-6888				1	33	Leu+Gygax
Z	Zofal D	W-1526				1	50	Stähler
	Zofal R	W 5168-3				1	50	Stähler
	Zorro ^A	W-7153	50/ 100 m		6 m/ IL ¹⁾	1	33	Omya

Remarque: L'utilisation de la plupart des insecticides est interdite pendant la floraison. Pour certains produits, il existe également des exigences supplémentaires pour la protection des abeilles qui doivent être respectées.

^A Produits avec délai de vente/d'utilisation détails cf. p. 26

La liste des noms commerciaux ne contient pas de produits d'importation parallèle ni de produits qui ne sont pas en vente. Ces produits autorisés par l'OSAV peuvent être utilisés dans le cadre des PER, pour autant que la substance active soit mentionnée dans les PER conformément à la présente publication d'Agroscope «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026».

N° W = numéro de l'homologation W. Il est obligatoire de mentionner le numéro d'homologation (numéro W) directement dans le journal des traitements. Comme alternative autorisée, il est possible d'établir une liste des produits phytosanitaires disponibles dans l'exploitation avec le nom du produit et le numéro d'homologation. Le produit utilisé doit cependant toujours être clairement indiqué (numéro W).

Colonne jaune foncée: N° = groupe chimique selon pages 14–18

Colonne jaune clair = exigences en matière de distances de sécurité des eaux, des biotopes et de réduction du risque de ruissellement (cf. Guide phytosanitaire pour l'arboriculture fruitière 2026–2027)

ES = largeur de la zone tampon non traitée pour les eaux de surface (PER: distance minimale de 6 m pour tous les produits)

B = largeur de la zone tampon non traitée pour les biotopes

R = mesure visant à réduire les risques liés au ruissellement: points de réduction ou largeur de la zone tampon avec couverture végétale (PER: bandes herbeuses d'au moins 6 m pour tous les produits si parcelle est distante < 100 m des eaux de surface et pente > 2 %)

¹⁾ IL = interlignes enherbés

T = distance par rapport aux zones d'habitations et aux installations publiques (protection des tiers)

PU = protection de l'utilisateur voir page 4

Liste des insecticides et acaricides en arboriculture en 2026

Respecter les charges relatives à la protection des eaux, des biotopes et des utilisateurs ainsi qu'au risque de ruissellement, voir pages 12 et 13

Groupes chimiques		Substances actives (Code IRAC)	Données générales						Ravageurs principaux											
Nom commerciaux									Lépidoptères			Homoptères			Divers		Acariens			
● = bonne efficacité		AE = aérosol																		
● = efficacité partielle		EC = émulsion concentrée																		
▲ = efficacité secondaire		EW = emulsion, type aqueux																		
◆ = toxique pour les abeilles (selon les conditions d'utilisation spécifiques au produit)		FA = pièges																		
		ME = microémulsion																		
		OD = dispersion d'huile																		
		SC = suspension concentrée																		
		SG = granulés solubles eau																		
		SL = concentré soluble eau																		
		SP = poudre soluble																		
		VP = diffuseur de vapeur																		
		WP = poudre dispersable eau																		
		WG = granulé dispersable eau																		
		XA, XP = adultes, pupes																		
		XF = mycélium																		
		XL, XN = larves																		
30 Pièges pour réduire les attaques		Formulation	Limitation: (fp) fruits à pépins; (po) pommiers; (pol) poiriers; (fn) fruits à noyaux; (ab) abricots; (ce) cerisiers; (pe) pêchers; (pr) pruniers						Admis: bio, * en PER, en PER avec restrictions			Nombre maximum de traitements par parcelle et par année			Délai d'attente (semaines)		Teneur en substance active (%)		Concentration (%) ou dose d'utilisation	
Mouche de la cerise - piège Agroline	FA	piège jaune			■ *		—		2-10/arbre											
Rampastop P	FA	glu			■ *		—		—											
Raupenleimring	FA	anneaux de glu			■ *		—		—											
Rebell amarillo	FA	pièges jaunes			■ *		—		2-10/arbre											
Rebell rosso	FA	pièges à alcool			■ *		—		8 pièges/ha									②		
31 Phéromones (confusion sexuelle)																				
CheckMate Puffer CM	AE	codlénone		fp, ab	■ *		—		3/ha	●								⑤		
CheckMate CM-XL diffuseurs	VP	codlénone		fp, ab	■ *		—		300-400/ha	●								⑤		
CheckMate Puffer Fruit Multi	AE	Codlemon + Z8-12Ac		fp	■ *		—		3/ha	●	●	●								
CheckMate Puffer Leaf Multi	AE	codlénone + Z11-14Ac + Z9-14Ac		fp, ab	■ *		—		3/ha	●		●						⑤		
Isomate-C Plus	VP	codlénone		fp	■ *		—		1000/ha	●										
Isomate-CTT	VP	codlénone		fp, poi, ab	■ *		—		500/ha	●										
RAK 3	VP	codlénone		po, poi	■ *		—		500/ha	●										
Isomate-CLR Max	VP	codlénone + Z11-14Ac + Z9-14Ac		fp, ab	■ *		—		750/ha	●		●						⑤		
Isomate-CLR/OFM	VP	codlénone + Z11-14Ac + Z9-14Ac + E8-12Ac			■ *		—		700/ha	●	▲	▲	●							
Isomate-C/OFM	VP	codlénone + Z8-12Ac + E8-12Ac		fp pe	■ *		—		1000/ha	●	●	●	●							
Isomate-OFM Rosso	VP	Z8-12Ac + E8-12Ac		po fp, pe pr	■ *		—		500/ha	●		●	●							
Isomate-P	VP	E3Z13-18Ac + Z3Z13-18Ac			■ *		—		500/ha									③		
Isonet-Z	VP	E2Z13-18Ac + E3Z13-18Ac			■ *		—		500/ha									④		
Mister C	AE	codlénone		fp	■ *		—		2-3/ha	●										
32 Organismes auxiliaires																				
Anthopak	XA	<i>Anthocoris nemoralis</i>		poi	■ *		—		1000-2000/ha						●					
Meginem Cold	XN	<i>Heterorhabdus downesi</i>			■ *		—		0.5 Mio./m ²								⑥			
Meginem Pro	XN	<i>Heterorhabdus bacteriophora</i>			■ *		—		0.5 Mio./m ²						uniquement dans les pépinières		⑥			

Groupes chimiques		Substances actives (Code IRAC)	Données générales							Ravageurs principaux							
Nom commerciaux			Lépidoptères				Homoptères				Divers		Acariens				
● = bonne efficacité ● = efficacité partielle ▲ = efficacité secondaire ❖ = toxique pour les abeilles (selon les conditions d'utilisation spécifiques au produit)	Formulation	AE = aérosol EC = émulsion concentrée EW = emulsion, type aqueux FA = pièges ME = microémulsion OD = dispersion d'huile SC = suspension concentrée SG = granulés solubles eau SL = concentré soluble eau SP = poudre soluble VP = diffuseur de vapeur WP = poudre dispersible eau WG = granulé dispersable eau XA, XP = adultes, pupes XF = mycélium XL, XN = larves	Limitation: (fp) fruits à pépins; (po) pommiers; (poi) poiriers; (fn) fruits à noyaux; (ab) abricots; (ce) cerisiers; (pe) pêchers; (pr) pruniers	Admis: bio, * en PER, ■ en PER avec restrictions	Nombre maximum de traitements par parcelle et par année	Délai d'attente (semaines)	Teneur en substance active (%)	Concentration (%) ou dose d'utilisation	Quantité de produit (kg ou l/ha) calculée pour 1600 l/ha volume de la haie foliaire (TRY) de 10 000 m ³ /ha	Carpocapse Carpocapse pruniers Petit tortueux des fruits Capua Tordeuse orientale du pêcher Chimatocera Hydromyia Muscina (muscine) (pr)	Puceron lanigère Puceron du poirier Cochenilles lécanines Cochenilles virgulées Cochenilles diaspines / pou de San José Anthonomus	Puceron lanigère Psyle commun du poirier Cochenilles lécanines Cochenilles virgulées Cochenilles diaspines / pou de San José Punaises des fruits	Drosophile du céleri Mouche de la cerise Hippocrate	Divers	Enophyldes galloiliensis Enophyldes galloiliensis Enophyldes galloiliensis Enophyldes galloiliensis	Acaracide au gelse / acarien jaune	Acaracide au gelse / acarien jaune
55 Acaricides spécifiques (pour éviter les résistances max. 1 x par année avec les produits du même groupe de résistance, à l'exception de la maltodextrine)																	
		Milbemycine															
Milbeknock	EC	milbemectine (6)	po, poi	■	1	3	1	0.125	2	oeufs, larves, nymphes, adultes					●	▲	
		Inhibiteurs de développement															
Credo, Nissostar	SC	héthythiazox (10A)	④ fp, fn	■	1	3	23.1	0.05/0.02	0.8/0.32	oeufs, larves, nymphes					●		
		METI															
Kiron	SC	fenpyroximate (21A)	fp, fn	■	1	3	5	0.1	1.6	larves, nymphes, adultes					●	●	
		Quinolines															
Kanemite	SC	acéquinocyl (20B)	⑥ fp	■	1	3	15.8	0.1125	1.8	larves, nymphes, adultes					●		
		Dérivés acide tétronique															
Movento SC ^A	SC	spirotétramate (23)	fp	■	2	3	10	0.09	1.44	larves, nymphes					●		
		Divers															
Majestik, Glumalt SL	❖ SL	maltodextrine	po, poi	■ *	–	49	2.5	40		nymphes, adultes					●		
56 Fongicides à action acaricide (à partir de 0,75 % de soufre, potentiellement toxique pour les acariens prédateurs)																	
Voir liste fongicide	WP SC WG	soufre (UN)	fp, fn poi	■ *	–	70–80	0.3–0.5 0.5–0.75 2	4.8–8 8–12 32	pendant et après fleur du débourrement à la floraison après la récolte					▲	▲	●	

Les substances actives figurant dans cette liste sont commercialisées en Suisse sous différents noms commerciaux qui peuvent être consultés sur www.psm.admin.ch

Code IRAC: classification des substances actives en groupes de résistance, en fonction du mode d'action selon www.irac-online.org

^A Produits avec délai de vente/d'utilisation, voir détails page 26

Consulter les listes officielles Bio pour les restrictions d'utilisations

- ① Ne pas appliquer par temps froid
- ② Ne pas mélanger avec les préparations à base de cuivre
- ③ Poire: jusqu'au début de la floraison
- ④ Jusqu'à fin juin au plus tard
- ⑤ Eviter les mélanges avec les fongicides
- ⑥ Uniquement dans les cultures fruitières (pas dans les vergers haute-tige)
- ⑦ Fruits à noyau: pas pour fruits de table
- ⑧ Avant fleur
- ⑨ Après la récolte
- ⑩ Ne pas dépasser une concentration maximale de 0,6 % dans la bouillie
- ⑪ Ne pas utiliser dans des mélanges en cuve avec des adjutants ou des produits phytosanitaires huileux.
- ⑫ Danger de phytotoxicité sur poires, suivre exactement les indications du producteur.

Ravageurs divers

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ① Larves de tenthredes | ④ Efficacité partielle Zeuzère | ⑦ Mouche de la noix | ⑩ Mouche de l'olive |
| ② Bostryche | ⑤ Carpocapse (noyer) | ⑧ Teigne du pêcher | ⑪ Efficacité partielle: punaise marbrée |
| ③ Sésie du pommier | ⑥ Otiorhynques | ⑨ Hanneton commun (larves) | |

La liste des intrants du FiBL est contraignante pour les restrictions en matière d'agriculture biologique!

Liste des phytorégulateurs en arboriculture en 2026

Espèce fruitière Application	PER	PL	Norm commercial	Numéro de l'homologation W	Substances actives	Firme	Dosage	Application	Commentaires
Pommier Eclaircissement	■	② ①	Dirigol-N, Phytonic Geramid Top	W-3004, W-3004-1 W-7309	α -naphtylacétamide (NAD)	Stähler, Leu+Gygax Omya	200-400 g/ha 1.4-4.6 l/ha	Chute des pétales	Ajouter un mouillant seulement avec la formulation en poudre.
	■	①	Rhodofix Dirager Plus*	W-3003 W-7396	acide α -naphtylacétique (ANA)	Syngenta Omya	1-3 kg/ha 0.35-1.2 l/ha	Diamètre du fruit central 8-12 mm Diamètre du fruit central 10-12 mm	Ajouter un mouillant seulement avec la formulation en poudre. Réduire le dosage en cas de mélange avec BA!
	■	①	Dartilon ^(A) Ethephon LG ^(A) Ethephon Médol ^(A) Ethephon ^(A) Ethefon S ^(A)	W-3064-1 W-3064-2 W-3060 W-3085 W-3064	éthéphon	Stähler Leu+Gygax Médol SINTAGRO M. Eggen Schneiter	0.3 l/ha	Stade ballon jusqu'à maximum 14 jours après la floraison	
	■	①	MaxCel	W-6529-1	6-benzyladénine (BA)	Omya	3.75-7.5 l/ha	Diamètre du fruit central 7-15 mm, optimal 10-12 mm	En mélange avec ANA, réduire les dosages! Attention aux conditions de protection des utilisateurs.
	■	①	Armicarb Gheko	W-6432 W-7307-1	hydrogéncarbonate de potassium	Stähler, Andermatt Biocontrol Syngenta	10-20 kg/ha	1-2 applications à 3-5 jours d'intervalle pendant la floraison	Pour les variétés à haut rendement, tester 2 applications.
	■	②	Brevis	W-6996	métamitron	Leu+Gygax	1.1-2.2 kg/ha	1-2 applications à 5-10 jours d'intervalle sur fruits de 8-14 mm (BBCH 69-72)	Respecter les indications du mode d'emploi.
	■	② ①	Dirigol-N, Phytonic Geramid Top	W-3004, W-3004-1 W-7309	α -naphtylacétamide (NAD)	Stähler, Leu+Gygax Omya	200 g/ha 2.4-2.6 l/ha	Jusqu'à 10 jours avant récolte Jusqu'à 14 jours avant la récolte	1-2 applications
Pommier Contre la chute prématuée des fruits	■	①	Rhodofix Dirager Plus*	W-3003 W-7396	acide α -naphtylacétique (ANA)	Syngenta Omya	2-4 kg/ha 1.0-1.2 l/ha	Jusqu'à 10 jours avant récolte De 3 semaines à 10 jours avant la récolte	1-2 applications
	■	① ②	Novagib Gibbalin SL	W-7344 W-7562	gibbérelline A4+A7 gibbérelline+6-benzyladénine	Stähler Schneiter	0.5 l/ha 0.25 l/ha	Maximum 4 applications depuis la fin de la saison, à intervalles de 7 à 10 jours (Gibbalin SL: intervalle 10 jours) temps frais (BBCH 69-72)	Effets négatifs possibles sur la forme des fruits et la formation des boutons floraux.
Poirier Eclaircissement	■	①	MaxCel	W-6529-1	6-benzyladénine (BA)	Omya	7.5 l/ha	Diamètre du fruit central 7-15 mm, optimal 10-12 mm	Un seul traitement. Attention aux conditions de protection des utilisateurs.
	■	②	Brevis	W-6996	métamitron	Leu+Gygax	1.1-2.2 kg/ha	1-2 applications à 5-10 jours d'intervalle sur fruits de 8-14 mm (BBCH 69-72)	Respecter les indications du mode d'emploi.
Poirier Contre la chute prématuée des fruits	■	①	Dirager Plus*	W-7396	α -naphtylacétamide (NAD)	Omya	1.0-1.2 l/ha	De 3 semaines à 10 jours avant la récolte	1-2 applications, pour la variété Beurré Bosc.
Poirier Amélioration de la nouaison (stimulation des fruits parthenocarpiques)	■	②	Gibberellin A3 Falgro Tabs	W-3028 W-7470	gibbérelline A3	Schneiter Stähler	160 g/ha 6 tablettes/ha	Début de la floraison BBCH 62-69, max. 1 application	Effets négatifs possibles sur la forme des fruits et la formation des boutons floraux.
	■	①	Novagib	W-7344	gibbérelline A4+A7	Stähler	1×1.2 l/ha ou 2×0.6 l/ha	1-2 applications à 3-7 jours d'intervalle pendant la floraison (BBCH 62-69)	
Pommier, poirier, cerisier Régulateur de croissance	■	①	Regalis Plus Kudos	W-7110-1 W-7620-1	prohexadione-calcium	Stähler Omya	2.5 kg/ha 1.25 kg/ha	BBCH 60-75, app. fractionnées possibles BBCH 60-81, max. 3 applications	Regalis Plus: non autorisé pour les cerises Kudos: dosage poirier 0.625-1.25 kg/ha Respecter les instructions du mode d'emploi et la dose maximale par ha et par an
Pommier, poirier Retard de la maturité	■	⚠	Harvista 1.3 SC	W-7642	1-MCP	AgroFresh	8.75-11.7 l/ha	Max. 1 app. 3-21 jours (pommier) / 0-7 jours (poirier) avant la date prévue pour la récolte	Délai d'attente 3 jours. Utiliser uniquement avec un système d'injection directe. Zone tampon tiers: 20 m
Cerisier Contre le rougissement précoce des cerises	■	② ①	Dirigol-N, Phytonic Geramid Top	W-3004, W-3004-1 W-7309	α -naphtylacétamide (NAD)	Stähler, Leu+Gygax Omya	320 g/ha 4-5 l/ha	Floraison déclinante	Une seule application. L'application trop tardive favorise l'apparition de fruits déformés.
Prunier, abricotier Eclaircissement	■	①	Armicarb Gheko	W-6432 W-7307-1	hydrogéncarbonate de potassium	Stähler, Andermatt Biocontrol Syngenta	10-15 kg/ha	1-2 applications à 3-5 jours d'intervalle pendant la floraison	Pour les variétés à haut rendement, tester 2 applications.

PU: Niveaux de protection des utilisateurs, voir tableau page 4. *Dirager S (W-3080) continue à être autorisé, mais n'est plus en vente. Dosage et application, cf. mode d'emploi. ^(A) produit avec avec délai d'utilisation voir p. 26

La liste des noms commerciaux ne contient pas de produits d'importation parallèle ni de produits qui ne sont pas en vente. Ces produits autorisés par l'OSAV peuvent être utilisés dans le cadre des PER, pour autant que la substance active soit mentionnée pour les PER conformément à la présente publication d'Agroscope «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026». Remarques au sujet du numéro W, voir page 6.

Liste des rodenticides en arboriculture en 2026

Groupes chimiques	N° W	Substances actives	Firmes	Forme	Données générales					Cibles
					Protection de l'utilisateur	Admis en: culture bio *	en PER	Délai d'attente (semaines)	Teneur en matière active (%)	
Préparations fumigènes										
Matox	W-2780		Urech						36.8	
Mäusetod	W-2744		Hauri						36.8	
Mäusetod-Patronen	W-2783	soufre	Mauser						36.8	
Vulkan-Wühlmauspatrone	W-2743		Läubli						30.5	
Zurin	W-2782		Ziegler	cartouches	⚠	■	-		36.8	1-5 cartouches
Cobra Forte	W-7606	phosphure d'aluminium	Stähler	produit générateur de gaz	⚠	■	-	56	3-5 pellets	Par 3-10 m de galerie
Ratron Sticks	W-7281	phosphure de zinc	Omya	appât (prêt à l'emploi)	⚠	■	-	0.8	1 pièce	Par 3-5 m de galerie, 5 kg/ha au maximum par an

Protection de l'utilisateur voir page 4

La liste des noms commerciaux ne contient pas de produits d'importation parallèle ni de produits qui ne sont pas en vente. Ces produits autorisés par l'OSAV peuvent être utilisés dans le cadre des PER, pour autant que la substance active soit mentionnée dans les PER conformément à la présente publication d'Agroscope «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026». Remarques au sujet du numéro W, voir page 6.

Herbicides

	Noms commerciaux	N° W	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
A	Agil	W-6969					1	63	Leu+Gygax
	Asulam ^(A)	W-4034					2	61	SINTAGRO M. Eggen
	Asulam LG ^(A)	W-6997-4					2	61	Leu+Gygax
	Asulam S ^(A)	W-6997-3					2	61	Schneiter
	Asulox ^(A)	W-1698					2	61	Syngenta
D	Dunovum	W-7340-3	20 m	20 m	3 p.		1	61	Syngenta
	Duplosan KV-Combi	W-5164, W-6316	6 m			20 m	⚠	62	Leu+Gygax, Syngenta
	Durano TF	W-6793					1	61	Bayer
E	Exelor	W-4220	6 m			20 m	⚠	62	Stähler
F	Firebird Plus	W-7340	20 m	20 m	3 p.		1	61	Omya
	Focus Ultra	W-4700					1	63	BASF
	Fusilade Max	W-6085					1	63	Syngenta
G	Glyphosat 360 TF	W-7124					1	61	Schneiter
	Glyphosate	W-5553					1	61	SINTAGRO M. Eggen
M	MCCP Combi	W-4516-1	6 m			20 m	⚠	62	Schneiter
	Médox ^(A)	W-4516	6 m			20 m	⚠	62	Médol
	Mizuki	W-7340-1	20 m	20 m	3 p.		1	61	Stähler
N	Natrel	W-7319					2	61	Stähler
P	Plüssstar	W-4177	6 m			20 m	⚠	62	Omya
	Propaq	W-6870					1	63	Schneiter
R	Roundup PowerFlex	W-6646-3					1	61	Bayer
	Roundup PowerMax	W-6646-1					1	61	Stähler
	Roundup Prime	W-6793-1					1	61	Stähler
	Roundup UltraPro	W-6646-2					1	61	Syngenta
	RUGA	W-4700-1					1	63	Omya
	Ruman ^(A)	W-6997-1					2	61	Omya
S	Select	W-6010	20 m	6 m/ 20 m ¹⁾			1	63	Schneiter, Stähler
	Siplant	W-7282					1	61	Stähler
	Spotlight Plus	W-6067					1	61	Syngenta
	Sunrise	W-7340-2	20 m	20 m	3 p.		1	61	Leu+Gygax
T	Targa Super	W-6206					2	63	Bayer
	Touchdown System 4	W-6131					1	61	Syngenta
	Trifulox ^(A)	W-6997-2					2	61	Stähler
X	Xenturion	W-6085-3					1	63	Stähler

La liste des noms commerciaux ne contient pas de produits d'importation parallèle ni de produits qui ne sont pas en vente. Ces produits autorisés par l'OSAV peuvent être utilisés dans le cadre des PER, pour autant que la substance active soit mentionnée dans les PER conformément à la présente publication d'Agroscope «Index des produits phytosanitaires pour l'arboriculture 2026».

N° W = numéro de l'homologation W. Il est obligatoire de mentionner le numéro d'homologation (numéro W) directement dans le journal des traitements. Comme alternative autorisée, il est possible d'établir une liste des produits phytosanitaires disponibles dans l'exploitation avec le nom du produit et le numéro d'homologation. Le produit utilisé doit cependant toujours être clairement indiqué (numéro W).

Colonne en jaune foncé, No = groupe chimique selon pages 22-23

Colonne jaune clair = exigences en matière de distances de sécurité des eaux, des biotopes et de réduction du risque de ruissellement (cf. Guide phytosanitaire pour l'arboriculture fruitière 2026-2027)

ES = distance aux eaux superficielles (PER: distance minimale de 6 m pour tous les produits)

B = distance aux biotopes; ¹⁾ monocotylédones annuelles (0.5 l/ha): 6 m; chendent rampant (1l/ha): 20 m

R = mesure visant à réduire les risques liés au ruissellement: points de réduction (PER: bandes herbeuses d'au moins 6 m pour tous les produits si parcelle est distante < 100 m des eaux de surface et pente > 2 %)

T = distance par rapport aux zones d'habitations et aux installations publiques (protection des tiers)

PU: protection des utilisateurs, voir p. 4

^(A) = produits avec délai d'utilisation voir p. 26

Liste des herbicides en arboriculture en 2026

Respecter les charges relatives à la protection des eaux, des biotopes et des utilisateurs ainsi qu'au risque de ruissellement, voir page 21

Mode d'action (N°)		Indications générales		Efficacité contre les adventices																		Remarques																		
Produits commerciaux	Substances actives			Annuelles						Vivaces						Graminées																								
(A) = produit avec délai d'utilisation		● = efficacité bonne ◆ = efficacité partielle ○ = efficacité nulle ou insuffisante ◆◆ = très toxique pour les organismes aquatiques (H410) ◆◆◆ = toxique pour les abeilles (selon conditions d'utilisation spécifiques au produit)		Groupe de résistance (HRAC)		Culture *		Dosages % ou kg resp. /ha		Annuelles						Vivaces																								
(A) = produit avec délai d'utilisation		● = efficacité bonne ◆ = efficacité partielle ○ = efficacité nulle ou insuffisante ◆◆ = très toxique pour les organismes aquatiques (H410) ◆◆◆ = toxique pour les abeilles (selon conditions d'utilisation spécifiques au produit)		Groupe de résistance (HRAC)		Culture *		Dosages % ou kg resp. /ha		Annuelles						Vivaces						Graminées																		
61 Herbicides à action foliaire																																								
Asulam ^(A) , Asulam LG ^(A) , Asulam S ^(A) , Asulox ^(A) , Ruman ^(A) , Trifolox ^(A)	asulame ◆◆	18	FN, FP	3–4 l	◆	Amaranthées	Asperges	Calceux gratteron	Callosega	Laîterons annuels	Lamiers	Matiçaïres	Morelle noire	Mouron des oiseaux	Ranunculacées	Véroniques	Berce	Chardons	Lièvre terrestre	Liserons	Otie diabolique	Pissenlit	Plantains	Potentille rampante	Prêles	Renoncules	Rumex (L) ampêtre	Trèfle	Véronique filiforme	Epilobe	Vesces	Chiendent rampant	Millets	Paturin annuel	Paturins	Ray-grass annuel	Rejets	Années après plantation	Attention: Bien nettoyer les appareils de traitement après l'application d'herbicides. Tenir compte des recommandations des firmes lors du nettoyage.	
Roundup PowerMax, Roundup PowerFlex, Roundup UltraPro	glyphosate	9	FN, FP	1.5–7.5 l	■	Amarantes	Asperges	Calceux gratteron	Callosega	Laîterons annuels	Lamiers	Matiçaïres	Morelle noire	Mouron des oiseaux	Ranunculacées	Véroniques	Berce	Chardons	Lièvre terrestre	Liserons	Otie diabolique	Pissenlit	Plantains	Potentille rampante	Prêles	Renoncules	Rumex (L) ampêtre	Trèfle	Véronique filiforme	Epilobe	Vesces	Chiendent rampant	Millets	Paturin annuel	Paturins	Ray-grass annuel	Rejets	Années après plantation	1	Pas de traitement pendant la floraison et de mi-juin à fin août. PER: uniquement plante par plante.
Durano TF, Glifonex TF, Glyphosat 360 TF, Glyphosate, Roundup Prime, Touchdown System 4																																					2	Traitement au plus tard jusqu'à fin août. Efficacité insuffisante lors de sécheresses prolongées. Appliquer avec un faible volume d'eau (200–500 l / ha). Pas de précipitations pendant 1–6 h après le traitement (durée dépendant du produit)		
Natrel	acide pélargonique	Ø	FN, FP	8–16 l	■	Amarantes	Asperges	Calceux gratteron	Callosega	Laîterons annuels	Lamiers	Matiçaïres	Morelle noire	Mouron des oiseaux	Ranunculacées	Véroniques	Berce	Chardons	Lièvre terrestre	Liserons	Otie diabolique	Pissenlit	Plantains	Potentille rampante	Prêles	Renoncules	Rumex (L) ampêtre	Trèfle	Véronique filiforme	Epilobe	Vesces	Chiendent rampant	Millets	Paturin annuel	Paturins	Ray-grass annuel	Rejets	Années après plantation	2	Aucun effet durable. Application mai-août lors de temps chaud et ensoleillé sur des adventices de moins de 10 cm de haut max. Max. 2 traitements par parcelle et par année, dans un délai de 5–10 jours. En règle générale, une quantité de 16 l/ha est nécessaire. Aussi autorisé pour éliminer les drageons (max. 32 l/ha par parcelle et par année).
Siplant	acides gras ◆◆ (caprique + caprylique)	Ø	FN, FP	18 l	■	Amarantes	Asperges	Calceux gratteron	Callosega	Laîterons annuels	Lamiers	Matiçaïres	Morelle noire	Mouron des oiseaux	Ranunculacées	Véroniques	Berce	Chardons	Lièvre terrestre	Liserons	Otie diabolique	Pissenlit	Plantains	Potentille rampante	Prêles	Renoncules	Rumex (L) ampêtre	Trèfle	Véronique filiforme	Epilobe	Vesces	Chiendent rampant	Millets	Paturin annuel	Paturins	Ray-grass annuel	Rejets	Années après plantation	2	Aucun effet durable. Application mai-août lors de temps ensoleillé/chaud sur des adventices de moins de 10 cm de haut max. Max. 3 traitements par parcelle et par année dans un délai de 5 à 10 jours.

* FN = fruits à noyau FP = fruits à pépins

^a Pour les fruits à pépins dès la 1^{re} année, pour les fruits à noyau dès la 2^e année

Effets secondaires des fongicides, insecticides et acaricides en arboriculture 2026

Insecticides	N°	Typhlo-dromes	Antho-corides	Chrysopes	Coccinelles	Syrphides	Parasitoïdes	Abeilles	Organis. Aquatiques
acétamipridine	41	N	M-T	N-M	M-T	p. d.	M-T		✗
acide gras	36	N	N	N	N	p. d.	N		
azadirachtine	35	N	N-M	M	M	M	N-M		✗
<i>Bacillus thuringiensis</i>	33	N	N	N	N	p. d.	N		✗
carbonate de calcium	43	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
émamectine benzoate	33	N-M	N-M	N-M	N-M	p. d.	M	✗	✗
extrait de quassia	35	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
flonicamid	43	N	p. d.	N	N	N	N	✗	
granuloses	34	N	N	N	N	N	N		
huile de colza	50	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
huile de paraffine 1-2%	50	N	p. d.	N	N-M	p. d.	N		
huile de paraffine 3,5%	50	M	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
huile d'orange	35	N-M	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	N-M		✗
hydrogénocarbonate de potassium	43	N	N	p. d.	p. d.	p. d.	N		
kaolin	43	N	p. d.	p. d.	N	p. d.	N		
phéromone synthétique	31	N	N	N	N	N	N		
pirimicarbe	40	N	N	N	N	M	M	✗	✗
pyréthrine naturelle	35	N-M	M	M	M-T	M-T	M-T	✗	✗
spinétorame	33	M	M	M	N-M	p. d.	M-T	✗	✗
spinosad	33	N-M	N-M	N-M	N-M	N-M	M	✗	✗
spirotétramate	43	N	N	N	N	p. d.	N		✗

Acaricides	N°	Typhlo-dromes	Antho-corides	Chrysopes	Coccinelles	Syrphides	Parasitoïdes	Abeilles	Organis. Aquatiques
acéquinocyl	55	N	p. d.	N	p. d.	p. d.	N		✗
fenpyroximate	55	M	p. d.	N	M-T	N	M		✗
héxythiazox	55	N	N	N	N	p. d.	N		
maltodextrine	55	N-M	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	✗	
milbemectine	55	T	p. d.	N	p. d.	p. d.	T	✗	✗
soufre ≤ 0,75%	12	N	N-M	N	M	p. d.	N-M		
soufre > 0,75%	12	M	N-M	N	M	p. d.	M		
spirotétramate	43	N	N	N	N	p. d.	N		✗
tébufenpyrad	55	M	N	N	p. d.	p. d.	N-M		✗

En cas de mélange de substances actives, la toxicité la plus élevée est déterminante.

Les données proviennent de diverses sources: essais de laboratoire, semi-champ et plein champ. Pas de données disponibles pour les cases vides.

Les lettres N, M et T donnent le niveau de toxicité approximatif selon la classification suivante:

Fongicides	N°	Typhlo-dromes	Antho-corides	Chrysopes	Coccinelles	Syrphides	Parasitoïdes	Abeilles	Organis. Aquatiques
argiles sulfurées	13	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
<i>Aureobasidium pullulans</i>	13	N	N	N	N	N	N		
azoxystrobine	5	N	N	N	N	p. d.	N		✗
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ssp. <i>plantarum</i>	13	N	N	N	N	N	N		
boscalid + pyraclostrobine	9	N	p. d.	N	p. d.	p. d.	N		✗
bupirimate	10	N	N	N	p. d.	p. d.	N		✗
captane	1	N	N	N	p. d.	p. d.	N		✗
cuivre	11	N	p. d.	N-M	p. d.	p. d.	N-M		✗
cyflufenamid	10	N	p. d.	N	p. d.	p. d.	N		✗
cyprodinil	4	N	N	p. d.	N	N	N		✗
difénoconazole	7	N	N	N	N	N	N		✗
dithianon	10	N	N	N	N	N	N		✗
dodine	10	N	N	N	N	p. d.	N		✗
fenhexamide	6	N	N	p. d.	N	p. d.	N		✗
fenpyrazamine	6	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	N		✗
fludioxonil	10	N	N	p. d.	N	p. d.	N		✗
fluopyram	9	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	N		✗
fluxapyroxade	9	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	N		✗
folpet	1	N	N	N	N	p. d.	N		✗
fosetyl-Al	10	N	p. d.	N	p. d.	p. d.	N		✗
hydrogénocarbonate de potassium	13	N	N	p. d.	p. d.	p. d.	N		
krésoxim-méthyl	5	N	N	p. d.	N	p. d.	N		✗
penconazole	7	N	N	N	N	p. d.	N		✗
penthiopyrad	9	N	N	N	p. d.	p. d.	N		✗
phosphonate de potassium	13	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.		
polysulfure de calcium	10	M	N-M	N-M	M	p. d.	M		✗
pyriméthanal	4	N	N	N	N	N	N-M		✗
soufre ≤ 0,75%	12	N	N-M	N	M	p. d.	N-M		
soufre > 0,75%	12	M	N-M	N	M	p. d.	M		
sulfate d'aluminium potassique	10	N	p. d.	p. d.	p. d.	p. d.	N		
tébuconazole	7	N	N	N	N	p. d.	N		✗
trifloxystrobine	9	N	M	N	N	p. d.	N		✗

N = neutre à peu毒ique (0-40% réduction)

M = moyennement毒ique (40-60% réduction)

T =毒ique (60-100% réduction)

p. d. = pas de données

Abeilles et organismes aquatiques:

✗ = Toxicité (respecter les conditions d'utilisation!)

N° = Groupe chimique selon pages 7 à 11 (fongicides) et 14 à 18 (insecticides/acaricides)

Substances actives autorisées dans le cadre des PER pour les cultures de niche

Substance(s) active(s)	Catégorie de produits	Châtaigner	Noisetier	Amandier	Noyer	Kiwi	Olivier	Organismes nuisibles	Remarques
Acétamiprid	Insecticide				●			mouche de la noix	
Acide acétique	Herbicide	●	●	●	●	●		● dicotylédones, monocotylédones	Seuls les produits du jardin potager sont autorisés
Acide pélargonique	Herbicide	●	●	●	●	●		● dicotylédones, monocotylédones	Seuls les produits du jardin potager sont autorisés
Acides gras C7-C18	Insecticide	●	●	●	●	●		● pucerons, acariens tétranyques	
<i>Adalia bipunctata</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● pucerons	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>	Insecticide	●	●	●	●			cheimatobies	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● cheimatobies, hyponomeutes	
<i>Beauveria bassiana</i>	Insecticide							● effet partiel: mouche de l'olive	
<i>Beauveria brongniartii</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● hanneton commun	
Cuivre	Fongicide					●		Bactériose, maladie de l'œil de paon, ● bactériose du noyer, anthracnose du noyer	
Emamectine benzoate	Insecticide					●		carpocapse des pommes	
Glyphosate	Herbicide	●	●	●	●	●		● dicotylédones, monocotylédones	Kiwi: seuls les produits du jardin potager sont autorisés
<i>Heterorhabditis downesi</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● otiorhynques	
<i>Heterorhabditis megidis</i> + <i>Photorhabdus luminescens</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● otiorhynques	
Huile de colza	Insecticide	●	●	●	●	●		cochenilles lécanines, effet partiel: ● acariens tétranyques, cheimatobies, ériophyides galloïques, pucerons	
Huile de paraffine	Insecticide	●	●	●	●			acarien rouge, cheimatobies, cochenilles, phytoptes	
Kaolin	Insecticide					●		● mouche de la noix, mouche de l'olive	
Metaldéhyde	Molluscicide	●	●	●	●	●		● limaces	
Pendiméthaline	Herbicide	●	●	●	●			dicotylédones, monocotylédones	
Phosphate ferrique III	Molluscicide	●	●	●	●	●		● limaces	
Phosphure d'aluminium	Rodenticide	●	●	●	●	●		● campagnol terrestre, taupes (fam.)	
Phosphure de zinc	Rodenticide	●	●	●	●	●		● campagnol terrestre	
Spinosad	Insecticide				●			carpocapse des pommes	
<i>Steinernema carpocapsae</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● otiorhynques	Seuls les produits du jardin potager sont autorisés
<i>Steinernema carpocapsae</i> + <i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● effet partiel: hanneton commun	
<i>Steinernema feltiae</i> + <i>Xenorhabdus bovinii</i>	Insecticide	●	●	●	●	●		● effet partiel: carpocapse des pommes	Une partie des produits du jardin potager est autorisée
Technique de confusion sexuelle	Insecticide	●	●	●	●	●		● contre différents ravageurs	
Virus de la granulose de la capua	Insecticide	●	●	●	●	●		● tordeuses de la pelure	Voir le délai d'utilisation du produit Capex 2
Virus de la granulose du carpocapse	Insecticide	●	●	●	●	●		● carpocapse des pommes	

Tous les produits contenant la substance active mentionnée ne sont pas autorisés contre tous les organismes nuisibles indiqués.

Seules les autorisations de produits figurant dans l'index des produits phytosanitaires de l'OSAV font foi : www.psm.admin.ch

Substances actives supplémentaires autorisées dans le cadre des PER

Substance(s) active(s)	Catégorie de produits	Remarques
Acide acétique	Herbicide	toutes les cultures fruitières, seuls les produits du jardin potager sont autorisés
<i>Adalia bipunctata</i>	Insecticide	toutes les cultures fruitières, seuls les produits du jardin potager sont autorisés
Glyphosate + 2,4-D	Herbicide	autorisé, mais pas en vente actuellement
Penthiopyrad	Fongicide	autorisé, mais pas en vente actuellement
Tebufenpyrad	Acaricide	1 traitement par an; autorisé, mais pas en vente actuellement
<i>Trichogramma cacoeciae</i>	Insecticide	autorisé, mais pas en vente actuellement

Produits avec un délai d'utilisation en 2026 et plus tard

Nom commercial	Numéro W	Firme	Substance active	Catégorie de produits	Date limite de vente	Date limite d'utilisation	Remarque
Etephon Médol	W-3060	Médol	Éthéphon	Phyto-régulateur	30.06.2025	30.06.2026	Dissolution de l'entreprise
Asulam	W-4034	Sintagro M. Eggen					
Asulam LG	W-6997-4	Leu+Gygax					
Asulam S	W-6997-3	Schneiter					
Asulox	W-1698	Syngenta	Asulame	Herbicide	01.07.2025	01.07.2026	Retiré de l'annexe 1 de l'OPPh
Ruman	W-6997-1	Omya					
Trifulox	W-6997-2	Stähler					
<hr/>							
Capex 2	W-4234	Andermatt Biocontrol	Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure	Insecticide	01.07.2025	01.07.2026	Substance active retirée
Movento SC	W-6742	Bayer	Spirotétramate	Insecticide	30.11.2026	30.06.2027	Substance active retirée
Ethephon	W-9085	Sintagro M. Eggen	Éthéphon	Phyto-régulateur	31.10.2026	31.10.2026	Substance active en cours de réexamen ciblé
Dartilon	W-3064-1	Stähler					
Ethephon LG	W-3064-2	Leu+Gygax	Éthéphon	Phyto-régulateur	31.12.2025	31.12.2026	Substance active en cours de réexamen ciblé
Ethefon S	W-3034	Schneiter					
Prolectus	W-6865	Omya	Fenpyrazamine	Fongicide	01.01.2026	01.01.2027	Substance active retirée
Médox	W-4516	Médol	MCCP-P+2,4-D	Herbicide	30.06.2026	30.06.2027	Dissolution de l'entreprise
Zorro	W-7153	Omya	Spinetoram	Insecticide	01.07.2026	01.01.2027	Substance active retirée

OPPh = Ordonnance sur les produits phytosanitaires

La liste complète des produits avec un délai d'utilisation 2026 est disponible à l'adresse suivante: www.osav.admin.ch > Produits phytosanitaires > Produits phytosanitaires homologués > Produits phytosanitaires qui ne sont plus homologués

