

Traitement de débourement au cuivre contre le feu bactérien



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de
l'économie DFE
Station de recherche
Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Auteurs:

Groupes feu bactérien ACW

Description

- Efficacité partielle contre des bactéries comme le feu bactérien
- Produit à base de cuivre

But de l'application

- Film sur l'écorce afin que les bactéries arrivant dans le verger meurent
- Traitement seulement raisonnable s'il y a du feu bactérien dans le verger ou dans les alentours
- La Plexige une autorisation du service cantonal

Concentration, dosage et volume de bouillie

Produits à 50% de cuivre	concentration:	0,3%
(base 1600 l/ha de bouillie pour 10000m ³ /ha de volume d'arbres)	dosage:	4,8 kg/ha
Concentrer 2x:	volume:	800 l/ha
Concentrer 4x:	volume:	400 l/ha

Période d'application

Une application lors du gonflement des bourgeons (B – C3)

Droits de reproduction

© 11.2006, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, case postale 185, 8820 Wädenswil reproduction avec indication de source autorisé.

Éditeur: Verein Publikationen Spezialkulturen, c/o Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW
www.feubacterien.ch