

Pomme de terre

Variété pour l'industrie alimentaire

Santana**Kartoffeln**

Verarbeitungssorte

<i>Maturité</i>	mittelfrüh bis mittelspät <i>mi-précoce à mi-tardive</i>	Reifegruppe
<i>Obtenteur</i>	Van Rijn B.V. NL-2690 AA's-Gravenzande	Züchter
<i>Ascendance</i>	Spunta x VK 69-491	Abstammung
<i>Inscription sur la liste officielle</i>	1998	Aufnahme in die offizielle Sortenliste
<i>Représentant</i>	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
<i>Tubercule :</i>	<i>forme : longue à oblongue</i> <i>taille : grosse</i> <i>yeux : superficiels</i> <i>chair : jaune clair</i> <i>peau : jaune</i>	<i>Knolle :</i>	Form : lang bis langoval Grösse : grossfallend Augen : flach Fleischfarbe : hellgelb Schale : gelb
<i>Tige :</i>	<i>taille haute, port mi-dressé,</i> <i>légère pigmentation rouge</i> <i>violacé pâle</i>	<i>Stengel :</i>	hoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert, rot bis blassviolett
<i>Feuille :</i>	<i>vert foncé, nervures profondes,</i> <i>framboisée</i>	<i>Blatt :</i>	dunkelgrün, tiefe Nerven, himbeerblättrig
<i>Fleur :</i>	<i>mauve clair, floraison moy.</i> <i>abondante</i>	<i>Blüten :</i>	rotviolett, mittelstark blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	élevé élevé moyenne (14,5 - 16,5%) moyen C-D moyenne moyenne faible à moyenne frites	Ertrag : Kalibrierenausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch hoch mittel (14,5 - 16,5%) mittel C-D mittel mittel niedrig bis mittel Frites
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Virus de l'enroulement : Virus Y : Sensibilité aux chocs : Sensibilité à l'égermage :	résistante résistante au pathotype Ro ₁ moyenne moyenne faible très sensible très sensible moyenne moyenne élevée moyenne	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Blattroll : Virus Y : Schlagempfindlichkeit : Abkeimungsempfindlichkeit :	nicht anfällig nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁) mittel mittel gering sehr anfällig sehr anfällig mittel mittel hoch mittel
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	La dormance est courte. Santana est sensible au verdissement. Elle doit être cultivée de préférence dans des terres irrigables.		Die Keimruhe ist kurz. Santana neigt zum Ergrünen. Bewässerungsmöglichkeit ist ratsam.

Santana est une variété destinée à la transformation en frites.

Santana ist eine Sorte mit Eignung zur Frites-Herstellung.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.