




# Admiral

Herkunft: Mira x Bohemia. Institut für experimentelle Botanik, Střížovice (CZ)

Erfahrungswerte CH: gering

## Baum & Produktion


Sorte vs. Ø alle Sorten



- Blüte mittelfrüh, Pollen schlecht (triploid)
- Ertragseintritt früh, Erntefenster kurz
- Neigung zur Stippigkeit, insbesondere bei Alternanz (große Früchte)
- Gerüstäste schräg-aufwärts, sehr kräftiges Holz, etwas kahlästig, sehr gesundes Laub, große Blätter
- Geeignet für Hochstammanbau und für intensivere Mostobstanlagen

## Anfälligkeit

Sorte vs. Ø alle Sorten



- Schorfresistent (Rvi6)
- Braucht einen minimalen Pflanzenschutz zur Erhaltung der Schorfresistenz
- Hohe Marssoninaanfälligkeit
- Anfällig für Blattläuse, insbesondere Apfelfaltenlaus








## FAZIT

## Erntefenster & Safteigenschaften

E. Aug	A. Sep	M. Sep	E. Sep	A. Okt	M. Okt	E. Okt	A. Nov
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Sorte vs. alle Sorten



## Vorteile

- + Wüchsige, stabile und luftige Krone (Neigung zum Verkahlen)
- + Mittlerer bis hoher Ertrag
- + Schorfresistent (Rvi6)
- + Als Tafelapfel lange lagerfähig

## Nachteile

- Leicht mehltau- und krebsanfällig, sehr marssoninaanfällig
- Alternanz
- Neigung zu Stippigkeit
- Schlechter Befruchteter (triploid)
- Untypischer Apfelsaft (Sensorik)

## Eignung der Sorte

Für den biologischen Anbau und Hausgarten geeignet, in Lagen mit hohen Marssonina-Druck vermeiden



## Erläuterungen Sortenblätter

### Wie werden die Piktogramme gelesen?

Die Früchte eignen sich als:



Tafelobst



Mostobst

Die Sorte eignet sich für:



Niederstammanbau




Die Eignung dieser Sorte als Hochstamm ist noch unklar

Hochstammanbau

### Wie werden die Spinnen-Diagramme gelesen?

Der rote Bereich stellt die **Eigenschaften der beschriebenen Sorte** dar. Als Vergleich dazu bildet der graue Bereich die durchschnittlichen Eigenschaften **ALLER** in dieser Broschüre dargestellten Sorten ab.



### Baum & Produktion

Eigenschaft	1	3	5	7	9
<b>Ertrag</b>	sehr schwach	ungenügend	genügend	hoch	sehr hoch
<b>Alternanz</b>	keine	gering	mässig	stark	sehr stark
<b>Wuchsstärke</b>	sehr schwach	schwach	mittel	stark	sehr stark
<b>Kronengrösse</b>	sehr klein	klein	mittel	gross	sehr gross
<b>Kronenstabilität</b>	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
<b>Garnierung</b>	sehr schwach	schwach	mittel	stark	sehr stark

### Anfälligkeit

1	2	3	5	7	9
resistant (Gen)	robust	schwach	mittel	hoch	sehr hoch

### Wie werden die Erntefenster gelesen?

Die Monate sind in drei Abschnitte unterteilt (A=Anfang, M=Mitte und E=Ende).




Die **roten Felder** stellen dar, in welchem Zeitraum die Früchte erntereif sind (Abweichungen aufgrund des Mikroklimas, der Höhenlage sowie der Anbaumethode und des Alters der Bäume sind möglich).

In diesem Beispiel ist die Sorte von Mitte bis Ende Oktober reif.

### Wie werden die Grafiken der Safteigenschaften gelesen?

Datenverteilung der Sorte (jeder Punkt stellt eine untersuchte Probe dar)



Datenverteilung ALLER Sorten (je breiter die Fläche, desto mehr Proben mit gleichem Wert)

Letzte Aktualisierung der Daten: Dezember 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
**Agroscope**