



Bohnapfel


Spezialmostapfel

Herkunft: Zufallssämling, Niederrhein (D, ca. 1760)

Erfahrungswerte CH: hoch

Baum & Produktion


Sorte vs. Ø alle Sorten



- Blütezeit mittelfrüh, Pollen schlecht (triploid)
- Ertrageeintritt spät, Erntefenster lang, kaum Vorerntefruchtfall, ausgeprägte Alternanz
- Wuchs aufrecht, Krone kugelig, reichlich verzweigt
- Für Hochstammanbau geeignet
- Für intensive Mostobstanlagen nicht geeignet

Anfälligkeit

Sorte vs. Ø alle Sorten



- Relativ frosthart
- Besonders auf nassen, schweren Böden krebsanfällig
- Allgemein robuste Sorte



FAZIT

Vorteile

- + Wüchsige, kugelige und stabile Krone
- + Robuste Sorte
- + Viel Erfahrung in der CH






Nachteile

- Nicht für intensive Mostobstanlagen oder Niederstammerziehung geeignet
- Alternanz und später Ertrageeintritt

Erntefenster & Safteigenschaften

E.	A.	M.	E.	A.	M.	E.	A.
Aug	Sep	Sep	Sep	Okt	Okt	Okt	Nov

Sorte vs. alle Sorten



Eignung der Sorte

Traditionelle Mostobstsorte, verbreitet in Hochstammanlagen



Erläuterungen Sortenblätter

Wie werden die Piktogramme gelesen?

Die Früchte eignen sich als:



Tafelobst



Mostobst

Die Sorte eignet sich für:



Niederstammanbau




Die Eignung dieser Sorte als Hochstamm ist noch unklar

Hochstammanbau

Wie werden die Spinnen-Diagramme gelesen?

Der rote Bereich stellt die **Eigenschaften der beschriebenen Sorte** dar. Als Vergleich dazu bildet der graue Bereich die **durchschnittlichen Eigenschaften ALLER** in dieser Broschüre dargestellten Sorten ab.



Baum & Produktion

Eigenschaft	1	3	5	7	9
Ertrag	sehr schwach	ungenügend	genügend	hoch	sehr hoch
Alternanz	keine	gering	mässig	stark	sehr stark
Wuchsstärke	sehr schwach	schwach	mittel	stark	sehr stark
Kronengrösse	sehr klein	klein	mittel	gross	sehr gross
Kronenstabilität	sehr schlecht	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Garnierung	sehr schwach	schwach	mittel	stark	sehr stark

Anfälligkeit

1	2	3	5	7	9
resistant (Gen)	robust	schwach	mittel	hoch	sehr hoch

Wie werden die Erntefenster gelesen?

Die Monate sind in drei Abschnitte unterteilt (A=Anfang, M=Mitte und E=Ende).




Die **roten Felder** stellen dar, in welchem Zeitraum die Früchte erntereif sind (Abweichungen aufgrund des Mikroklimas, der Höhenlage sowie der Anbaumethode und des Alters der Bäume sind möglich).

In diesem Beispiel ist die Sorte von Mitte bis Ende Oktober reif.

Wie werden die Grafiken der Safteigenschaften gelesen?

Datenverteilung der Sorte (jeder Punkt stellt eine untersuchte Probe dar)



Datenverteilung ALLER Sorten (je breiter die Fläche, desto mehr Proben mit gleichem Wert)

Letzte Aktualisierung der Daten: Dezember 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope