


Belmonda

| Kartoffeln | Pommes de terre |
|-----------------------------|---|
| Speisesorte | Variété de consommation |
| Reifegruppe | mittelpät / mi-tardive |
| Züchter | Solana (D) |
| Abstammung | Marabel × Leyla |
| Aufnahme in die Sortenliste | 2020 |
| Vertreter | swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley |
| | Représentant |



1. Morphologische Merkmale

| | | |
|----------------|---|--|
| Knolle | Form Grösse Augen Fleischfarbe Schale | kurzoval bis langoval eher grossfallend flach, z. T. rötlich gelb gelb |
| Stängel | hoch, mitteldeckend, ohne Pigmentierung | |
| Blatt | mittel, grün bis hellgrün | |
| Blüten | lilafarbig, mittel- bis schwachblühend | |

1. Caractères morphologiques

| | | |
|------------------|--|---|
| Tubercule | forme taille yeux chair peau | oblongue courte à oblongue plutôt grande superficiels, parfois rougeâtres jaune jaune |
| Tige | de taille haute, mi-étalée, sans pigmentation | |
| Feuille | moyen, vert franc à clair | |
| Fleur | mauve, rare à moyenne | |

Belmonda

| 2. Werteigenschaften | |
|----------------------|--------------------------------|
| Ertrag | hoch |
| Kalibrierausbeute | hoch |
| Stärkegehalt | mittel (14–16 %) |
| Stärkeertrag | mittel |
| Kochtyp | B |
| Verfärbungen | roh: gering gekocht: gering |
| Reduzierende Zucker | hoch |
| Verarbeitungseignung | keine |
| Vorkeimdauer | 4–5 Wochen |

| 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques | |
|--|---|
| Rendement | élevé |
| Calibre commercial | élevé |
| Teneur en amidon | moyenne (14–16 %) |
| Rendement amidon | moyen |
| Type culinaire | B |
| Altération de la couleur | chair crue: faible chair cuite: faible |
| Taux de sucres réducteurs | élevé |
| Utilisation technologique | néant |
| Prégermination | 4–5 semaines |

| 3. Anfälligkeit | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Krebs | nicht anfällig 1 |
| Nematoden | nicht anfällig ($Ro_{1,4}$) |
| Krautfäule | mittel |
| Knollenfäule | mittel |
| Flachschorf | gering |
| Pulverschorf | mittel |
| Eisenfleckigkeit | gering bis mittel |
| Blattroll | gering |
| Virus Y | hoch (etwas Y^{NTN}) |
| Schlagempfindlichkeit | gering bis mittel |

| 3. Sensibilités | |
|------------------------|---------------------------|
| Galle verruqueuse | résistante 1 |
| Nématodes | résistante ($Ro_{1,4}$) |
| Mildiou des fanes | moyenne |
| Mildiou des tubercules | moyenne |
| Gale commune | faible |
| Gale poudreuse | moyenne |
| Taches de rouille | faible à moyenne |
| Virus de l'enroulement | faible |
| Virus Y | élevé (un peu Y^{NTN}) |
| Sensibilité aux chocs | faible à moyenne |

| 4. Besondere Hinweise | |
|--|--|
| Die Knollen sind keimruhig. | |
| Die Sorte ist mittelanfällig auf ein Ergrünen der Knollen. | |

| 4. Remarques particulières | |
|--|--|
| Belmonda a une bonne dormance. | |
| Elle est moyennement sensible au verdissement. | |

Belmonda ist eine mittelspäte Sorte.

Belmonda est une variété mi-tardive.