



Fiche variétale

Haroma

Origine: President x Auerbacher. Hohenheim, Allemagne

Fruit

Pruneau bleu foncé à violet, de calibre homogène, pruline. Aspect très attractif et homogène. Chair orange lumineuse, ferme et juteuse. Bon équilibre sucre/acidité. Très savoureux. Noyau semi-adhérent, voire très adhérent. Haroma se prête également à la distillation.

Culture

Arbre

Vigueur moyenne à faible, très bonne ramification, feuillage sain, mais légèrement sensible à Pseudomonas. Le bois fruitier doit être taillé court, afin d'assurer une structure équilibrée de l'arbre et de contrôler la charge.

Floraison et pollinisation

Haroma est autofertile, de floraison précoce à mi-précoce.

Potentiel de production

Rendements précoces et potentiel de production très élevé. Des rendements trop élevés affectent toutefois le calibre et la qualité du fruit: un fort éclaircissage est donc indispensable.

Sensibilité

Sensible à la moniliose, au flétrissement, à l'éclatement autour du pédoncule et à Pseudomonas.

Récolte


Maturité: 6^{ème} à 7^{ème} semaine de la saison des pruneaux, environ une semaine après Fellenberg. Les fruits ayant tendance à se déchirer autour du pédoncule, il faut les cueillir avec précaution en conservant le pédoncule.

Résumé

Haroma convainc par son bel aspect, sa saveur intense ainsi que par ses rendements élevés et réguliers. Ses points faibles sont sa tendance à se déchirer autour du pédoncule au moment de la récolte, sa sensibilité au flétrissement et à la moniliose, ainsi que la forte adhérence du noyau à la chair.



Haroma: surcharge importante nécessitant un éclaircissage.



Déchirement autour du pédoncule.


Diamètre [mm]



Fermeté [Durofel 25]



Brix



Qualité des fruits: les graphiques montrent les plages de valeurs issues de mesures antérieures, la variété n'est actuellement plus en cours d'évaluation.