

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

F. FREY, M. MENZI, F. WEILENMANN, H. WINZELER und M. WINZELER,
Eidgenössische Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, CH-8046 Zürich-Reckenholz

Die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Zürich-Reckenholz und Nyon/Changins prüfen neue Getreide- und Maissorten in ihren Hauptversuchen jeweils während dreier Jahre an mehreren Anbauorten auf agronomische Eigenschaften (Ertrag, Standfestigkeit usw.), Qualität und Krankheitsresistenz. Bei den Getreide-Hauptversuchen werden weder Fungizide noch Halmverkürzer eingesetzt. Die 1. N-Gabe basiert auf Nmin-Untersuchungen; alle weiteren erfolgen nach ortsüblichem Düngungsplan. Damit die Untersuchungen auf ähnlichen Bestandesdichten basieren, wird die Saatmenge der Sorten aufgrund des Tausendkorngewichtes (TKG) und der Keimfähigkeit ausgeglichen. Sorten, welche sich für den Anbau unter schweizerischen Verhältnissen besonders eignen, werden dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) aufgrund der Resultate für die Aufnahme in die Offizielle Sortenliste empfohlen. Diese Vorschläge werden nach Anhören der Fachkommission (FAKO) vom BLW (Futtergetreide) bzw. von der Eidg. Getreideverwaltung (Brotgetreide) bearbeitet und an das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD) weitergeleitet. Dieses Departement veröffentlicht alljährlich die Offizielle Sortenliste für Feldgewächse. Für den Handel mit Getreide- und Maissaatgut ist die Offizielle Sortenliste bindend, d.h. nur Saatgut von Sorten, welche in der Sortenliste eingetragen sind, darf zertifiziert und in den Handel gebracht werden. Von dieser Regelung ausgenommen ist einzig



Abb. 1. Hauptversuch 1988 mit 25 Winterweizensorten auf dem Gutsbetrieb der Anstalt Realta, Cazis GR.

Saatgut zu Grünschnittzwecken, sofern es ausdrücklich als solches bezeichnet wird.

Die neueste Ausgabe der Sortenliste erscheint gegenüber früheren in veränderter Form. Die neue Darstellung enthält wesentlich mehr Informationen. Die Beschreibung der Sorten basiert auf den jeweiligen Hauptversuchsperioden, in denen die Sorten geprüft wurden; in vielen Fällen erfolgte eine Anpassung der Ausprägungsstufen der Merkmale aufgrund von Resultaten aus neueren Hauptversuchen.

Die vorliegende Zusammenstellung ist somit das Ergebnis eines aktuellen Sortenvergleiches.

Folgende Sorten wurden im Jahr 1988 in die Sortenliste aufgenommen:

Winterroggen: Eho
Wintergerste: Narcis, Nefta
Sommergerste: Hockey
Sommerhafer: Adamo

Mais: Aviso, Rantzo, DK 250, Anjou 29, Valeria

Züchterverzeichnis

| | |
|-------|--|
| A/1 | Dr. Lasser, Kärntner Saatbau-Genossenschaft, A-9020 Klagenfurt |
| A/2 | Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof, A-3910 Zwettl |
| B/1 | Station d'Amélioration des Plantes, rue du Bordia 4, B-5800 Gembloux |
| B/2 | Clovis N. V. Matton, Kaaistraat 5, B-8581 Avelgem-Kerkhove |
| B/3 | SES Société Européenne de Semences SA, Industriepark 15, B-3300 Tienen |
| CH/1 | Eidg. Forschungsanstalt für landw. Pflanzenbau, CH-8046 Zürich-Reckenholz |
| CH/2 | Eidg. Forschungsanstalt für landw. Pflanzenbau, CH-8046 Zürich-Reckenholz und Station fédérale de recherches agronomiques, CH-1260 Nyon/Changins |
| CH/3 | Eidg. Forschungsanstalt für landw. Pflanzenbau, CH-8046 Zürich-Reckenholz in Zusammenarbeit mit Herrn A. Bättig, CH-6221 Rickenbach |
| CH/4 | Landsorte aus dem Gebiet Rothenbrunnen, Kanton Graubünden, Schweiz |
| CH/5 | Ciba-Geigy AG, Postfach, CH-4002 Basel |
| D/1 | Dr. H. Hege, Domäne Hohebucht, D-7112 Waldenburg |
| D/2 | F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 1311, D-3103 Bergen |
| D/3 | W. von Borries-Eckendorf OHG, Postfach 1206, D-4817 Leopolds-höhe 3 |
| D/4 | Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft, Elisabethenstrasse 38, D-8000 München 40 |
| D/5 | Engelen-Büchling OHG, Saatzucht, D-8441 Oberschneiding-Büchling |
| D/6 | KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, D-3352 Einbeck |
| D/7 | Semundo Saatzucht GmbH, Siemensstr. 45, D-2084 Rellingen |
| D/8 | UNI Hohenheim, Abt. Maiszüchtung der Landessaatzuchstanstalt, D-7000 Stuttgart 70 |
| F/1 | Etablissements Momont-Henette, rue Marlinval 7, F-59246 Mons-en-Pévèle |
| F/2 | Ets Desprez & Fils, Cappelle, F-59242 Templeuve |
| F/3 | Verneuil Recherches, F-77390 Verneuil-L'Etang |
| F/4 | INRA, 149, rue de Grenelle, F-75007 Paris |
| F/5 | Société RAGT, F-12003 Rodez-Cedex |
| F/6 | Rustica Semences, Mondonville, F-31700 Blagnac |
| F/7 | SICA LG Services, BP 115, F-63203 Riom — Cedex |
| F/8 | France-Canada Semences, Champigny-en-Beauce, F-41330 La Chapelle-Vendômoise |
| F/9 | Coopérative de Pau, F-64003 Pau — Cedex |
| F/10 | Groupe Limagrain, BP 115, F-63203 Riom — Cedex |
| F/11 | Pioneer France, F-41290 Oucques |
| F/12 | Mais Angevin, Saint-Mathurin, F-49250 Beaufort-en-Vallée |
| F/13 | ASGROW France, avenue Félix-Louat, F-60304 Senlis — Cedex |
| GB/1 | Plant Breeding Institute Maris Lane, Trumpington, UK-Cambridge CB2 2 LF |
| GB/2 | Nickerson Rothwell Plant Breeders Ltd, Rothwell, UK-Lincolnshire LN7 6DT |
| I/1 | Società Polesana, Produttori Sementi, I-Badia Polesine |
| I/2 | DEKALB Italia S.p.A, Corso del Popolo 58, I-30172 Mestre (VE) |
| I/3 | KWS Italia, Via del Borgo 132, I-40126 Bologna |
| NL/1 | Cebeco — Handelsraad, Postbus 182, NL-3000 AD Rotterdam |
| NL/2 | De Samenwerkende Graankweekbedrijven, Wiersum-Zelder, NL-9717 BD Groningen |
| NL/3 | Semundo B.V., Postbus 29970, NL-9970 AA Ulrum |
| PL/1 | Station de Chorin, P.O. Box, PL-05-660 Warka |
| PL/2 | Poznańska Hodowla Roślin, Dział Hodowli Zvóz, PL-00-930 Warszawa |
| S/1 | W. Weibull AB, Box 520, S-26124 Landskrona |
| YU/1 | Institute for Agricultural Research, YU-41000 Zagreb |
| YU/2 | Institute for Agricultural Research, YU-Nov Sad |
| USA/1 | Pioneer Overseas Corporation, 6800 Pioneer Parkway, Johnston, Iowa 50131/USA |

Ins Provisorium versetzt (mit 2-jähriger Übergangsfrist) wurden folgende Sorten:

| | Saatgutverkauf noch zulässig bis: |
|------------------------|-----------------------------------|
| Winterweizen : | |
| Tambo | 30.6.1990 |
| Carimulti | 30.6.1990 |
| Winterroggen : | |
| Cadi | 30.6.1990 |
| Wintergerste : | |
| Marylin | 30.6.1990 |
| Sommergerste : | |
| Iban | 30.6.1990 |
| Sommerhafer : | |
| Borrus | 30.6.1990 |
| Tell | 30.6.1990 |
| Winterhafer : | |
| Peniarth | 30.6.1990 |
| Mais : | |
| Beaupré Pau 205 | 30.6.1989 |
| Bastion | 30.6.1990 |
| Blizzard G 188 | 30.6.1990 |
| Buras LG 5 | 30.6.1990 |
| Brenta | 30.6.1990 |
| Eldor | 30.6.1990 |

Zur Entlastung der Tabellen erscheint das Züchterverzeichnis ausserhalb (Kasten links) der Zusammenstellung. Für die Beschreibung der Sorten wurden die in der nachfolgenden Legende aufgeführten Zeichen und Abkürzungen verwendet.

Legende

| Ähren- bzw. Rispenschieben : | Pflanzenlänge : |
|---------------------------------|-----------------|
| sfr : sehr früh | sl : sehr lang |
| fr : früh | l : lang |
| mfr : mittelfrüh | m : mittel |
| msp : mittelpät | k : kurz |
| sp : spät | sk : sehr kurz |

Bei den übrigen Eigenschaften bedeuten:

- +++ : sehr gut
- ++ : gut
- + : genügend
- : ungenügend
- : schlecht
- : sehr schlecht

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

| Sortenname | Züchter | Aufnahme in die Sortenliste | Preis-Klasse | Agronomische Eigenschaften | | | | TKG (Tausend-korn/gew.) | Protein-gehalt | Krankheits - Resistzenzen | | | | Bemerkungen |
|--|---------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | Körner-ertrag | Stand-festigk. | Ähren-schien | Pflanzen-länge | | | Mehltau | Gelbst | Braunrost | Halmbruch | |
| A. BROTTREIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Winterweizen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Probus | CH/1 | 1948 | Ia | - | -- | m fr | s | - | 35-40 | +++ | - | - | - | +++ |
| 2. Zenith | CH/2 | 1969 | II | ++ | ++ | m fr | m | ++ | 33-38 | + | ++ | - | - | + |
| 3. Hardi | F/1 | 1978 | III | - | ++ | fr | k | + | 34-37 | -- | ++ | - | - | + |
| 4. Zlatna Dolina (Valle d'Oro) | YU/1 | 1978 | III | + | - | s fr | s k | + | 30-34 | - | +++ | + | - | nur für die Südschweiz |
| 5. Zenta | CH/2 | 1979 | Ib | ++ | ++ | m fr | k | + | 36-39 | + | ++ | - | - | - |
| 6. Eiger | CH/2 | 1980 | Ib | ++ | +++ | m fr | k | +++ | 33-38 | ++ | + | - | - | ++ |
| 7. Sardona | CH/2 | 1980 | (prov.) | ++ | + | m fr | | - | 34-37 | ++ | ++ | - | - | ++ |
| 8. Arina | CH/2 | 1981 | Ic | +++ | - | m fr | | + | 34-38 | ++ | - | - | - | +++ |
| 9. Partizanka | YU/2 | 1981 | Ib | ++ | ++ | s fr | s k | + | 35-40 | +++ | - | - | - | -- |
| 10. Bernina | CH/2 | 1983 | IV | +++ | - | m fr | m | + | 33-40 | -- | +++ | - | - | + |
| 11. Asiago | I/1 | 1985 | II | ++ | ++ | fr | k | + | 34-38 | + | +++ | - | - | nur für die Südschweiz |
| 12. Lena | F/2 | 1986 | III | +++ | ++ | fr | s k | + | 37-46 | ++ | +++ | ++ | ++ | begrannzt |
| 13. Forno | CH/2 | 1986 | II | +++ | ++ | fr | k | + | 39-45 | ++ | +++ | + | - | Fahnensblatt neigt zu Spitzendürre |
| 14. Garmil | CH/2 | 1987 | (prov.) | +++ | ++ | m fr | m | ++ | 33-37 | ++ | +++ | - | ++ | begrannzt |
| II. Sommerweizen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Käntner Frühweizen | A/1 | 1958 | Ib | + | -- | s fr | s | - | 39-42 | + | -- | -- | -- | -- |
| 2. Calanda | CH/2 | 1979 | Ia | - | - | fr | m | - | 33-34 | +++ | - | -- | ++ | für Anbau in Grenzlagen, rote Ährenfarbe |
| 3. Walter | S/1 | 1980 | II | - | + | sp | m | + | 27-33 | - | ++ | -- | -- | begrannzt |
| 4. Hermes | D/1 | 1982 | II | ++ | + | sp | m | ++ | 33-37 | -- | ++ | - | -- | bevorzugt frühe Saat |
| 5. Orello | CH/2 | 1982 | Ib | + | - | m fr | | - | 39-44 | ++ | ++ | - | - | rote Ährenfarbe |
| 6. Besso | CH/2 | 1982 | II | ++ | + | fr | m | ++ | 33-39 | + | - | - | - | rote Ährenfarbe |
| 7. Albis | CH/2 | 1983 | Ib | ++ | + | m fr | k | + | 32-34 | ++ | - | - | - | + |
| 8. Dadora | CH/2 | 1984 | Ib | ++ | + | m fr | m | + | 30-35 | +++ | - | ++ | - | bevorzugt frühe Saat |
| 9. Remia | CH/2 | 1986 | Ib | +++ | + | sp | m | + | 36-39 | ++ | ++ | ++ | ++ | -- |
| 10. Frissal | CH/2 | 1987 | Ib | +++ | + | fr | k | + | 33-35 | ++ | ++ | ++ | ++ | - |

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

| Sortenname | Züchter | Aufnahme in die Sortenliste | Agronomische Eigenschaften | | | | TKG (Tausend-Körngew.) | Protein-gehalt | Krankheits - Resistzenzen | | | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|
| | | | Körner-ertrag | Stand-festigkeit | Ähren-schieren | Pflanzen-länge | | | Mehltau | Geblrost | Braun-rost | Halm-bruch |
| III. Korn (Dinkel, Spelz) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Oberkulmer Rotkorn | CH/1 | 1948 | + | - | m fr | s l | 95-115* | +++ | + | ++ | ++ | * Tausendfesengewicht |
| 2. Altgold Rotkorn | CH/3 | 1952 | ++ | + | m fr | l | 80-110* | +++ | - | + | + | |
| 3. Ostro | CH/1 | 1978 | ++ | - | m fr | s l | 100-125* | +++ | - | ++ | ++ | |
| IV. Winterroggen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rothenbrunner | CH/4 | 1948 | | | | | | | | | | |
| 2. Danko | PL/1 | 1983 | + | ++ | m fr | l | + | 29-33 | + | - | | |
| 3. Echo | A/2 | 1988 | ++ | + | m fr | l | ++ | 30-35 | + | - | | |
| B. FUTTERGETREIDE | | | | | | | | | | | | |
| I. Tritcale | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lasko | PL/2 | 1983 | + | - | m fr | l | + | 31-39 | + | +++ | +++ | |
| 2. Dagro | PL/2 | 1987 | + | + | m fr | l | + | 37-46 | + | +++ | +++ | |
| II. Wintergerste | | | | | | | | | | | | |
| 1. Gerbel | F/2 | 1978 | + | + | m fr | m | ++ | 31-42 | + | - | - | mehrzeilig |
| 2. Hasso | D/2 | 1981 | + | + | m fr | l | ++ | 32-40 | ++ | - | ++ | mehrzeilig |
| 3. Mammut | D/3 | 1985 | + | + | m fr | m | +++ | 32-40 | ++ | + | -- | mehrzeilig |
| 4. Triton | B/1 | 1987 | +++ | ++ | fr | l | +++ | 34-45 | + | -- | ++ | mehrzeilig |
| 5. Narcis | B/2 | 1988 | +++ | + | s fr | m | ++ | 33-40 | +++ | - | + | mehrzeilig |
| 6. Nefta | F/3 | 1988 | ++ | +++ | s fr | k | + | 41-46 | ++ | + | - | zweizeilig |
| III. Winterhafer | | | | | | | | | | | | |
| 1. Maris Quest | GB/1 | 1972 | + | ++ | m fr | l | - | 33-36 | ++ | ++ | | Anbau nur in milden Lagen |

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

| Sortenname | Züchter | Aufnahme in die Sortenliste | Agronomische Eigenschaften | | | | TKG ("tausend-Korngew.) | Protein-gehalt | Krankheits - Resistzenzen | | | Eignung für Grünschnittnutzung | | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Körner-ertrag | Stand-festigkeit | Ähnen-schleben | Pflanzen-länge | | | Menitau | Heimintho-sporium | Rhyncho-sporium | Ertrag in Reisensaat | Ertrag im Gemenge | |
| IV. Sommergerste | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Cornel | NL/1 | 1979 | + | + | m fr | m | 39-41 | ++ | -- | - | - | + | | |
| 2. Patty | F/2 | 1983 | ++ | ++ | m sp | k | 37-42 | ++ | - | - | - | - | | |
| 3. Bellona | NL/1 | 1985 | ++ | +++ | m fr | k | 38-41 | ++ | + | - | - | - | | |
| 4. Filka | F/2 | 1987 | ++ | +++ | m fr | l | 48-50 | + | ++ | + | + | + | | |
| 5. Golf | GB/2 | 1987 | +++ | ++ | m sp | k | 40-43 | + | ++ | ++ | ++ | + | | |
| 6. Hockey | GB/2 | 1988 | +++ | ++ | m fr | k | 37-42 | + | ++ | ++ | ++ | + | | |
| V. Sommerhafer | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sirene | F/4 | 1981 | + | + | fr | k | 26-30 | ++ | | | | - | - | |
| 2. Dula | NL/2 | 1982 | ++ | ++ | m fr | l | 25-30 | + | | | | - | Weisshafer | |
| 3. Pirol | D/4 | 1982 | ++ | ++ | fr | l | 27-33 | + | +++ | | | ++ | Weisshafer | |
| 4. Flämingsgold | D/2 | 1984 | ++ | + | m fr | m | 26-30 | + | + | | | ++ | Gelbhafer | |
| 5. Panther | D/5 | 1987 | ++ | ++ | fr | l | 25-31 | + | ++ | | | ++ | Weisshafer | |
| 6. Adamo | NL/3 | 1988 | +++ | + | m fr | m | 27-33 | + | ++ | | | + | Weisshafer | |




Abb. 2. Die Roggensorte EHO aus Österreich wurde 1988 in der Schweiz erstmals vermehrt (Vermehrungsfeld im Kanton Solothurn).



Abb. 3. Triticalefeld im zürcherischen Weinland kurz vor der Abreife.

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

Hybridtyp bei Mais:
SC : Einfachhybride (Single Cross)
TC : Dreieghybride
 (Threeway Cross)

DC : Doppelhybride (Double Cross)
mSC : modifizierte Einfachhybride
 (modified Single Cross)

KM : als Körnermais
SM : als Silomais
KM : hauptsächlich als Körnermais
SM : hauptsächlich als Silomais

| Sortenname | Hybridtyp | Züchter | Aufnahme in die Sortenliste | Körnerertrag | Körnerreife | Jugendentwicklung | Standfestigkeit | | Resistenz gegen Beulenbrand | Resistenz gegen Stengelfäule | Verwendung | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Wurzellagerung Vegetation | Wurzellagerung bei Ernte | | | | | | | | | | | | |
| C. MAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorten als Hauptkultur nördlich der Alpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Früh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Issa G-4083 | SC | CH/5 | 1986 | + | +++ | - | +++ | ++ | -- | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 2. Kéo | TC | F/5 | 1981 | + | ++ | ++ | ++ | + | + | - | KM, SM | | | | | | | | | |
| 3. Alpine | DC | D/6 | 1987 | ++ | + | ++ | ++ | + | +++ | - | KM, SM | | | | | | | | | |
| 4. Aviso | TC | F/6 | 1988 | ++ | + | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | KM | | | | | | | | | |
| 5. Félix | SC | D/7 | 1984 | + | - | +++ | +++ | + | -- | - | KM, SM | | | | | | | | | |
| Mittelfrüh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. LG 2980 | TC | F/7 | 1987 | ++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 7. Atlet | DC | D/6 | 1987 | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 8. Caribou | TC | F/8 | 1987 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 9. Karat | TC | D/8 | 1987 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 10. Leader Pau 207 | TC | F/9 | 1982 | ++ | + | +++ | ++ | ++ | - | -- | KM, SM | | | | | | | | | |
| 11. Mutin | TC | D/6 | 1980 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | KM, SM | | | | | | | | | |
| Mittelspät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sil (Anjou 18) | TC | F/10 | 1980 | ++ | +++ | - | ++ | ++ | +++ | +++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 13. Circé (LG 9) | DC | F/7 | 1978 | ++ | +++ | + | + | +++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 14. Golda | TC | B/3 | 1986 | +++ | ++ | ++ | ++ | - | - | + | SM | | | | | | | | | |
| 15. LG 11 | TC | F/7 | 1974 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 16. Mona | SC | F/11 | 1986 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 17. Tukano | SC | CH/1 | 1983 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | KM, SM | | | | | | | | | |
| 18. Pau 256 | DC | F/9 | 1983 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 19. Rantzo | SC | F/6 | 1988 | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | + | KM, SM | | | | | | | | | |
| 20. DK 250 | SC | F/5 | 1988 | ++ | + | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |
| 21. Anjou 256 | SC | F/12 | 1976 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM | | | | | | | | | |

Offizielle Sortenliste im Getreidebau 1988/1989

| Sortenname | Hybridtyp | Züchter | Aufnahme in die Sortenliste | Körnerertrag | Körnerreife | Jugendent- wicklung | Standfestigkeit | | | Resistenz gegen Stengelfäule | Verwendung |
|---|-----------|---------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | Vegetation | Wurzelagierung bei Ernte | Stengel- bruch bei Ernte | | |
| Mittelspät (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 22. Arikana | mSC | CH/1 | 1987 | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | KM, SM |
| 23. LG 2250 | TC | F/7 | 1987 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | KM, SM |
| 24. Zerta | TC | D/6 | 1987 | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM |
| 25. Anjou 29 | TC | F/10 | 1988 | ++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | KM, SM |
| 26. Dea | SC | F/11 | 1983 | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | KM, SM |
| 27. Adonis Pau 8213 | SC | F/9 | 1987 | +++ | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | KM, SM |
| Spät | | | | | | | | | | | |
| 28. Vivas | TC | D/6 | 1987 | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | KM, SM |
| 29. Baron | DC | F/5 | 1984 | ++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | KM, SM |
| 30. Orla 312 | SC | CH/1 | 1972 | +++ | + | ++ | ++ | + | + | +++ | KM, SM |
| Sorten als Hauptkultur südlich der Alpen | | | | | | | | | | | |
| Mittelfrüh | | | | | | | | | | | |
| 30. Orla 312 | SC | CH/1 | 1972 | + | +++ | ++ | + | ++ | + | ++ | KM, SM |
| 31. Brio RX 42 | SC | F/13 | 1980 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | KM, SM |
| 32. Eva | SC | USA/1 | 1987 | +++ | + | +++ | +++ | +++ | ++ | + | KM, SM |
| Mittelsspät | | | | | | | | | | | |
| 33. Valeria | SC | USA/1 | 1988 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | KM, SM |
| 34. Rex Dekalb | SC | I/2 | 1983 | ++ | + | +++ | - | +++ | ++ | +++ | KM, SM |
| Spät | | | | | | | | | | | |
| 35. Roberta | SC | USA/1 | 1987 | +++ | + | ++ | - | +++ | +++ | ++ | KM, SM |
| 36. Mirac | SC | I/3 | 1981 | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | KM, SM |