

Liste recommandée des variétés de triticales pour la récolte 2002

J.-F. COLLAUD, R. SCHWÄRZEL et M. BERTOSSA, Station fédérale de recherches en production végétale de Changins, CH-1260 Nyon

M. MENZI et M. ANDERS, Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Reckenholz, CH-8046 Zurich

E-mail: jean-francois.collaud@rac.admin.ch
Tél. (+41) 22/36 34 444.

La liste recommandée des variétés de **triticales** n'a pas subi de changement par rapport à l'année passée et comprend cinq variétés: Timbo, Prader, Trimaran, Tridel et Trado. Cette dernière est une variété «alternative», qui peut se semer soit en automne, soit au printemps. Son potentiel de rendement est toutefois plus élevé en semis d'automne.

Notons que les variétés hybrides Delrac et Hybridel, déjà inscrites au Catalogue national, ne figurent toujours pas dans la liste recommandée, faute de semence. La multiplication est

actuellement bloquée, car le gamétocide nécessaire à la production de semences n'est pas encore autorisé.

Concernant la triticales de printemps, on sait que des variétés prometteuses ont réussi les tests de la VAT (valeur agronomique et technique) en 2000. Les tests de DHS (distinction, homogénéité et stabilité) n'étant pas encore terminés, ces variétés ne peuvent pas être inscrites au Catalogue national et donc sur la liste recommandée.

Liste recommandée des variétés de triticales pour la récolte 2002

Type Variété	hiver				hiver-printemps
	TIMBO	PRADER	TRIMARAN	TRIDEL	TRADO ¹
Année d'homologation	1998	1997	1995	1994	1998
Rendement	+++	+++	++	++	++
Poids/hl	+	+	Ø	Ø	++
Verse	-	++	-	++	+
Précocité à l'épiaison	p	p	p	mp	mp
Précocité à la récolte	p	p	mp	p	p
Hauteur des plantes	ml	ml	l	mc	c
Oïdium	+++	+++	+++	+++	+++
Rouille jaune ²	++	+	++	++	++
Rouille brune	-	+++	--	+++	+++
Septoriose sur feuilles	+++	+	++	Ø	++
Septoriose sur épis	+	Ø	++	++	+
Fusariose sur épis	+	+	++	+	+
Germination sur pied	-	Ø	Ø	+	+
Teneur en protéines	Ø	Ø	--	+	+
PMG	p	m	p	m	p

D'après les données des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz.

Légende: +++ = très bon - = moyen à faible
++ = bon -- = faible
+ = moyen à bon --- = très faible
Ø = moyen

Poids de 1000 grains (PMG): p = petit; m = moyen; g = grand
Précocité: tp = très précoce; p = précoce; mp = mi-précoce; mt = mi-tardif; t = tardif
Hauteur des plantes: c = courte; mc = moyenne à courte; m = moyenne; ml = moyenne à longue; l = longue; tl = très longue

¹Trado possède un potentiel de rendement inférieur en semis de printemps (valeur indiquée = semis d'automne).

²Une nouvelle race de rouille jaune semble avoir fait son apparition dans certaines régions de Suisse en 2001. En présence de cette nouvelle race, la sensibilité des variétés peut être différente de celle qui est décrite ici (examens en cours).