

Bureau de conseils cheval, Haras national suisse

Laisser les crottins sur les prés?

On reconnaît les pâtures pour chevaux à leur croissance hétérogène: des zones pâturées jusqu'à la racine alternent avec des touffes d'herbes hautes et des mauvaises herbes. Les chevaux évitent, si possible, de brouter à proximité de leurs crottins, une stratégie qui leur permet d'échapper aux infestations par des parasites. On se demande souvent si le mécanisme d'autorégulation suffit à limiter les infestations. Le ramassage régulier des crottins et une stratégie de vermifugation correcte semblent être la bonne formule pour une pâture paisible.



Refus, endroits où les orties trouvent des conditions optimales
Geilstellen, ideale Wachstumsbedingungen für Brennnesseln!

Le pâturage est l'habitat originel du cheval, répondant à son besoin de beaucoup d'air, de soleil, de mouvement, de contact social et à une ingestion d'aliments constante. Si on les compare avec l'habitat naturel du cheval, les pâturages actuels sont de petite taille. Les parasites, par les fréquents changements d'effectifs de chevaux, s'y propagent de manière idéale.

Que se passe-t-il lorsque les crottins ne sont pas ramassés?

Contrairement à d'autres animaux qui pâturent, les chevaux ont l'habitude de crotter à des endroits bien précis, qu'on appelle des zones de refus. Les éléments nutritifs s'y amassent, et les orties ou renoncules y trouvent des conditions de vie optimales. Malheureusement, ces plantes ne sont pas

les plantes fourragères les plus appréciées, elles peuvent donc croître sans être consommées. Au contraire, la jeune herbe est pâturée jusqu'à la racine et est supplantée par les pâquerettes ou le plantain qui résistent à un broutage intensif. Par conséquent, si les crottins ne sont pas ramassés régulièrement, les mauvaises herbes se propagent et supplantent les plantes fourragères.

L'herbe, un habitat pour les larves

Les conditions de vie idéales pour les larves sont des nuits douces et des rosées matinales estivales. En cette saison, la quantité des parasites est très élevée; certains vers produisent des œufs dans l'intestin du cheval qui sont ensuite évacués avec leurs crottins. En l'espace de 1-3 jours - parfois même de

quelques heures -, si les conditions sont favorables, ceux-ci se transforment en larves et quittent le crottin. Ces larves rampent sur des brins d'herbe qui sont ensuite ingérés par le cheval. Un ascaride peut déposer en une journée jusqu'à 100'000 œufs! Sur une petite surface de pâture, le risque d'infestation est très élevé en peu de temps.

Stratégie de lutte contre les vers

Un plan de vermifugation correct, ainsi qu'une hygiène des pâtures optimale, sont primordiaux afin de lutter efficacement contre les vers. Dans les écuries où le fumier est mal évacué, on trouve également des larves pouvant se développer, même si les pâturages demeurent les principales sources d'infestation. Le ramassage quotidien des crottins prend beaucoup de temps durant la saison des pâtures. L'enlèvement manuel est un travail intensif, toutefois c'est une méthode efficace pour lutter contre les parasites des pâturages (entéroparasites).

Le fauchage ou le broyage régulier des refus, suivi d'un ramassage de ces mêmes refus, ainsi que du fumier, permet l'élimination des conditions de vie idéales des larves. A pâture saine, chevaux sains!

Brigitte Strickler
Bureau de conseils cheval

Conseils

- Passer la herse à prairie est une mesure inutile. Les crottins et les parasites seront disséminés sur toute la surface.
- Ne pas épandre de fumier non composté
- Vermifuger les nouveaux arrivants quelques jours avant l'intégration dans un troupeau.
- Ramasser quotidiennement le crottin sur les pâturages
- Fumure des pâturages avec de la chaux. Les œufs et les larves seront efficacement vaincus