

Pommes de terre – Kartoffel 2012 | Mars März 2013



Rapport essais préliminaire nouvelles variétés de pommes de terre 2012

Bericht über die Vorversuche mit neuen Kartoffelsorten 2012

Auteurs

R. Schwaerzel et J.-M. Torche, Agroscope



Conditions de production

La plantation a été échelonnée à cause d'une période bien perturbé en avril et mai. L'alternance entre journées chaudes et risque de gel ont marqué le début de végétation en mai avec des pluies intermittentes.

Les sols sont restés très froides pendant longtemps et les cultures ont parfois eu des problèmes à la levée. La tubérisation était plutôt élevée et les cultures ont rapidement atteint la maturité avec les grosses chaleurs du mois d'août.

Produktionsbedingungen

Die Pflanzung erfolgte stufenweise, da das Wetter im April und Mai sehr wechselhaft war. Der andauernde Wechsel zwischen warmen Tagen und Frostrisiko sowie zeitweiligem Regen haben den Beginn der Vegetation im Mai geprägt.

Die Böden sind über lange Zeit sehr kalt geblieben und die Kulturen hatten teilweise Auflauf – und Wachstumsprobleme. Dank der Hitze im August wurde die Knollenbildung besser und die Pflanzen reiften schnell heran.

Essais préliminaires

Les essais préliminaires s'étendent sur deux ans, dans les sites suivants :

Agroscope ART Reckenholz-Tänikon Reckenholz	(440 m)	1 ^{ère} et 2 ^{ème} année
Agroscope ACW Changins-Wädenswil Changins La Frêtaz/Bullet	(435 m) (1200 m)	1 ^{ère} année et 2 ^{ème} année 1 ^{ère} année

Dispositif expérimental

1^{ère} année : 2 répétitions de 50 plants par variété = 25 m² au total. Maran, seulement 50 plants (virus ABC). En 1^{ère} année, les plants proviennent de l'obtenteur.

2^{ème} année : une parcelle de 100, respectivement 50 plants par variété et répétition issus de la descendance de la 1^{ère} année, c'est-à-dire 200 plants par variété et lieu = 50 m².

Interprétation

Les appréciations au champ, ainsi que le rendement, le taux d'amidon, le calibrage, la forme, les défauts des tubercules et le type culinaire sont réalisés par les deux Stations. En plus, Zurich-Reckenholz détermine les aptitudes à la transformation (chips et frites). Changins teste les virus des plants, rassemble et interprète tous les résultats, à l'exception des examens technologiques.

Signification des résultats

- Note 1 = très peu sensible, très précoce, stolons courts, pas de germe, etc.
- Note 5 = moyen
- Note 9 = très sensible, très tardif, stolons longs, germes très longs, etc.

1. **Plantes virosées** : pour-cent de plantes avec des symptômes d'enroulement et de mosaïques graves.
2. **Rendement** : en plaine = moyenne des essais de Reckenholz et Changins.
En montagne = essais de La Frêtaz. (préliminaire 1^{ère} année)
3. **Amidon en pour-cent et rendement** : la détermination est réalisée selon la méthode densimétrique et la table de conversion Scheele, Svensson et Rasmusson et la balance Mettler. Pour la répartition - plaine et montagne - voir sous rendement.
4. **Petits tubercules** : taux du poids des tubercules de calibres < 42,5 mm, maille carrée.
Rendements moyens de tous les lieux d'expérimentation.

5. Forme des tubercules : le contrôle est effectué sur 100 tubercules par variété et par provenance, avec les critères suivants :

Aspect général : régulier, marchand, difforme

Forme : rond, oblong court, oblong, long, arrondi, aplati, éventuellement claviforme, piriforme ou réniforme

Yeux (position) : superficiel, mi-superficiel, mi-profound, profond.

Arcades : peu, moyennement ou fortement apparentes

Ombilic : superficiel, mi-profound, profound, proéminent, légèrement proéminent.

Couleur et aspect de la peau.

Couleur de la chair.

6. Attaque de maladies sur les tubercules (par exemple, mildiou, gales, taches de rouille et taches grises, etc.).

L'évaluation des maladies se fait au cours de l'hiver sur 100 tubercules par variété et provenance. Les maladies sont indiquées en pour-cent des tubercules atteints et leur importance est exprimée par un indice. L'indice est calculé selon l'intensité de l'attaque sur chaque tubercule, exprimé avec une échelle de 1 à 9 (9= très forte attaque) en comparaison avec des barèmes sur photo. La somme de toutes les valeurs obtenues par échantillon de 100 tubercules donne l'indice. Un indice supérieur à 100 indique une très forte attaque. Le virus nécrotique du tabac (ABC) a été observé à Maran.

7. Noircissement après cuisson : l'évaluation est faite au cours de l'hiver sur 20 tubercules par variété et provenance (excepté Maran). Les tubercules cuits à la vapeur sont coupés dans le sens de la longueur. La couleur à l'ombilic et à la couronne est évaluée immédiatement après la cuisson ainsi que 24 heures après avec une échelle de 1 à 10. La valeur moyenne, multipliée par 10, donne l'indice.

10 = très bon, sans noircissement

30 = net noircissement (marchandise refusée)

100 = noircissement total

Le deuxième chiffre indique en pour-cent les tubercules qui ont un indice supérieur à 30.

La note «noircissement après cuisson» est obtenue par la différence des résultats des examens effectués immédiatement après la cuisson et après 24 heures: 9 = fort, 1 = faible noircissement.

8. Appréciation du type culinaire : l'appréciation du type culinaire est réalisée sur le tubercule pelé, étuvé et sans assaisonnement, selon la méthode de l'Association européenne pour la recherche sur la pomme de terre (EAPR).

Type culinaire

A. Pomme de terre à salade

B. Pomme de terre assez ferme, à toutes fins

C. Pomme de terre farineuse, à purée et industrielle

D. Pomme de terre très farineuse, industrielle et fourragère

Types intermédiaires B-C est un type qui se rapproche du B; C-B est un type qui se rapproche du C.

9. Autres aptitudes : toutes les variétés sont testées pour leurs aptitudes pour la fabrication de produits préfabriqués. En parallèle aux essais de transformation (chips et frites), l'oxydation de la chair crue est analysée. Ces examens se terminent seulement au printemps et figurent dans un rapport séparé.

Vorversuche mit neuen Kartoffelzüchtungen

Die Vorversuche dauern zwei Jahre und werden durchgeführt von :

Agroscope ART Reckenholz-Tänikon
im Versuchsgut Reckenholz (440 m ü.M.) Vorversuch 1. und 2. Jahr

Agroscope ACW Changins-Wädenswil
in Changins (435 m ü.M.) Vorversuch 1. und 2. Jahr
in La Frêtaz-Bullet (1200 m ü.M.) Vorversuch 1. Jahr

Versuchsanlage

Vorversuche 1. Jahr : pro Versuchsort 2 Wiederholungen zu 50 Knollen = 25 m² total.
Maran nur 50 Knollen (Virus ABC). Im ersten Versuchsjahr wird das vom Züchter gelieferte Saatgut verwendet.

Vorversuche 2. Jahr : pro Sorte je 100 bzw. 50 Knollen als Nachbau der Versuchsorte des ersten Jahres d.h. 200 Knollen/Sorte = 50 m².

Auswertung

Die Beurteilung auf dem Feld sowie die Ermittlung von Ertrag, Stärkegehalt, Sortierung, Knollenform, Krankheitsbefall der Knollen und Kochtyp werden durch beide Forschungsanstalten durchgeführt.

Die Forschungsanstalt Zürich-Reckenholz ermittelt die Eigenschaften für die technische Verarbeitung. Die Forschungsanstalt Changins prüft die Neuzüchtungen zudem auf das Vorkommen latenter Virus-symptome und besorgt die Auswertung und Zusammenstellung aller Ergebnisse ausgenommen die Resultate des technologischen Verarbeitung.

Erläuterungen zu den Prüfergebnissen

- Note 1 = sehr gering, z.B. sehr wenig anfällig, sehr frühreif, sehr wenig Knollen, kurze Stolonen, keine Keimbildung, usw.
- Note 5 = mittel;
- Note 9 = sehr stark, z.B. stark anfällig, sehr spätreif, sehr viele Knollen, lange Stolonen, starke Keimbildung, usw.

- 1. Virusbefall** Prozentsatz der mit Blattroll und schwerem Mosaik befallenen Pflanzen.
- 2. Knollenertrag** Mittel-Ertrag aus Versuchen in Reckenholz und Changins einerseits, sowie Wallestalden und La Frêtaz anderseits (2. Versuchsjahr nur Wallestalden).
- 3. Stärkegehalt und Stärkeertrag** Ermittlung aufgrund des Unterwassergewichtes und der Umrechnungstabelle nach Scheele, Svensson und Rasmusson und der Mettler-Waage. Unter der Rubrik Tiefflagen sind die Anbauorte Reckenholz und Changins einbezogen, unter jener der Höhenlagen La Frêtaz (Vorversuch 1. Jahr).
- 4. Anteil an kleinen Knollen** Gewichtsprozente an Knollen unter 42,5 mm Quersiebdurchmesser. Mittelwerte aus allen Versuchssorten.

5. **Knollenform** Beurteilung von 100 Knollen pro Sorte und Herkunft nach folgenden Merkmalen :
Gestalt : regelmässig, marktgängig, unförmig
Umriss : rundlich, kurzoval, langoval, lang, voll, abgeplattet, evtl. nieren-oder birnförmig, usw.
Augen : Lage : flach, mittel, tief
Augenleisten : z.B. schwach, stark, scharf, usw.
Nabel : flach, mitteltief, tief, vorgezogen, leicht vorgezogen
Schalenfarbe und Beschaffenheit
Fleischfarbe
 6. **Krankheitsbefall der Knollen** (z.B. Phytophtora, Alternaria, Eisen- und Graufleckigkeit, usw.).
Untersuchung (Schnitprobe) von 100 Knollen pro Sorte und Herkunft im Laufe des Winters. Die Befallshäufigkeit wird als Prozentsatz befallener Knollen, die Befallsintensität in Form einer Indexzahl angeführt. Der Befallsgrad der einzelnen Knollen wird durch Noten der Skala 1-9 (9 = sehr starker Befall) erfasst. Die Summe aller ermittelten Wertzahlen pro Probe zu 100 Knollen ergibt die Indexzahl. Ein die Zahl 100 übersteigender Index deutet bei den meisten Krankheiten auf einen zu starken Befall hin. Das Tabaknekrosevirus (ABC-Krankheit) wurde am Anbauort Maran beobachtet.
 7. **Schwarzverfärbung nach dem Kochen** Untersuchung von 20 Knollen pro Sorte und Herkunft (ohne Maran). Die gedämpften Knollen werden längs durchgeschnitten, die Verfärbung am Nabel- und Kronenende unmittelbar nach dem Kochen und 24 Stunden später festgestellt durch Vergleich mit 10-teiliger Farbskala. Die Durchschnittswerte mit 10 multipliziert = Index. Vollständige Dunkelfärbung = Index 100. Fehlen jeglicher Verfärbung = Index 10. Verfärbungen über Index 30 können zu Beanstandungen führen. Die zweite Zahl gibt den Prozentsatz der Knollen mit einer Verfärbung über Index 30 an. Nachdunkeln nach dem Kochen : Berechnung aus der Differenz des Bonituren nach 24 und ostunden : 9 = starkes, 1 = geringes Nachdunkeln.
 8. **Ermittlung des Kochtypes** Degustation der Sorten nach der von der Sektion "Züchtung und Sortenwesen" der Europäischen Gesellschaft für Kartoffelforschung (EAPR) vereinbarten Methode, d.h. Knollen geschält, gedämpft ohne Salzbeigabe.
- ### **Typenbeschreibung**
- A. **Feste Salatkartoffel.** Nicht zerkochend und festbleibend, nicht mehlig, feucht und feinkörnig. Der Geschmack ist fein, der Stärkegehalt niedrig. Salatkartoffeln eignen sich -ausser für Kartoffelstock auch für alle übrigen Verwendungsarten.
 - B. **Ziemlich feste Kartoffeln, für alle Zwecke geeignet.** Beim Kochen wenig aufspringend und mässig fest bleibend, schwach mehlig, wenig feucht und ziemlich feinkörnig. Im Geschmack sind solche Kartoffeln ziemlich fein. Sie weisen einen mittleren Stärkegehalt auf.
 - C. **Mehlige Kartoffeln.** Diese sind bei uns unter dem Begriff Wirtschafts- und Ausgleichssorten bekannt. Sie springen im allgemeinen stark auf, sind im Fleisch ziemlich weich und ziemlich trocken. Das Stärkekorn ist ziemlich grob und der Geschmack im allgemeinen bereits kräftig.
 - D. **Stark mehlige Kartoffeln.** Darunter verstehen wir ausgesprochene Futtersorten, die beim Kochen zerfallen und im Fleisch weich oder ungleich hart sind. Zudem sind sie stark mehlig, trocken und im Geschmack rauh.
Viele Sorten lassen sich nicht in einen reinen Kochtyp einreihen, sondern bilden sogenannte.
- Übergangstypen.** Wohl wird die Qualität in erster Linie durch die Sorte bestimmt, doch wird sie auch durch die Verschiedenartigkeit des Bodens oder durch andere Wachstumsbedingungen beeinflusst. Die Zuordnung einer Sorte zum Kochtyp B-C bedeutet, dass die Eigenschaften des Typus B vorherrschen; wird dagegen die Bezeichnung C-B gebraucht, so liegt das Schwergewicht beim Kochtyp C.
9. **Andere Untersuchungen.** Alle Sorten bzw. Zuchttämmen werden auch auf ihrer Eignung zur Herstellung tisch- und küchenfertiger Produkte untersucht. Neben den Backversuchen für Chips und Pommes frites wird die Tendenz zur Rohverfärbung ermittelt. Diese Untersuchungen werden erst im Frühjahr abgeschlossen.

A. Essai préliminaire / Vorversuche

1ère année d'essai / im 1. Jahr der Prüfung



Liste des variétés examinées / Verzeichnis der geprüften Sorten

<u>Variété / Sorte</u>	<u>Type</u>	<u>Pays d'origine / Herkunftsland</u>
1. Cardinia	C	Allemagne / Deutschland
2. Osira	Ch	Allemagne / Deutschland
3. Regina	C	Allemagne / Deutschland
4. Caprice	C	Allemagne / Deutschland
5. Magda	C	Allemagne / Deutschland
6. Birgit	C	Allemagne / Deutschland
7. Solist	C	Allemagne / Deutschland
8. Figaro	Ch	Allemagne / Deutschland
9. Compass	C, F	Pays-Bas / Holland
10. Leonardo	C, F	Pays-Bas / Holland
11. Ivory Russet	C, F	Pays-Bas / Holland
12. Bafana	C, F	Pays-Bas / Holland
13. Vitabella	C	Pays-Bas / Holland
14. Doremi	C, F	France / Frankreich
15. Nazca	C	France / Frankreich
16. G04TT107001	C	France / Frankreich
17. Bosco Noe 907/04	C	Autriche / Oesterreich
18. Noe 3793/05	Ch	Autriche / Oesterreich
19. Valentine	C	Russie / Russland

Variétés témoins / Vergleichssorten : Lady Felicia, Bintje, Agria, Lady Claire

C = Consommation, Speise

F = Frites

Ch = Chips

Variété	Régularité à la levée Entwicklungs-	Plantes virosées % Virus-Befall %	Longueur des stolons Stolonenlänge	Tubercules par plante Knollenzahl pro Staude	Maturité Reifezeit	Rendement récolte précoce Ertrag Frühernte 1) amidon Stärkegehalt %	Rendement récolte à maturité Ertrag Normalernte dt/ha	Rendement amidon Stärkeertrag dt/ha
1.Cardinia	2.1	.0	.0	3.7	16.1	3.7	396	10.4
2.Osira	1.3	.0	.0	4.7	12.5	2.6	336	14.7
3.Regina	2.8	.0	3.0	5.0	19.9	5.8		545
4.Caprice	3.1	.0	.3	4.0	16.6	6.1		431
5.Magda	2.0	.0	.0	3.0	15.9	2.1	402	14.0
6.Birgit	2.8	.0	1.3	3.0	14.7	5.8		426
7.Solist	1.8	.0	.0	3.0	14.2	1.5	399	11.4
8.Figaro	1.6	.0	.0	3.0	19.0	5.3		544
9.Compass	1.7	.0	.0	3.3	15.6	5.3		465
10.Leonardo	1.5	.0	.0	3.0	11.2	3.9		459
11.Ivory Russet	2.3	.0	.0	7.3	11.7	3.8		98
12.Bafana	2.2	.0	.0	3.7	12.4	5.5		420
13.Vitabella	1.8	.0	.0	4.3	12.3	4.2	344	12.3
14.Doremi	1.8	.0	.7	3.7	10.9	6.5		445
15.Nazca	2.4	.3	.3	4.0	12.6	4.1		425
16.G04TT107001	1.6	.0	.3	4.0	26.6	5.2		109
17.Bosco Noe 907/04	3.1	1.3	.3	4.3	11.2	5.3		86
18.Noe 3793/05	2.0	.0	.0	2.7	17.3	5.7		80
19.Valentine	2.7	.0	.0	4.3	14.0	3.8		99
20.Lady Felicia	1.4	.0	.0	5.3	18.4	3.2	417	90
21.Bintje	1.3	.0	.3	3.0	24.0	5.0		65
22.Agria	1.9	.0	.3	3.7	9.9	5.7		104
23.Lady Claire	2.0	.0	1.3	2.0	19.6	3.8		64
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	2.1	.1	.4	3.8	15.5	4.5	382	12.3
							466	100
								73

*) Note voir page 1 /
Legende Notengebung s.Seite 3

¹⁾ seulement Reckenholz et Changins
nur Anbauorte Reckenholz und Changins

Variété	Rendement Ertrag		Matière sèche MS	Amidon	Amidon Stärkegehalt		Tuber- cules <42.5 mm	Mildiou sur les fanex	Tuberc. pourris à la récolte
Sorte	plaine Tief- lagen	montagne Höhen- lagen	Trocken substanz TS	Stärke- gehalt	plaine Tief- lagen	montagne Höhen- lagen	Anteil kleine Knollen	Kraut- fäule- befall	Knollen- fäule bei der Ernte
	dt/ha	dt/ha	%	%	%	%	%	Note 2)	% du poids Gew. %
1.Cardinia	588	439	19.0	12.6	12.3	13.2	22	5.0	.5
2.Osira	420	283	24.1	17.6	16.5	19.9	26	5.8	.3
3.Regina	631	374	20.4	14.0	13.9	14.4	32	6.3	.1
4.Caprice	540	322	21.2	14.8	14.3	15.9	33	3.8	1.3
5.Magda	509	258	22.4	15.9	15.7	16.3	27	6.0	.1
6.Birgit	614	402	21.1	14.9	14.6	15.5	23	4.5	.2
7.Solist	442	302	20.1	13.7	14.0	13.3	23	6.0	.1
8.Figaro	597	381	25.6	19.0	18.9	19.4	27	4.8	.0
9.Compass	567	262	21.2	14.8	14.9	14.5	29	4.3	1.4
10.Leonardo	541	297	23.1	16.6	16.5	17.0	22	4.0	.2
11.Ivory Russet	483	293	23.4	16.8	15.9	18.6	17	3.8	.1
12.Bafana	612	352	21.8	15.3	15.2	15.6	14	4.8	1.6
13.Vitabella	531	280	21.7	15.2	14.4	16.7	15	1.0	.3
14.Doremi	454	351	24.1	17.6	16.9	19.0	13	2.8	.3
15.Nazca	487	360	18.6	12.3	11.7	13.5	21	5.0	.6
16.G04TT107001	578	373	22.2	15.7	15.3	16.6	61	4.8	.1
17.Bosco Noe 907/04	449	308	21.4	15.0	14.6	16.0	13	4.8	.6
18.Noe 3793/05	537	309	24.0	17.4	16.9	18.6	21	3.8	.2
19.Valentine	531	199	22.0	15.5	15.3	15.9	27	4.8	.4
20.Lady Felicia	546	357	19.7	13.3	12.7	14.5	32	5.8	.3
21.Bintje	563	480	23.0	16.5	15.6	18.4	35	5.8	.1
22.Agria	591	404	23.1	16.6	16.3	17.4	10	4.0	.1
23.Lady Claire	455	344	25.6	19.0	18.4	20.4	43	6.0	.1
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	533	336	22.1	15.7	15.2	16.5	25	4.7	.4

²⁾ seulement Reckenholz et La Frêtaz
nur Anbauorte Reckenholz und La Frêtaz

Variété Sorte	Mildiou sur tubercules après conservation		Pourritures diverses		Gale commune <i>Streptomyces scabies</i>		Gale argentée <i>Helminthosporium solani</i>	
	Phytophthora- kranke Knollen auf dem Lager	Indice Index	%	diverse Fäulnis- krankheiten	Indice Index	%	Gewöhnlicher S c h o r f	Indice Index
1.Cardinia	0	.0	0	0	5	2.7	257	66.7
2.Osira	0	.0	0	0	7	3.3	347	80.0
3.Regina	0	.0	0	0	13	5.3	241	64.3
4.Caprice	0	.0	0	0	29	13.0	403	90.0
5.Magda	0	.0	0	0	22	10.0	443	86.7
6.Birgit	0	.0	0	0	111	30.3	213	60.0
7.Solist	0	.0	0	0	41	18.0	400	86.7
8.Figaro	0	.0	0	0	75	26.0	350	86.7
9.Compass	0	.0	0	0	27	12.0	330	73.3
10.Leonardo	0	.0	0	0	168	53.3	307	73.3
11.Ivory Russet	0	.0	0	0	7	3.3	74	27.7
12.Bafana	0	.0	0	0	35	15.7	250	66.7
13.Vitabella	0	.0	0	0	13	6.3	124	41.3
14.Doremi	0	.0	0	0	18	7.7	363	80.0
15.Nazca	0	.0	0	0	49	20.3	303	73.3
16.G04TT107001	0	.0	0	0	49	20.0	220	66.7
17.Bosco Noe 907/04	0	.0	0	0	65	24.7	323	80.0
18.Noe 3793/05	0	.0	0	0	59	21.0	477	93.3
19.Valentine	0	.0	0	0	29	13.3	347	85.0
20.Lady Felicia	0	.0	0	0	11	5.3	277	66.7
21.Bintje	0	.0	0	0	235	73.7	303	73.3
22.Agria	0	.0	0	0	47	19.3	330	80.0
23.Lady Claire	0	.0	0	0	9	4.3	533	100.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	0	.0	0	0	49	17.8	314	74.0

Variété Sorte	Gale poudreuse <i>Spongospora subterranea</i>		Rhizoctone <i>Rhizoctonia Rhizoctonia solani</i>				Taches grises Graufleckigkeit	
			scléroties Pocken		déformant Knollen- deformation			
	Indice Index	%	Indice Index	%	Indice Index	%	Indice Index	%
1.Cardinia	50	13.0	4	1.3	13	3.3	32	9.7
2.Osira	5	1.3	41	7.7	13	3.3	54	18.0
3.Regina	75	15.7	27	5.7	11	3.0	1	.3
4.Caprice	4	1.3	2	1.0	41	11.3	8	2.3
5.Magda	1	0.3	47	11.7	15	5.0	8	2.7
6.Birgit	2	0.7	143	42.0	49	11.0	15	4.3
7.Solist	2	1.0	101	26.0	18	5.3	18	7.3
8.Figaro	39	10.0	6	2.0	19	4.7	47	14.0
9.Compass	79	23.3	9	2.3	3	1.0	17	6.3
10.Leonardo	167	34.0	2	.7	28	7.0	1	.3
11.Ivory Russet	1	0.7	16	4.0	19	4.7	19	6.0
12.Bafana	2	0.7	50	13.0	33	8.0	20	6.0
13.Vitabella	3	1.0	4	2.0	28	9.3	24	8.0
14.Doremi	3	1.3	0	.0	15	3.3	57	16.3
15.Nazca	109	21.7	31	6.7	102	22.0	7	2.0
16.G04TT107001	75	20.0	0	.0	13	3.3	67	20.0
17.Bosco Noe 907/04	72	16.7	19	5.7	43	9.0	14	4.0
18.Noe 3793/05	6	1.7	79	20.3	38	10.0	75	20.0
19.Valentine	119	30.0	12	3.7	4	1.0	10	3.7
20.Lady Felicia	7	2.0	13	3.0	10	2.7	22	6.3
21.Bintje	57	13.3	2	.3	36	8.7	13	4.3
22.Agria	113	28.7	5	1.3	7	2.3	19	5.3
23.Lady Claire	95	23.7	9	4.3	7	1.7	14	4.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	47	11.4	27	7.2	25	6.1	24	7.4

Variété	Coeur creux et brun		Nécroses annulaires Pfropfenbildung		Virus Y nécrogène Ringnekrosevirus		Taches de rouille	
Sorte	Braun- & Hohlherzigkeit		Mop top, Rattle		PVY ^{NTN}		Eisenfleckigkeit	
	Indice Index	%	Indice Index	%	Indice Index	%	Indice Index	%
1.Cardinia	1	.3	0	.0	0	.0	3	.7
2.Osira	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
3.Regina	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
4.Caprice	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
5.Magda	1	.3	11	2.3	0	.0	3	1.0
6.Birgit	0	.0	0	.0	2	.3	0	.0
7.Solist	3	.3	0	.0	1	.3	0	.0
8.Figaro	3	.7	0	.0	0	.0	5	.7
9.Compass	0	.0	0	.0	0	.0	3	1.0
10.Leonardo	0	.0	0	.0	5	2.0	1	.7
11.Ivory Russet	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
12.Bafana	5	1.0	0	.0	0	.0	86	17.7
13.Vitabella	0	.0	3	.7	0	.0	0	.0
14.Doremi	75	14.7	0	.0	0	.0	1	.3
15.Nazca	3	.7	0	.0	0	.0	0	.0
16.G04TT107001	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
17.Bosco Noe 907/04	3	.7	47	9.7	0	.0	1	.3
18.Noe 3793/05	34	5.7	1	.3	0	.0	1	.3
19.Valentine	0	.0	1	.3	0	.0	1	.7
20.Lady Felicia	4	1.0	3	.7	0	.0	0	.0
21.Bintje	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
22.Agria	19	4.3	0	.0	0	.0	0	.0
23.Lady Claire	0	.0	0	.0	3	1.0	0	.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	7	1.3	3	.6	0	.2	5	1.0

Variété	Noircissement après cuisson			Conser-vation	Germi-nation	Type culi-naire
Sorte	Schwarzkochen			Lagerung	Auskeimen	Kochtyp
	Indice Farb-index	Tub. avec indice >30 en % Kn. mit Index >30 in %	Note	Note ³⁾	Note	
1.Cardinia	17.8	1.3	5.5	2.5	4.3	B
2.Osira	15.4	2.5	4.5	4.0	4.7	C
3.Regina	16.8	.0	3.5	2.5	4.3	A-B
4.Caprice	26.4	28.8	4.5	3.0	3.7	B-A
5.Magda	18.4	11.3	6.0	5.0	5.3	B
6.Birgit	24.4	26.3	4.0	3.5	4.7	B-C
7.Solist	21.1	12.5	5.0	3.0	3.7	A-B
8.Figaro	20.4	7.5	4.0	3.0	4.7	C-D
9.Compass	15.2	.0	4.0	6.0	5.0	B-C
10.Leonardo	18.7	2.5	5.0	2.5	4.3	B-C
11.Ivory Russet	19.4	13.8	5.0	3.0	3.7	B-C
12.Bafana	16.3	.0	4.0	5.5	4.7	C
13.Vitabella	16.8	.0	4.0	2.0	4.0	B-A
14.Doremi	17.5	2.5	4.5	6.0	4.3	B
15.Nazca	15.7	.0	4.0	2.0	3.7	B
16.G04TT107001	16.3	.0	3.5	7.0	4.7	B-C
17.Bosco Noe 907/04	20.1	5.0	2.0	3.0	3.7	B
18.Noe 3793/05	21.7	7.5	3.0	4.5	4.7	C-D
19.Valentine	16.6	1.3	4.5	1.5	3.0	C-B
20.Lady Felicia	17.4	2.5	5.0	2.5	3.7	B-C
21.Bintje	15.9	.0	3.5	2.5	5.3	B-C
22.Agria	17.1	.0	4.5	1.5	2.7	B-C
23.Lady Claire	17.1	1.3	4.5	2.5	3.3	C-B
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	18.4	5.5	4.3	3.4	4.2	

³⁾ seulement Changins et La Frêtaz
nur Anbauorte Changins und La Frêtaz

Description des tubercules / Beschreibung der Knollenform 2012

1.Cardinia	Forme du tubercule : oblong court à oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : kurzoval bis langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
2.Osira	Forme du tubercule : rond, régulier Knollenform : rund, regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair à jaune / hellgelb bis gelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
3.Regina	Forme du tubercule : oblong, très régulier Knollenform : langoval, sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune foncé à jaune / tiefgelb bis gelb
4.Caprice	Forme du tubercule : oblong court à oblong Knollenform : kurzoval bis langoval Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
5.Magda	Forme du tubercule : oblong court Knollenform : kurzoval Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
6.Birgit	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune foncé / tiefgelb Peau / Schale : rouge, légèrement réticulée / rot klein genetz
7.Solist	Forme du tubercule : oblong court Knollenform : kurzoval Yeux / Augen : mi-superficiels à superficiels / mittelflach bis flach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
8.Figaro	Forme du tubercule : oblong court Knollenform : kurzoval Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : rugueuse / rauh

9.Compass	Forme du tubercule : oblong, très régulier Knollenform : langoval, sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
10.Leonardo	Forme du tubercule : oblong Knollenform : langoval Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
11.Ivory Russet	Forme du tubercule : long, plutôt gros Knollenform : lang, eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels / flach Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : blanche / weiss Peau / Schale : ocre, rugueuse / oker rauh
12.Bafana	Forme du tubercule : long, en partie réniforme et régulier Knollenform : lang, zum Teil nierenförmig und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : blanche / weiss
13.Vitabella	Forme du tubercule : oblong à rond, régulier Knollenform : langoval bis rund, regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
14.Doremi	Forme du tubercule : long à oblong court, un peu aplati, en partie piriforme et plutôt gros Knollenform : lang bis kurzoval, etwas platt, zum Teil birnförmig und eher grossfallend Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune / gelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
15.Nazca	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
16.G04TT107001	Forme du tubercule : long à oblong court, en partie claviforme Knollenform : lang bis kurzoval, zum Teil hörnchenförmig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb

17.Bosco Noe 907/04	Forme du tubercule : oblong court à oblong, un peu aplati et plutôt gros Knollenform : kurzoval bis langoval, etwas platt und eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
18.Noe 3793/05	Forme du tubercule : rond Knollenform : rund Yeux / Augen : mi-superficiels à mi-profonds / mittelflach bis mitteltief Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
19.Valentine	Forme du tubercule : rond, un peu aplati Knollenform : rund, etwas platt Yeux / Augen : mi-profonds / mitteltief Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
20.Lady Felicia	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
21.Bintje	Forme du tubercule : oblong Knollenform : langoval Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
22.Agria	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros Knollenform : langoval, eher grossfallend Yeux / Augen : mi-superficiels à superficiels / mittelflach bis flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune à jaune foncé / gelb bis tiefgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
23.Lady Claire	Forme du tubercule : oblong court, régulier Knollenform : kurzoval, regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt

Observations complémentaires / Ergänzende Beobachtungen 2012

Variété Sorte	Verdis- sement Grünscha- ligkeit	Craquelures Schalenris- sigkeit	Crevasses Wachstums- risse	Tubercules diformes Zwiewuchs	Repousses Kindelbildung	Ombilic vitreux wässriger Nabelteil
1.Cardinia	3.3	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
2.Osira	3.6	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0
3.Regina	4.2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
4.Caprice	3.4	1.0	1.7	1.0	1.0	1.3
5.Magda	4.7	1.7	1.0	2.9	1.0	1.0
6.Birgit	4.4	1.0	2.0	2.1	2.6	1.0
7.Solist	4.1	1.3	1.9	1.7	1.0	1.0
8.Figaro	4.9	1.0	1.0	2.2	1.0	1.0
9.Compass	3.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3
10.Leonardo	3.8	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0
11.Ivory Russet	3.4	1.0	1.0	2.9	3.4	1.0
12.Bafana	4.2	1.0	2.9	2.0	2.3	1.0
13.Vitabella	3.7	3.6	1.7	1.3	1.0	1.0
14.Doremi	4.1	1.3	2.1	2.9	2.2	1.3
15.Nazca	4.1	1.0	3.4	1.7	2.8	1.0
16.G04TT107001	3.6	1.7	2.2	2.1	2.3	1.0
17.Bosco	5.4	1.0	4.4	1.0	1.3	1.0
18.Noe 3793/05	4.4	1.7	2.3	3.4	2.7	1.0
19.Valentine	4.2	1.3	1.9	1.7	1.3	1.0
20.Lady Felicia	4.3	2.3	2.1	1.9	1.4	1.0
21.Bintje	2.7	1.0	2.1	1.4	1.3	1.0
22.Agraria	4.2	1.7	3.7	1.3	1.9	1.0
23.Lady Claire	2.7	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	4.0	1.4	2.0	1.8	1.6	1.0

Note après transformation logarithmique

1 = pas atteint / kein Befall

5 = 9 % d'attaque / 9 % Befall

9 = très fortement atteint / totaler Befall

Variété Sorte	Cheese vitreuse spongieuse ou tendre Fleisch glasig, schwammig oder weich	Infection de l'ombilic Nabel- infektion	Coloration des trachéides Tracheiden- verfärbung	Cheese avec veinures violettes Fleisch mit violette Verfärbung	Taches vitreuses Stippigkeit	Virus ABC nécrotique du tabac Tabak- nekrose- virus ¹⁾
1.Cardinia	1.6	3.6	1.3	1.0	4.5	3.2
2.Osira	3.7	1.7	3.1	1.0	1.0	1.0
3.Regina	1.0	1.3	1.3	1.0	2.2	1.0
4.Caprice	2.3	2.1	4.1	1.0	1.0	1.0
5.Magda	1.0	2.9	1.9	1.0	1.0	1.0
6.Birgit	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0
7.Solist	1.0	2.6	1.3	1.0	1.0	1.0
8.Figaro	1.5	4.4	1.8	1.0	1.7	1.0
9.Compass	1.0	3.5	3.8	1.0	1.0	3.2
10.Leonardo	1.0	3.1	1.3	1.0	1.0	1.0
11.Ivory Russet	1.0	2.1	2.6	1.0	1.0	1.0
12.Bafana	1.3	1.7	2.0	1.0	1.0	1.0
13.Vitabella	1.0	2.5	2.8	1.0	1.0	1.0
14.Doremi	2.4	1.3	4.0	1.4	1.0	1.0
15.Nazca	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0
16.G04TT107001	3.2	3.1	2.0	1.0	1.4	1.0
17.Bosco	1.9	2.7	3.5	1.0	1.3	1.0
18.Noe 3793/05	4.2	2.2	3.7	1.0	1.0	1.0
19.Valentine	2.1	1.8	2.9	1.0	1.0	1.0
20.Lady Felicia	1.0	2.4	2.1	1.0	1.0	1.0
21.Bintje	1.0	1.3	2.1	1.0	1.0	1.0
22.Agraria	1.0	2.1	3.9	1.0	1.0	1.0
23.Lady Claire	1.4	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0
Moyenne de l'essai	1.6	2.3	2.4	1.0	1.3	1.2
Versuchs-Mittel						

Note après transformation logarithmique

1 = pas atteint / kein Befall

¹⁾ Maran

5 = 9 % d'attaque / 9 % Befall

9 = très fortement atteint / totaler Befall

Variété Sorte	Virus sur les plants importés en 2012 (Test Elisa) Virosen auf dem Importsaatgut %					
	PLRV	PVY	PVS	PVA	PVM	PVX
1.Cardinia	.0	.0	2.2	.0	.0	.0
2.Osira	.0	.0	8.9	.0	.0	.0
3.Regina	.0	4.4	.0	.0	.0	.0
4.Caprice	.0	.0	46.7	.0	.0	.0
5.Magda	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.Birgit	.0	2.2	46.7	.0	.0	.0
7.Solist	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
8.Figaro	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.Compass	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.Leonardo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
11.Ivory Russet	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.Bafana	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.Vitabella	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.Doremi	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.Nazca	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.G04TT107001	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
17.Bosco	.0	.0	97.8	.0	.0	.0
18.Noe 3793/05	.0	.0	100.0	.0	.0	.0
19.Valentine	.0	.0	.0	.0	.0	.0
20.Lady Felicia	.0	.0	.0	.0	.0	.0
21.Bintje	.0	.5	.0	.0	.0	.0
22.Agria	.0	.0	.0	.0	.0	.0
23.Lady Claire	.0	.6	.0	.0	.0	.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	.0	.5	13.1	.0	.0	.0

B. Essai préliminaire / Vorversuche

2ème année d'essai / im 2. Jahr der Prüfung



Liste des variétés examinées / Verzeichnis der geprüften Sorten

<u>Variété / Sorte</u>	<u>Type</u>	<u>Pays d'origine / Herkunftsland</u>
1. Georgina	C	Allemagne / Deutschland
2. Ottawa	C, F	Allemagne / Deutschland
3. Albata	Ch	Allemagne / Deutschland
4. Miss Malina	C, F	Allemagne / Deutschland
5. Kiebitz	Ch	Allemagne / Deutschland
6. Kiwi	Ch	Allemagne / Deutschland
7. Roncalla	C	Allemagne / Deutschland
8. Puccini	Ch	Allemagne / Deutschland
9. Action AR 01-0978	C, F	Pays-Bas / Holland
10. Bridget JA 00-1881	C, F	Pays-Bas / Holland
11. Lady Lenora	Ch	Pays-Bas / Holland
12. CMK 2002-055-010	C, F	Pays-Bas / Holland
13. Leontine	C	Pays-Bas / Holland
14. Taurus	Ch	Pays-Bas / Holland
15. Colomba	C	Pays-Bas / Holland
16. Crisper	Ch	Pays-Bas / Holland
17. Eurostar	C, F	Pays-Bas / Holland
18. Esmeralda	C	France / Frankreich
19. Clairette G03TT007006	C	France / Frankreich
20. Amany G03TT189010	C, F	France / Frankreich
21. Anoe	C	France / Frankreich
22. Corsa	C	Autriche / Oesterreich
23. Diego Noe 1209/02	C, F	Autriche / Oesterreich
24. Umatilla Russet	C, F	Grande Bretagne / Grossbritannien

Variétés témoins / Vergleichssorten : Lady Felicia, Bintje, Agria, Lady Claire

C = Consommation, Speise

F = Frites

Ch = Chips

Variété Sorte	Régularité à la levée Entwicklung	Plantes virosées %									Longueur des stolons Stolonenlänge ¹⁾		
		Note*			PLRV			Virusbefall %			Note		
		2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	2.6	3.2	2.9	.0	.7	.4	.0	5.0	2.5	4.0	3.7	3.9	
2.Ottawa	3.5	3.9	3.7	.0	.0	.0	1.0	5.9	3.5	3.0	3.7	3.4	
3.Albata	2.7	2.9	2.8	.0	.0	.0	.0	1.3	.7	2.3	1.7	2.0	
4.Miss Malina	2.5	2.6	2.6	.0	.0	.0	.0	4.3	2.2	3.7	4.3	4.0	
5.Kiebitz	2.3	2.5	2.4	.0	.3	.2	.0	3.8	1.9	4.3	1.7	3.0	
6.Kiwi	1.9	2.1	2.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.5	4.0	3.7	3.9	
7.Roncalla	1.6	1.9	1.8	.0	.0	.0	.0	1.7	.9	6.0	3.0	4.5	
8.Puccini	2.5	3.7	3.1	.0	1.9	1.0	.0	12.7	6.4	6.7	9.0	7.9	
9.Action AR 01-0978	2.1	1.9	2.0	.0	.0	.0	.0	3.3	1.7	3.3	3.0	3.2	
10.Bridget JA 00-1881	2.3	2.3	2.3	.0	.0	.0	1.3	7.2	4.3	4.3	3.0	3.7	
11.Lady Lenora	1.4	2.2	1.8	.0	.0	.0	.0	11.9	6.0	2.7	3.7	3.2	
12.CMK 2002-055-010	1.3	2.4	1.9	.3	.0	.2	.0	21.3	10.7	2.3	2.3	2.3	
13.Leontine	1.6	3.0	2.3	.0	.0	.0	.0	14.9	7.5	3.3	3.7	3.5	
14.Taurus	3.4	3.6	3.5	.0	.0	.0	.0	2.2	1.1	2.7	3.0	2.9	
15.Colomba	1.8	2.3	2.1	.0	.3	.2	.0	13.4	6.7	3.0	3.0	3.0	
16.Crisper	2.3	2.0	2.2	.0	.3	.2	.0	38.9	19.5	2.3	2.3	2.3	
17.Eurostar	2.3	2.6	2.5	.0	.7	.4	.3	4.7	2.5	4.3	3.7	4.0	
18.Esmeralda	2.8	3.6	3.2	.0	.0	.0	.0	19.6	9.8	4.0	5.0	4.5	
19.Clairette 03TT007006	1.7	2.4	2.1	.0	.2	.1	.3	23.8	12.1	5.3	3.7	4.5	
20.Amany 03TT189010	2.2	2.1	2.2	.0	.0	.0	.0	14.7	7.4	6.0	4.3	5.2	
21.Anoe	1.7	2.2	2.0	.0	.0	.0	.0	25.7	12.9	3.3	3.0	3.2	
22.Corsa	6.5	2.8	4.7	.3	1.3	.8	.0	.3	.2	7.0	5.7	6.4	
23.Diego Noe 1209/02	4.3	2.8	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.7	3.0	4.4	
24.Umatilla Russet	2.1	2.0	2.1	.0	.7	.4	.7	18.8	9.8	2.3	1.7	2.0	
25.Lady Felicia	1.7	2.1	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.3	2.3	2.8	
26.Bintje	1.4	2.3	1.9	.0	.0	.0	.0	20.8	10.4	4.0	3.0	3.5	
27.Agria	2.7	2.4	2.6	.3	.0	.2	.0	9.6	4.8	3.3	5.0	4.2	
28.Lady Claire	2.6	2.9	2.8	.0	.0	.0	.0	23.2	11.6	2.3	3.7	3.0	
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	2.4	2.6	2.5	.0	.2	.1	.1	11.1	5.6	3.9	3.5	3.7	

*) Note voir page 1 /

Legende Notengebung s.Seite 3
s.Seite 3¹⁾ seulement Changins et La Frétaz 2011 et Changins 12nur Anbauorte Changins und La Frétaz 2011 und
und Changins 2012

Variété Sorte	Tubercules par plante Knollenzahl pro Staude			Maturité Reifezeit			Rendement amidon Stärkeertrag		
				Note			dt/ha		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	13.8	9.5	11.7	4.7	5.8	5.3	85	71	78
2.Ottawa	10.3	11.5	10.9	4.8	5.5	5.2	83	72	77
3.Albata	12.8	10.8	11.8	3.7	3.7	3.7	81	66	74
4.Miss Malina	14.3	10.3	12.3	6.0	5.8	5.9	95	81	88
5.Kiebitz	12.3	12.8	12.6	4.2	4.0	4.1	94	68	81
6.Kiwi	16.9	13.0	15.0	3.0	3.7	3.4	100	79	90
7.Roncalla	17.6	17.2	17.4	3.3	4.0	3.7	78	71	75
8.Puccini	11.8	17.0	14.4	4.3	5.9	5.1	109	76	92
9.Action AR 01-0978	9.4	10.8	10.1	4.3	4.2	4.3	101	72	87
10.Bridget JA 00-1881	12.7	11.8	12.3	4.8	5.4	5.1	93	76	84
11.Lady Lenora	15.4	14.7	15.1	3.2	3.8	3.5	98	76	87
12.CMK 2002-055-010	12.8	13.5	13.2	5.7	5.8	5.8	109	73	91
13.Leontine	20.5	17.7	19.1	3.8	3.7	3.8	80	56	68
14.Taurus	9.7	9.8	9.8	5.2	6.0	5.6	91	77	84
15.Colomba	10.6	12.8	11.7	3.2	2.4	2.8	77	58	68
16.Crisper	16.1	13.3	14.7	5.2	5.2	5.2	107	82	94
17.Eurostar	10.9	11.3	11.1	6.5	5.4	6.0	92	71	81
18.Esmeralda	11.9	14.0	13.0	2.8	3.0	2.9	62	53	58
19.Clairette 03TT007006	13.5	14.0	13.8	3.5	3.9	3.7	87	67	77
20.Amany 03TT189010	16.2	13.3	14.8	6.8	6.3	6.6	114	81	98
21.Anoe	15.9	13.2	14.6	2.3	2.2	2.3	63	50	57
22.Corsa	12.6	12.8	12.7	5.0	4.5	4.8	62	63	62
23.Diego Noe 1209/02	11.1	10.2	10.7	6.7	6.9	6.8	82	79	80
24.Umatilla Russet	13.5	13.5	13.5	6.0	5.3	5.7	93	69	81
25.Lady Felicia	15.6	12.2	13.9	2.2	3.1	2.7	65	57	61
26.Bintje	17.9	16.5	17.2	4.8	5.5	5.2	99	74	87
27.Agria	12.2	8.3	10.3	6.2	6.0	6.1	99	67	83
28.Lady Claire	16.3	16.8	16.6	2.7	3.5	3.1	78	67	73
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	13.7	13.0	13.3	4.5	4.7	4.6	88	70	79

Variété Sorte	Rendement récolte précoce							Rendement récolte à maturité					
	Ertrag Frühernte			amidon % Stärkegehalt			Ertrag Normalernte			relatif %			
	dt/ha			2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	dt/ha	2011	2012	11-12
	2011	2012											
1.Georgina							748	605	677	127	134	130	
2.Ottawa							594	490	542	101	108	104	
3.Albata							499	402	451	85	89	87	
4.Miss Malina							627	488	558	107	108	107	
5.Kiebitz	238	279	259	15.1	15.1	15.1	517	368	443	88	81	85	
6.Kiwi	266	327	297	17.5	17.7	17.6	495	387	441	84	85	85	
7.Roncalla	374	439	407	10.4	10.2	10.3	618	534	576	105	118	111	
8.Puccini							590	393	492	100	87	95	
9.Action AR 01-0978							658	452	555	112	100	107	
10.Bridget JA 00-1881							601	471	536	102	104	103	
11.Lady Lenora	307	370	339	16.7	16.0	16.4	519	386	453	88	85	87	
12.CMK 2002-055-010							616	425	521	105	94	100	
13.Leontine	429	484	457	8.9	9.1	9.0	712	479	596	121	106	115	
14.Taurus							517	430	474	88	95	91	
15.Colomba	467	545	506	9.0	9.3	9.2	674	534	604	115	118	116	
16.Crisper							583	466	525	99	103	101	
17.Eurostar							606	452	529	103	100	102	
18.Esmeralda							494	413	454	84	91	87	
19.Clairette 03TT007006	359	393	376	11.2	10.9	11.1	625	471	548	106	104	105	
20.Amany 03TT189010							735	542	639	125	120	123	
21.Anoe	330	375	353	11.8	11.3	11.6	466	383	425	79	85	82	
22.Corsa							488	445	467	83	98	90	
23.Diego Noe 1209/02							570	522	546	97	115	105	
24.Umatilla Russet							596	413	505	101	91	97	
25.Lady Felicia	406	436	421	9.9	10.2	10.1	547	455	501	93	101	96	
26.Bintje							657	473	565	112	104	109	
27.Agria							634	426	530	108	94	102	
28.Lady Claire							459	369	414	78	82	80	
Moyenne de l'essai	353	405	379	12.3	12.2	12.2	587	453	520	100	100	100	
Versuchs-Mittel													

²⁾ seulement Reckenholz et Changins
nur Anbauorte Reckenholz und Changins

Variété Sorte	Rendement Ertrag						Amidon Stärkegehalt					
	plaine Tieflagen			montagne Höhenlagen			plaine Tieflagen			montagne Höhenlagen		
	dt/ha	dt/ha	%	dt/ha	dt/ha	%	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	761	724	742	723	366	545	11.0	12.2	11.6	11.8	10.9	11.4
2.Ottawa	607	599	603	570	272	421	14.4	15.0	14.7	13.1	14.0	13.6
3.Albata	504	514	509	490	179	334	16.6	16.6	16.6	15.9	16.2	16.1
4.Miss Malina	635	597	616	611	271	441	15.4	17.2	16.3	14.6	15.4	15.0
5.Kiebitz	525	438	481	500	228	364	18.1	18.3	18.2	18.4	19.1	18.8
6.Kiwi	525	469	497	434	222	328	20.7	20.5	20.6	19.5	20.6	20.1
7.Roncalla	592	603	598	669	395	532	12.2	13.1	12.7	13.5	13.6	13.6
8.Puccini	550	450	500	671	279	475	17.9	19.1	18.5	19.3	19.6	19.5
9.Action AR 01-0978	612	539	576	751	278	515	15.2	15.8	15.5	15.8	16.1	16.0
10.Bridget JA 00-1881	628	538	583	546	336	441	15.4	15.9	15.6	15.6	16.7	16.2
11.Lady Lenora	494	412	453	569	336	453	18.4	18.9	18.7	19.8	21.3	20.6
12.CMK 2002-055-010	627	492	559	594	293	444	17.3	16.9	17.1	18.6	17.8	18.2
13.Leontine	697	554	625	742	331	537	10.8	11.3	11.1	12.0	12.1	12.1
14.Taurus	532	508	520	488	274	381	17.8	17.8	17.8	17.1	17.7	17.4
15.Colomba	711	655	683	600	292	446	11.6	10.7	11.2	11.1	11.3	11.2
16.Crisper	611	564	588	526	270	398	18.8	17.5	18.1	17.3	17.8	17.6
17.Eurostar	593	530	562	633	297	465	15.3	15.6	15.5	14.7	15.6	15.2
18.Esmeralda	504	494	499	473	251	362	12.5	13.0	12.8	12.8	12.3	12.6
19.Clairette 03TT007006	664	537	601	545	339	442	14.3	14.4	14.4	13.1	14.0	13.6
20.Amany 03TT189010	713	637	675	777	353	565	16.3	15.4	15.9	13.9	14.2	14.1
21.Anoe	482	471	476	433	208	320	13.8	13.0	13.4	13.2	12.9	13.1
22.Corsa	510	563	536	445	210	328	12.9	14.3	13.6	12.5	13.8	13.2
23.Diego Noe 1209/02	558	630	594	594	305	449	15.0	15.3	15.2	13.3	14.8	14.1
24.Umatilla Russet	603	495	549	582	248	415	15.3	16.8	16.1	16.2	16.5	16.4
25.Lady Felicia	635	505	570	371	354	362	11.7	12.4	12.0	12.4	12.8	12.6
26.Bintje	680	505	593	613	407	510	15.0	14.9	15.0	15.3	17.3	16.3
27.Agria	644	472	558	615	335	475	15.7	15.8	15.8	15.3	15.5	15.4
28.Lady Claire	462	393	428	454	320	387	17.2	18.0	17.6	16.6	18.6	17.6
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	595	532	563	572	295	433	15.2	15.6	15.4	15.1	15.7	15.4

Variété Sorte	Amidon			Matière sèche MS			Tubercules <42.5 mm		
	Stärkegehalt			Trocken substanz TS			Anteil kleine Knollen		
	% 2011 2012		11-12	% 2011 2012		11-12	% 2011 2012		11-12
1.Georgina	11.3	11.8	11.6	17.5	18.1	17.8	8	11	10
2.Ottawa	14.0	14.6	14.3	20.4	21.0	20.7	7	14	11
3.Albata	16.3	16.4	16.4	22.8	22.9	22.9	13	27	20
4.Miss Malina	15.1	16.6	15.9	21.6	23.1	22.4	8	28	18
5.Kiebitz	18.2	18.6	18.4	24.8	25.2	25.0	11	26	19
6.Kiwi	20.3	20.5	20.4	26.8	27.0	26.9	21	37	29
7.Roncalla	12.7	13.3	13.0	19.0	19.7	19.4	12	19	16
8.Puccini	18.4	19.3	18.9	25.0	25.9	25.5	14	22	18
9.Action AR 01-0978	15.4	15.9	15.7	21.9	22.4	22.2	4	11	8
10.Bridget JA 00-1881	15.5	16.1	15.8	22.0	22.7	22.4	6	11	9
11.Lady Lenora	18.8	19.7	19.3	25.4	26.3	25.9	9	26	18
12.CMK 2002-055-010	17.7	17.2	17.5	24.2	23.7	24.0	7	31	19
13.Leontine	11.2	11.6	11.4	17.4	17.9	17.7	28	47	38
14.Taurus	17.6	17.8	17.7	24.1	24.4	24.3	6	9	8
15.Colomba	11.4	10.9	11.2	17.6	17.2	17.4	7	18	13
16.Crisper	18.3	17.6	18.0	24.9	24.1	24.5	10	25	18
17.Eurostar	15.1	15.6	15.4	21.5	22.1	21.8	6	15	11
18.Esmeralda	12.6	12.8	12.7	19.0	19.1	19.1	24	49	37
19.Clairette 03TT007006	13.9	14.3	14.1	20.3	20.7	20.5	17	26	22
20.Amany 03TT189010	15.5	15.0	15.3	22.0	21.4	21.7	8	15	12
21.Anoe	13.6	13.0	13.3	19.9	19.4	19.7	30	49	40
22.Corsa	12.7	14.1	13.4	19.1	20.5	19.8	18	37	28
23.Diego Noe 1209/02	14.4	15.1	14.8	20.8	21.5	21.2	10	11	11
24.Umatilla Russet	15.6	16.7	16.2	22.0	23.3	22.7	8	37	23
25.Lady Felicia	11.9	12.5	12.2	18.2	18.8	18.5	20	23	22
26.Bintje	15.1	15.7	15.4	21.5	22.2	21.9	15	27	21
27.Agria	15.6	15.7	15.7	22.0	22.2	22.1	4	10	7
28.Lady Claire	17.0	18.2	17.6	23.5	24.8	24.2	21	31	26
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	15.2	15.6	15.4	21.61	22.1	21.8	13	25	19

Variété Sorte	Mildiou sur les fanes <i>Phytophthora</i> Krautfäulebefall	Tubercules pourris à la récolte Knollenfäule bei der Ernte						Mildiou sur tubercules après conservation Phytophorakranke Knollen auf dem Lager					
		Note 3)			% du poids Gew. %			Indice / Index			%		
		2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina		4.5	4.5	.3	.1	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
2.Ottawa		4.9	4.9	.4	.2	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
3.Albata		3.9	3.9	.3	.1	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
4.Miss Malina		3.5	3.5	.3	.2	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
5.Kiebitz		4.8	4.8	.2	.1	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
6.Kiwi		4.9	4.9	.4	.0	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
7.Roncalla		4.8	4.8	.3	.5	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
8.Puccini		5.6	5.6	.4	.2	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
9.Action AR 01-0978		4.5	4.5	.6	.2	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
10.Bridget JA 00-1881		3.3	3.3	.2	.3	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
11.Lady Lenora		4.8	4.8	.5	.4	.5	0	0	0	.0	.0	.0	.0
12.CMK 2002-055-010		3.8	3.8	.4	.4	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
13.Leontine	pas de note, attaque trop tardive kein Bonitur, zu später Befall	5.4	5.4	.1	.3	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
14.Taurus		4.1	4.1	.2	.1	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
15.Colomba		5.3	5.3	.7	.2	.5	0	0	0	.0	.0	.0	.0
16.Crisper		4.4	4.4	.1	.2	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
17.Eurostar		5.0	5.0	.5	.1	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
18.Esmeralda		5.8	5.8	1.4	.5	1.0	0	0	0	.0	.0	.0	.0
19.Clairette 03TT007006		5.6	5.6	.3	.4	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
20.Amany 03TT189010		4.4	4.4	.5	.3	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
21.Anoe		4.8	4.8	1.0	.5	.8	0	0	0	.0	.0	.0	.0
22.Corsa		3.8	3.8	.6	.2	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
23.Diego Noe 1209/02		4.9	4.9	.4	.6	.5	0	0	0	.0	.0	.0	.0
24.Umatilla Russet		4.9	4.9	1.0	.4	.7	0	0	0	.0	.0	.0	.0
25.Lady Felicia		5.3	5.3	.2	.3	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
26.Bintje		5.4	5.4	.4	.2	.3	0	0	0	.0	.0	.0	.0
27.Agria		3.8	3.8	.3	.4	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0
28.Lady Claire		5.9	5.9	.1	.3	.2	0	0	0	.0	.0	.0	.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel		4.7	4.7	.4	.3	.4	0	0	0	.0	.0	.0	.0

³⁾ seulement Reckenholz et La Frêtaz 2011 et Reckenholz 2012
nur Anbauorte Reckenholz und La Frêtaz 2011 und Reckenholz 2012

Variété Sorte	Pourritures diverses							Gale commune <i>Streptomyces scabies</i> Gewöhnlicher Schorf					
	Indice / Index			% 2011 2012 11-12			Indice / Index			% 2011 2012 11-12			
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	
1.Georgina	1	0	1	.7	.0	.4	41	134	88	14.7	38.0	26.4	
2.Ottawa	0	0	0	.0	.0	.0	85	169	127	33.3	42.7	38.0	
3.Albata	0	0	0	.0	.0	.0	80	135	108	25.0	43.0	34.0	
4.Miss Malina	0	0	0	.0	.0	.0	7	23	15	2.7	8.3	5.5	
5.Kiebitz	0	0	0	.0	.0	.0	3	16	10	1.3	8.0	4.7	
6.Kiwi	0	0	0	.0	.0	.0	0	2	1	.0	1.0	.5	
7.Roncalla	2	0	1	.3	.0	.2	1	3	2	.7	1.7	1.2	
8.Puccini	0	0	0	.0	.0	.0	1	63	32	.3	18.7	9.5	
9.Action AR 01-0978	0	0	0	.0	.0	.0	2	20	11	.7	9.7	5.2	
10.Bridget JA 00-1881	0	0	0	.0	.0	.0	1	5	3	.3	2.3	1.3	
11.Lady Lenora	0	0	0	.0	.0	.0	109	41	75	42.7	16.7	29.7	
12.CMK 2002-055-010	0	0	0	.0	.0	.0	11	19	15	4.7	7.0	5.9	
13.Leontine	1	0	1	.3	.0	.2	5	6	6	2.3	3.0	2.7	
14.Taurus	2	0	1	.3	.0	.2	1	55	28	.3	24.7	12.5	
15.Colomba	0	0	0	.0	.0	.0	1	13	7	.3	6.0	3.2	
16.Crisper	0	0	0	.0	.0	.0	14	11	13	5.0	3.7	4.4	
17.Eurostar	0	0	0	.0	.0	.0	11	69	40	4.7	25.7	15.2	
18.Esmeralda	0	0	0	.0	.0	.0	3	8	6	1.3	4.0	2.7	
19.Clairette 03TT007006	1	0	1	.3	.0	.2	47	43	45	16.7	20.3	18.5	
20.Amany 03TT189010	0	0	0	.0	.0	.0	67	28	48	29.7	12.3	21.0	
21.Anoe	3	0	2	1.0	.0	.5	1	25	13	.7	10.3	5.5	
22.Corsa	2	0	1	.3	.0	.2	0	101	51	.0	34.0	17.0	
23.Diego Noe 1209/02	1	0	1	.3	.0	.2	23	26	25	9.3	11.7	10.5	
24.Umatilla Russet	0	0	0	.0	.0	.0	201	279	240	39.3	43.0	41.2	
25.Lady Felicia	1	0	1	.3	.0	.2	0	16	8	.0	6.7	3.4	
26.Bintje	6	0	3	1.3	.0	.7	219	197	208	56.7	59.0	57.9	
27.Agria	1	0	1	.3	.0	.2	93	75	84	30.0	29.7	29.9	
28.Lady Claire	0	0	0	.0	.0	.0	3	29	16	1.0	14.3	7.7	
Moyenne de l'essai	1	0	0	.2	.0	.1	37	58	47	11.6	18.1	14.8	
Versuchs-Mittel													

Variété Sorte	Gale argentée <i>Helminthosporium solani</i> Silberschorf							Gale poudreuse <i>Spongospora subterranea</i> Pulverschorf						
	Indice / Index			% 2011 2012 11-12			Indice / Index			% 2011 2012 11-12				
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12		
1.Georgina	297	250	274	80.3	66.7	73.5	99	91	95	22.3	22.7	22.5		
2.Ottawa	311	500	406	80.0	100.0	90.0	7	23	15	1.3	9.3	5.3		
3.Albata	262	297	280	63.0	73.3	68.2	3	27	15	1.0	10.3	5.7		
4.Miss Malina	273	390	332	71.3	80.0	75.7	1	0	1	.3	.0	.2		
5.Kiebitz	466	387	427	93.3	80.0	86.7	30	15	23	9.0	5.7	7.4		
6.Kiwi	404	340	372	86.7	86.7	86.7	0	0	0	.0	.0	.0		
7.Roncalla	289	317	303	78.3	73.3	75.8	17	13	15	5.0	5.7	5.4		
8.Puccini	307	343	325	81.7	86.7	84.2	27	23	25	7.3	8.7	8.0		
9.Action AR 01-0978	477	483	480	86.7	93.3	90.0	0	2	1	.0	.7	.4		
10.Bridget JA 00-1881	175	410	293	60.0	86.7	73.4	0	7	4	.0	3.3	1.7		
11.Lady Lenora	211	250	231	67.3	66.7	67.0	5	5	5	1.7	2.0	1.9		
12.CMK 2002-055-010	389	560	475	86.7	100.0	93.4	0	9	5	.0	3.7	1.9		
13.Leontine	195	240	218	59.7	73.3	66.5	2	1	2	.7	.3	.5		
14.Taurus	260	343	302	71.3	86.7	79.0	2	1	2	.7	.3	.5		
15.Colomba	341	273	307	87.7	73.3	80.5	40	3	22	11.0	1.3	6.2		
16.Crisper	507	367	437	98.0	86.7	92.4	73	55	64	17.7	16.7	17.2		
17.Eurostar	331	310	321	83.3	73.3	78.3	148	111	130	28.0	24.7	26.4		
18.Esmeralda	103	277	190	34.7	73.3	54.0	3	17	10	.7	7.7	4.2		
19.Clairette 03TT007006	347	277	312	84.3	66.7	75.5	123	28	76	26.3	7.7	17.0		
20.Amany 03TT189010	187	240	214	53.0	66.7	59.9	142	97	120	24.0	26.0	25.0		
21.Anoe	382	367	375	100.0	86.7	93.4	3	5	4	1.0	2.3	1.7		
22.Corsa	130	247	189	44.7	73.3	59.0	12	25	19	3.3	10.7	7.0		
23.Diego Noe 1209/02	373	377	375	84.0	93.3	88.7	3	7	5	.7	3.3	2.0		
24.Umatilla Russet	316	170	243	81.7	53.3	67.5	0	21	11	.0	9.0	4.5		
25.Lady Felicia	353	287	320	73.3	73.3	73.3	0	15	8	.0	5.7	2.9		
26.Bintje	295	240	268	73.3	66.7	70.0	84	39	62	16.0	14.3	15.2		
27.Agria	231	330	281	71.0	83.3	77.2	85	141	113	18.3	34.7	26.5		
28.Lady Claire	506	547	527	93.3	100.0	96.7	11	31	21	3.0	11.7	7.4		
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	311	336	324	76.0	79.4	77.7	33	29	31	7.1	8.9	8.0		

Variété Sorte	Rhizoctone / Rhizoctonia <i>Rhizoctonia solani</i>											
	sclérites / Pocken						déformant / Knollendeformation					
	Indice / Index			%			Indice / Index			%		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	124	48	86	28.0	14.3	21.2	11	183	97	3.7	32.3	18.0
2.Ottawa	187	114	151	40.7	25.3	33.0	25	137	81	6.0	25.7	15.9
3.Albata	74	109	92	18.7	25.3	22.0	19	40	30	6.7	11.3	9.0
4.Miss Malina	4	13	9	1.3	5.0	3.2	1	22	12	.3	6.0	3.2
5.Kiebitz	3	47	25	1.0	9.3	5.2	5	31	18	1.7	8.0	4.9
6.Kiwi	3	1	2	.7	.7	.7	6	9	8	2.0	2.3	2.2
7.Roncalla	11	113	62	3.7	31.0	17.4	2	23	13	1.0	8.7	4.9
8.Puccini	189	245	217	48.3	59.3	53.8	6	57	32	1.7	17.0	9.4
9.Action AR 01-0978	14	5	10	4.3	1.3	2.8	1	21	11	.3	4.7	2.5
10.Bridget JA 00-1881	11	3	7	4.7	.7	2.7	5	4	5	1.7	1.0	1.4
11.Lady Lenora	5	15	10	1.3	5.3	3.3	2	24	13	.7	6.0	3.4
12.CMK 2002-055-010	61	21	41	15.7	6.7	11.2	18	43	31	4.7	13.0	8.9
13.Leontine	7	3	5	2.0	1.7	1.9	1	28	15	.7	7.0	3.9
14.Taurus	25	123	74	6.7	31.3	19.0	8	101	55	2.3	22.7	12.5
15.Colomba	0	15	8	.0	5.0	2.5	1	10	6	.3	4.0	2.2
16.Crisper	12	5	9	3.3	1.3	2.3	15	42	29	5.7	9.7	7.7
17.Eurostar	10	5	8	2.3	1.3	1.8	8	18	13	2.3	4.0	3.2
18.Esmeralda	72	179	126	15.7	49.0	32.4	4	91	48	1.3	19.7	10.5
19.Clairette 03TT007006	0	79	40	.0	21.0	10.5	0	43	22	.0	12.3	6.2
20.Amany 03TT189010	3	11	7	1.3	2.7	2.0	10	42	26	4.3	10.0	7.2
21.Anoe	6	13	10	1.7	4.0	2.9	4	34	19	1.3	8.7	5.0
22.Corsa	21	75	48	4.7	18.3	11.5	4	34	19	1.0	9.3	5.2
23.Diego Noe 1209/02	3	10	7	.7	3.7	2.2	4	23	14	1.3	7.0	4.2
24.Umatilla Russet	17	11	14	4.0	2.7	3.4	11	32	22	3.7	7.0	5.4
25.Lady Felicia	11	1	6	2.7	.3	1.5	0	53	27	.0	11.7	5.9
26.Bintje	7	19	13	3.0	6.0	4.5	1	61	31	.3	14.7	7.5
27.Agria	27	17	22	6.3	5.3	5.8	8	115	62	2.0	23.0	12.5
28.Lady Claire	1	3	2	.3	1.0	.7	1	39	20	.3	13.3	6.8
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	32	47	39	8.0	12.1	10.0	6	49	28	2.0	11.4	6.7

Variété Sorte	Taches grises						Coeur creux et brun					
	Graufleckigkeit						Braun- und Hohlherzigkeit					
	Indice / Index			%			Indice / Index			%		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	5	7	6	1.0	2.3	1.7	0	3	2	.0	.7	.4
2.Ottawa	22	23	23	6.3	6.3	6.3	14	13	14	3.0	2.3	2.7
3.Albata	29	23	26	9.0	5.7	7.4	3	2	3	.7	.3	.5
4.Miss Malina	51	35	43	17.0	10.3	13.7	0	0	0	.0	.0	.0
5.Kiebitz	11	19	15	4.0	5.3	4.7	1	17	9	.3	3.0	1.7
6.Kiwi	49	87	68	15.0	26.0	20.5	0	2	1	.0	.7	.4
7.Roncalla	7	7	7	1.7	2.7	2.2	0	0	0	.0	.0	.0
8.Puccini	18	7	13	5.0	2.0	3.5	0	0	0	.0	.0	.0
9.Action AR 01-0978	17	17	17	4.0	4.3	4.2	1	1	1	.3	.3	.3
10.Bridget JA 00-1881	22	64	43	7.0	16.7	11.9	8	2	5	1.7	.7	1.2
11.Lady Lenora	8	22	15	2.7	7.0	4.9	1	0	1	.3	.0	.2
12.CMK 2002-055-010	3	5	4	1.0	1.3	1.2	0	14	7	.0	2.0	1.0
13.Leontine	2	4	3	.7	1.7	1.2	0	0	0	.0	.0	.0
14.Taurus	17	27	22	6.0	8.7	7.4	0	0	0	.0	.0	.0
15.Colomba	14	6	10	4.0	2.7	3.4	0	0	0	.0	.0	.0
16.Crisper	77	27	52	23.7	7.3	15.5	3	3	3	1.0	.7	.9
17.Eurostar	3	21	12	1.0	6.7	3.9	0	1	1	.0	.3	.2
18.Esmeralda	12	8	10	3.0	2.3	2.7	3	0	2	.3	.0	.2
19.Clairette 03TT007006	1	17	9	.3	5.0	2.7	3	0	2	.3	.0	.2
20.Amany 03TT189010	4	2	3	1.7	.7	1.2	0	1	1	.0	.3	.2
21.Anoe	17	11	14	5.3	3.3	4.3	10	10	10	1.7	2.0	1.9
22.Corsa	12	3	8	3.0	1.0	2.0	4	10	7	.7	2.0	1.4
23.Diego Noe 1209/02	28	37	33	7.7	10.7	9.2	8	1	5	2.0	.3	1.2
24.Umatilla Russet	71	31	51	16.7	9.3	13.0	16	6	11	3.0	1.3	2.2
25.Lady Felicia	3	19	11	1.0	5.3	3.2	0	9	5	.0	1.7	.9
26.Bintje	15	19	17	5.0	5.3	5.2	1	0	1	.3	.0	.2
27.Agria	27	12	20	9.3	3.7	6.5	15	22	19	3.3	4.3	3.8
28.Lady Claire	28	8	18	6.0	2.7	4.4	3	0	2	.7	.0	.4
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	20	20	20	6.0	5.9	6.0	3	4	4	.7	.8	.8

Variété Sorte	Nécroses annulaires Pfropfenbildung Mop top, Rattle						Virus Y nécrogène Ringnekrosevirus PVY ^{NTN}					
	Indice / Index			% 2011 2012 11-12			Indice / Index			% 2011 2012 11-12		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	16	0	8	3.0	.0	1.5	0	0	0	.0	.0	.0
2.Ottawa	5	0	3	1.0	.0	.5	0	0	0	.0	.0	.0
3.Albata	3	0	2	.7	.0	.4	0	0	0	.0	.0	.0
4.Miss Malina	0	17	9	.0	3.7	1.9	0	0	0	.0	.0	.0
5.Kiebitz	49	0	25	10.3	.0	5.2	0	0	0	.0	.0	.0
6.Kiwi	13	6	10	2.7	1.7	2.2	1	0	1	.3	.0	.2
7.Roncalla	4	0	2	1.0	.0	.5	0	0	0	.0	.0	.0
8.Puccini	1	0	1	.3	.0	.2	0	0	0	.0	.0	.0
9.Action AR 01-0978	0	0	0	.0	.0	.0	1	15	8	.3	5.3	2.8
10.Bridget JA 00-1881	6	2	4	1.3	.3	.8	0	0	0	.0	.0	.0
11.Lady Lenora	11	0	6	3.0	.0	1.5	9	5	7	2.7	1.0	1.9
12.CMK 2002-055-010	59	1	30	10.3	.3	5.3	0	0	0	.0	.0	.0
13.Leontine	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
14.Taurus	37	18	28	8.3	4.0	6.2	1	0	1	.3	.0	.2
15.Colomba	14	0	7	3.7	.0	1.9	0	0	0	.0	.0	.0
16.Crisper	43	8	26	8.3	1.3	4.8	0	0	0	.0	.0	.0
17.Eurostar	7	0	4	1.0	.0	.5	0	0	0	.0	.0	.0
18.Esmeralda	158	18	88	22.7	2.7	12.7	0	0	0	.0	.0	.0
19.Clairette 03TT007006	47	0	24	9.7	.0	4.9	0	0	0	.0	.0	.0
20.Amany 03TT189010	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
21.Anoe	11	0	6	2.7	.0	1.4	2	0	1	.7	.0	.4
22.Corsa	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
23.Diego Noe 1209/02	24	0	12	6.0	.0	3.0	0	0	0	.0	.0	.0
24.Umatilla Russet	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
25.Lady Felicia	1	0	1	.3	.0	.2	0	0	0	.0	.0	.0
26.Bintje	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
27.Agria	0	0	0	.0	.0	.0	0	0	0	.0	.0	.0
28.Lady Claire	0	0	0	.0	.0	.0	0	3	2	.0	1.0	.5
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	18	3	10	3.4	.5	2.0	1	1	1	.2	.3	.2

Variété Sorte	Taches de rouille					
	Indice / Index			Eisenfleckigkeit		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	3	6	5	.7	1.0	.9
2.Ottawa	13	62	38	2.3	12.3	7.3
3.Albata	0	1	1	.0	.3	.2
4.Miss Malina	0	0	0	.0	.0	.0
5.Kiebitz	0	0	0	.0	.0	.0
6.Kiwi	0	0	0	.0	.0	.0
7.Roncalla	12	2	7	3.0	.3	1.7
8.Puccini	0	0	0	.0	.0	.0
9.Action AR 01-0978	1	0	1	.3	.0	.2
10.Bridget JA 00-1881	3	5	4	1.0	1.3	1.2
11.Lady Lenora	12	3	8	2.7	1.0	1.9
12.CMK 2002-055-010	0	3	2	.0	.7	.4
13.Leontine	41	18	30	10.3	4.7	7.5
14.Taurus	3	0	2	.7	.0	.4
15.Colomba	0	0	0	.0	.0	.0
16.Crisper	0	0	0	.0	.0	.0
17.Eurostar	1	13	7	.3	3.3	1.8
18.Esmeralda	1	11	6	.3	2.3	1.3
19.Clairette 03TT007006	0	5	3	.0	1.7	.9
20.Amany 03TT189010	23	84	54	6.0	14.7	10.4
21.Anoe	1	8	5	.3	2.7	1.5
22.Corsa	13	0	7	2.7	.0	1.4
23.Diego Noe 1209/02	9	27	18	2.0	5.3	3.7
24.Umatilla Russet	1	0	1	.7	.0	.4
25.Lady Felicia	0	25	13	.0	5.7	2.9
26.Bintje	1	1	1	.3	.3	.3
27.Agria	0	1	1	.0	.3	.2
28.Lady Claire	0	1	1	.0	.3	.2
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	5	10	7	1.2	2.1	1.6

Variété Sorte	Noircissement après cuisson								
	Schwarzkochen								
	Indice Farbindex			Tubercules avec indice >30 en % Knollen mit Index >30 in %			Note		
	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12	2011	2012	11-12
1.Georgina	18.0	16.6	17.3	2.5	.0	1.3	2.5	4.5	3.5
2.Ottawa	17.0	16.9	17.0	1.3	3.8	2.6	5.0	5.5	5.3
3.Albata	17.6	17.8	17.7	5.0	1.3	3.2	6.0	5.0	5.5
4.Miss Malina	17.3	19.4	18.4	1.3	1.3	1.3	5.5	4.0	4.8
5.Kiebitz	16.9	22.4	19.7	.0	8.8	4.4	5.0	5.5	5.3
6.Kiwi	17.1	17.6	17.4	.0	5.0	2.5	5.0	4.5	4.8
7.Roncalla	14.8	19.6	17.2	.0	3.8	1.9	4.0	5.0	4.5
8.Puccini	14.9	20.8	17.9	.0	15.0	7.5	5.0	4.5	4.8
9.Action AR 01-0978	17.2	19.3	18.3	1.3	1.3	1.3	5.5	4.5	5.0
10.Bridget JA 00-1881	15.9	16.8	16.4	.0	2.5	1.3	5.0	4.5	4.8
11.Lady Lenora	20.9	22.1	21.5	11.3	10.0	10.7	6.0	4.5	5.3
12.CMK 2002-055-010	18.1	17.6	17.9	8.8	2.5	5.7	5.0	5.5	5.3
13.Leontine	22.8	23.5	23.2	26.3	8.8	17.6	6.5	3.5	5.0
14.Taurus	17.2	19.2	18.2	3.8	6.3	5.1	5.5	3.0	4.3
15.Colomba	15.0	25.3	20.2	5.0	13.8	9.4	4.0	5.0	4.5
16.Crisper	15.0	18.2	16.6	1.3	.0	.7	4.5	3.5	4.0
17.Eurostar	17.1	16.9	17.0	1.3	3.8	2.6	4.5	5.0	4.8
18.Esmeralda	20.8	19.4	20.1	11.3	5.0	8.2	6.5	5.5	6.0
19.Clairette 03TT007006	15.3	17.5	16.4	.0	1.3	.7	5.0	4.5	4.8
20.Amany 03TT189010	13.8	18.4	16.1	.0	3.8	1.9	3.5	4.0	3.8
21.Anoe	14.8	17.8	16.3	.0	.0	.0	4.5	4.5	4.5
22.Corsa	16.3	22.4	19.4	1.3	8.8	5.1	5.5	4.0	4.8
23.Diego Noe 1209/02	17.3	17.9	17.6	8.8	.0	4.4	5.5	4.5	5.0
24.Umatilla Russet	13.8	16.4	15.1	1.3	2.5	1.9	4.0	4.0	4.0
25.Lady Felicia	15.5	19.1	17.3	.0	3.8	1.9	3.5	4.5	4.0
26.Bintje	15.4	16.4	15.9	.0	.0	.0	4.5	5.0	4.8
27.Agria	12.4	16.4	14.4	.0	.0	.0	2.0	4.5	3.3
28.Lady Claire	16.3	16.6	16.5	.0	.0	.0	6.0	5.0	5.5
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	16.6	18.9	17.7	3.3	4.0	3.7	4.8	4.6	4.7

Variété Sorte	Conservation			Germination			Type culinaire		
	Lagerung		Note ⁴⁾	Auskeimen		Note	Kochtyp		
	2011	2012		11-12	2011		2011	2012	11-12
1.Georgina	6.0	4.0	5.0	4.3	3.5	3.9	A-B	B	B-A
2.Ottawa	3.5	1.0	2.3	4.0	4.0	4.0	C-B	B-C	B-C
3.Albata	5.0	4.0	4.5	6.0	4.0	5.0	C	C-B	C-B
4.Miss Malina	5.0	4.0	4.5	4.7	4.0	4.4	C-B	C-B	C-B
5.Kiebitz	3.5	3.0	3.3	5.0	4.0	4.5	C-D	C	C
6.Kiwi	5.5	6.0	5.8	4.3	5.0	4.7	C-D	C-D	C-D
7.Roncalla	6.0	7.0	6.5	5.0	4.5	4.8	A-B	B-A	B-A
8.Puccini	3.0	2.0	2.5	4.0	3.0	3.5	C	C-D	C
9.Action AR 01-0978	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.8	C	C	C
10.Bridget JA 00-1881	5.0	4.0	4.5	5.3	3.5	4.4	B-C	C	C-B
11.Lady Lenora	6.0	6.0	6.0	5.7	4.5	5.1	D-C	C	C-D
12.CMK 2002-055-010	1.5	2.0	1.8	4.3	4.0	4.2	C-D	C-B	C
13.Leontine	5.5	8.0	6.8	5.7	6.5	6.1	A-B	A-Bw	A-Bw
14.Taurus	1.5	1.0	1.3	2.7	2.5	2.6	C-D	C	C-D
15.Colomba	6.0	8.0	7.0	6.0	6.5	6.3	B-Aw	A-Bw	A-Bw
16.Crisper	5.5	9.0	7.3	5.3	6.0	5.7	C	C-B	C
17.Eurostar	3.5	3.0	3.3	5.0	4.0	4.5	C	B-C	C-B
18.Esmeralda	2.5	2.0	2.3	4.3	4.0	4.2	B-A	B-A	B-A
19.Clairette 03TT007006	5.0	5.0	5.0	4.7	5.5	5.1	B	B-C	B-C
20.Amany 03TT189010	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	C-B	B-C	C-B
21.Anoe	5.5	5.0	5.3	6.0	4.0	5.0	B-A	B-A	B-A
22.Corsa	2.5	3.0	2.8	4.7	4.5	4.6	B-A	B	B-A
23.Diego Noe 1209/02	2.0	3.0	2.5	3.3	4.0	3.7	C-D	C-B	C
24.Umatilla Russet	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.5	C	C-B	C
25.Lady Felicia	2.5	2.0	2.3	4.0	3.5	3.8	B	B-C	B
26.Bintje	4.0	3.0	3.5	5.7	4.5	5.1	B-C	B-C	B-C
27.Agria	2.0	1.0	1.5	3.7	3.0	3.4	C	B-C	C-B
28.Lady Claire	4.0	2.0	3.0	4.3	3.5	3.9	C	C-B	C
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	4.1	4.0	4.0	4.8	4.3	4.5			

⁴⁾ seulement Changins et La Frêtaz 2011 et Changins 2012
nur Anbauorte Changins und La Frêtaz 2011 und Changins 2012

Description des tubercules / Beschreibung der Knollenform 2011 - 2012

1.Georgina	Forme du tubercule : oblong court à oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : kurzoval bis langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
2.Ottawa	Forme du tubercule : oblong à long, en partie claviforme, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval bis lang, zum Teil hörnchenformig, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels à superficiels / mittelflach bis flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair à jaune / hellgelb bis gelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
3.Albata	Forme du tubercule : oblong à oblong court, un peu aplati Knollenform : langoval bis kurzoval, etwas platt Yeux / Augen : mi-superficiels à superficiels / mittelflach bis flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : rose, fortement réticulée / rosa gross genetzt
4.Miss Malina	Forme du tubercule : oblong, régulier Knollenform : langoval, regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
5.Kiebitz	Forme du tubercule : rond, régulier Knollenform : rund, regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels à mi-profonds / mittelflach bis mitteltief Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune à jaune clair / gelb bis hellgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
6.Kiwi	Forme du tubercule : oblong court à rond, un peu aplati et très régulier Knollenform : kurzoval bis rund, etwas platt und sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune / gelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
7.Roncalla	Forme du tubercule : oblong court, très régulier Knollenform : kurzoval, sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune foncé / tiefgelb

8.Puccini	Forme du tubercule : rond à oblong court, régulier Knollenform : rund bis kurzoval, regelmässig Yeux / Augen : profonds à mi-profonds / tief bis mitteltief Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-profond / mitteltief Chair / Fleisch : jaune / gelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
9.Action AR 01-0978	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : rouge, mi-superficiels / rot mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune / gelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
10.Bridget JA 00-1881	Forme du tubercule : oblong, un peu aplati et plutôt gros Knollenform : langoval, etwas platt und eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
11.Lady Lenora	Forme du tubercule : rond à oblong court, plutôt gros Knollenform : rund bis kurzoval, eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : blanche / weiss
12.CMK 2002-055-01	Forme du tubercule : oblong, un peu aplati Knollenform : langoval, etwas platt Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : blanche / weiss Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
13.Leontine	Forme du tubercule : long, un peu aplati, plutôt gros, en partie piriforme et régulier Knollenform : lang, etwas platt, eher grossfallend, zum Teil birnförmig und regelmässig Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
14.Taurus	Forme du tubercule : rond, un peu aplati et régulier Knollenform : rund, etwas platt und regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb

15.Columba	Forme du tubercule : oblong à oblong court, un peu aplati, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval bis kurzoval, etwas platt, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
16.Crisper	Forme du tubercule : oblong court, un peu aplati et très régulier Knollenform : kurzoval, etwas platt und sehr regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
17.Eurostar	Forme du tubercule : oblong à oblong court, un peu aplati et plutôt gros Knollenform : langoval bis kurzoval, etwas platt und eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
18.Esmeralda	Forme du tubercule : très long, en partie claviforme, plutôt gros et très régulier Knollenform : sehr lang, zum Teil hörnchenförmig, eher grossfallend und sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
19.Clairette G03TT007006	Forme du tubercule : oblong court, un peu aplati Knollenform : kurzoval, etwas platt Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
20.Amany G03TT189010	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
21.Anoe	Forme du tubercule : long, en partie claviforme, plutôt gros et régulier Knollenform : lang, zum Teil hörnchenförmig, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb

22.Corsa	Forme du tubercule : oblong, un peu aplati Knollenform : langoval, etwas platt Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
23.Diego Noe 1209/02	Forme du tubercule : oblong à oblong court, un peu aplati et plutôt gros Knollenform : langoval bis kurzoval, etwas platt und eher grossfallend Yeux / Augen : superficiels / flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune à jaune clair / gelb bis hellgelb Peau / Schale : légèrement réticulée / klein genetzt
24.Umatilla Russet	Forme du tubercule : oblong à long, un peu aplati, plutôt gros et régulier Knollenform : langoval bis lang, etwas platt, eher grossfallend und regelmässig Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : blanche / weiss Peau / Schale : ocre, fortement réticulée / oker gross genetzt
25.Lady Felicia	Forme du tubercule : oblong, plutôt gros et très régulier Knollenform : langoval, eher grossfallend und sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels / flach Chair / Fleisch : jaune / gelb
26.Bintje	Forme du tubercule : oblong, un peu aplati Knollenform : langoval, etwas platt Yeux / Augen : mi-superficiels / mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Ombilic / Nabel : mi-superficiel / mittelflach Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb
27.Agria	Forme du tubercule : oblong, un peu aplati et plutôt gros Knollenform : langoval, etwas platt und eher grossfallend Yeux / Augen : mi-superficiels à superficiels / mittelflach bis flach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune à jaune foncé / gelb bis tiefgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt
28.Lady Claire	Forme du tubercule : oblong court, un peu aplati et très régulier Knollenform : kurzoval, etwas platt und sehr regelmässig Yeux / Augen : superficiels à mi-superficiels / flach bis mittelflach Arcades/Augenleisten : apparentes / ausgeprägt Chair / Fleisch : jaune clair / hellgelb Peau / Schale : fortement réticulée / gross genetzt

Observations complémentaires / Ergänzende Beobachtungen

2011 - 2012

Variété Sorte	Verdis- sement Grünscha- ligkeit	Craquelures Schalenris- sigkeit	Crevasses Wachstums- risse	Tubercules diformes Zwiewuchs	Repousses Kindelbildung	Ombilic vitreux wässriger Nabelteil
1.Georgina	4.3	1.2	4.7	1.0	1.6	3.4
2.Ottawa	5.5	2.0	3.1	2.3	1.6	1.0
3.Albata	3.9	1.4	1.5	1.7	2.1	1.0
4.Miss Malina	4.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3
5.Kiebitz	5.7	1.0	1.4	1.2	1.2	1.0
6.Kiwi	3.9	1.0	1.2	1.4	1.0	1.0
7.Roncalla	4.3	3.2	1.3	1.7	1.0	2.0
8.Puccini	4.3	2.3	1.3	1.8	2.1	1.0
9.Action	5.0	1.0	1.9	1.7	1.3	1.2
10.Bridget	4.7	1.6	1.4	1.5	1.5	1.0
11.Lady Lenora	4.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.2
12.CMK 2002-055-0	4.2	1.0	3.0	1.7	2.0	1.0
13.Leontine	3.6	2.3	1.4	2.3	2.1	2.5
14.Taurus	3.5	2.6	2.5	1.6	1.4	1.0
15.Colomba	3.8	2.4	1.3	1.2	1.6	1.7
16.Crisper	3.3	1.0	1.4	1.4	1.0	1.0
17.Eurostar	4.0	1.0	2.4	2.9	3.8	1.0
18.Esmeralda	3.7	1.0	2.0	1.9	2.0	1.4
19.Clairette	3.3	1.0	2.0	1.2	1.2	1.0
20.Amany	2.4	1.2	1.5	1.2	2.8	2.7
21.Anoe	3.4	1.4	2.7	2.7	2.1	2.4
22.Corsa	3.6	1.4	1.8	1.2	1.2	1.0
23.Diego	4.5	1.0	1.2	1.2	1.0	1.5
24.Umatilla Russet	3.6	1.0	2.1	1.7	1.4	1.0
25.Lady Felicia	4.0	1.0	1.7	1.6	1.2	1.0
26.Bintje	2.7	1.0	3.5	2.4	2.8	1.0
27.Agria	4.1	1.2	2.1	2.2	2.3	1.0
28.Lady Claire	3.4	1.2	1.0	1.3	2.1	1.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	4.0	1.4	1.9	1.6	1.7	1.4

Note après transformation logarithmique

1 = pas atteint / kein Befall

5 = 9 % d'attaque / 9 % Befall

9 = très fortement atteint / totaler Befall

Variété Sorte	Cheese vitreuse spongieuse ou tendre Fleisch glasig, schwammig oder weich	Infection de l'ombilic Nabel- infektion	Coloration des trachéides Tracheiden- verfärbung	Cheese avec veinures violette Fleisch mit violette Verfärbung	Taches vitreuses Stippigkeit	Virus ABC nécrotique du tabac Tabak- nekrose- virus ¹⁾
1.Georgina	1.0	3.3	1.4	1.0	1.0	1.0
2.Ottawa	1.4	4.9	3.8	1.0	1.0	1.0
3.Albata	1.0	2.3	2.6	1.0	1.0	1.0
4.Miss Malina	1.0	3.0	1.8	1.0	1.0	1.0
5.Kiebitz	2.4	2.4	1.8	1.0	1.0	1.0
6.Kiwi	1.2	2.9	2.1	1.0	1.4	1.0
7.Roncalla	1.0	2.0	1.6	1.0	1.0	1.0
8.Puccini	3.7	2.3	1.8	1.0	1.0	1.0
9.Action	1.8	2.5	2.1	1.0	1.4	3.2
10.Bridget	1.0	2.1	1.6	1.0	1.0	1.0
11.Lady Lenora	1.9	4.8	2.4	1.0	1.0	1.0
12.CMK 2002-055-0	1.5	4.3	1.7	1.0	1.2	1.0
13.Leontine	1.6	3.3	5.3	1.0	1.4	1.0
14.Taurus	1.8	3.2	2.8	1.0	1.0	1.0
15.Colomba	2.2	3.0	2.4	1.0	1.0	1.0
16.Crisper	1.0	2.9	2.8	1.2	1.0	1.0
17.Eurostar	3.6	2.0	2.5	1.0	1.0	3.0
18.Esmeralda	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.Clairette	2.8	2.1	1.2	1.0	1.3	3.9
20.Amany	1.7	2.2	1.7	1.0	1.2	1.0
21.Anoe	2.3	2.5	1.2	1.0	1.0	6.2
22.Corsa	1.0	2.3	1.2	1.0	1.0	1.0
23.Diego	1.3	2.6	2.8	1.0	1.0	7.5
24.Umatilla Russet	1.0	1.9	2.0	1.0	1.0	1.0
25.Lady Felicia	1.2	3.0	2.8	1.0	1.0	3.6
26.Bintje	1.3	2.3	3.6	1.0	1.0	4.9
27.Agria	1.6	3.1	3.8	1.0	1.0	1.0
28.Lady Claire	1.2	2.9	1.6	1.0	1.0	1.0
Moyenne de l'essai Versuchs-Mittel	1.6	2.8	2.3	1.0	1.1	1.9

Note après transformation logarithmique

1 = pas atteint / kein Befall

¹⁾ Maran

5 = 9 % d'attaque / 9 % Befall

9 = très fortement atteint / totaler Befall

Variété	Virus sur les plants importés en 2011 (Test Elisa)					
	Virosen auf dem Importsaatgut %					
Sorte	PLRV	PVY	PVS	PVA	PVM	PVX
1.Georgina	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2.Ottawa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3.Albata	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4.Miss Malina	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5.Kiebitz	.0	.0	.0	.0	.0	.0
6.Kiwi	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7.Roncalla	.0	.0	.0	.0	.0	.0
8.Puccini	.0	.0	.0	.0	.0	.0
9.Action	.0	.0	.0	.0	.0	.0
10.Bridget	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
11.Lady Lenora	.0	.0	.0	.0	.0	.0
12.CMK 2002-055-0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
13.Leontine	.0	.0	.0	.0	.0	.0
14.Taurus	.0	.0	.0	.0	.0	.0
15.Colomba	.0	.0	.0	.0	.0	.0
16.Crisper	.0	.0	.0	.0	.0	.0
17.Eurostar	.0	.0	.0	.0	.0	.0
18.Esmeralda	2.2	.0	.0	.0	.0	.0
19.Clairette	2.2	.0	.0	.0	.0	.0
20.Amany	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
21.Anoe	.0	.0	.0	.0	.0	.0
22.Corsa	.0	.0	100.0	.0	.0	.0
23.Diego	.0	.0	97.8	.0	.0	.0
24.Umatilla Russet	.0	.0	.0	.0	.0	.0
25.Lady Felicia	.0	.0	.0	.0	.0	.0
26.Bintje	.0	.0	.0	.0	.0	.0
27.Agria	.0	.0	4.4	.0	.0	.0
28.Lady Claire	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Moyenne de l'essai						
Versuchs-Mittel	.2	.2	7.2	.0	.0	.0

Noircissement des tubercules après cuisson / Verfärbung nach dem Kochen

Echantillon / Probe :

Echelle / Skala :

Variété / Sorte :

Année / Jahr :

Provenance / Herkunft :

Date / Datum :

Tubercule / Knollen Nr.	O / 0	C / 0	Total	O / 24	C / 24	Total
1	* 4	1	1	* 5	1	1
2	* 5	2	2	* 6	3	3
3	2	1	3	2	1	3
4	3	1	4	3	1	4
5	2	1	3	3	2	5
6	3	2	5	3	3	6
7	3	2	5	3	2	5
8	3	2	5	* 4	2	2
9	2	1	3	3	2	5
10	2	1	3	2	1	3
11	1	1	2	1	1	2
12	3	2	5	3	2	5
13	2	1	3	3	2	5
14	2	1	3	3	2	5
15	2	1	3	2	2	4
16	3	2	5	3	2	5
17	2	1	3	3	1	4
18	3	2	5	3	2	5
19	2	1	3	2	1	3
20	2	1	3	2	2	4
	51	27	78	59	35	94

O / 0 = Ombilic, immédiatement
après cuissonNabelende, unmittelbar
nach dem KochenC / 0 = Couronne, immédiatement
après cuissonKronenende, unmittelbar
nach dem KochenO / 24 = Ombilic, 24 heures
après cuissonNabelende, 24 Stunden
nach dem KochenC / 24 = Couronne, 24 heures
après cuissonKronenende, 24 Stunden
nach dem Kochen

Indice de noircissement /

Farbindex : $\frac{172 \times 10}{80} = 21,5$

* Pour-cent de tubercules dépassant le degré de noircissement 3 /

* Prozent Anteil Knollen mit Farbzahl grösser als 3 :

 $\frac{5 \times 100}{40} = 12,5$

Observations / Bemerkungen :