

Cabernello

Disponible dès 2021



Synonymes

En Suisse: aucun.

Origine

Cépage obtenu à la Station de recherche Agroscope à Pully en 1995, à partir d'un croisement entre Cabernet franc et Gamaret (code de sélection MRAC 40).

Phénologie

Débourrement: précoce à moyen.

Maturité: 1^{re} époque, proche de Gamaret, 2 à 3 semaines plus précoce que Cabernet sauvignon. Profite avantageusement de vendanges retardées, qui améliorent la structure, la qualité des tannins ainsi que la complexité des vins.

Importance et répartition

En raison de son homologation très récente (2017), ce cépage n'est pour l'instant présent qu'en Suisse, dans le cadre d'un réseau de parcelles expérimentales.

Aptitudes culturales et agronomiques

Caractères végétatifs: vigueur moyenne. Port semi-étalé.

Potentiel de production: moyen à élevé, grappes nombreuses, de dimensions moyennes, légère tendance au millerandage en cas de mauvaises conditions climatiques durant la floraison.

Maladies, ravageurs, carences, accidents physiologiques: sensibilité faible à la pourriture (entre Garanoir et Gamaret). Légère tendance à la carence magnésienne et au dessèchement de la rafle (moins que Cabernet sauvignon) en vignes jeunes et dans des sols riches en potassium.

Terroirs de prédilection: semble s'adapter à un large éventail de sols et de climats (comme Gamaret). En raison du niveau de maturité élevé requis pour l'élaboration de vins de qualité, il convient toutefois d'éviter des situations trop marginales.

Potentiel œnologique

Moût: neutre, sucré avec une acidité moyenne à plutôt basse.

Vin: très coloré, très corsé avec des tannins puissants et fermes, profil de vin de garde. Bouquet caractérisé par des notes de fruits noirs (cassis, cerise noire), d'épices piquantes (poivre, piment) et douces (réglisse), végétales (poivron, menthol) et empyreumatiques (café, cuir).

Extrémité du rameau

Ouverture: complètement ouverte

Pigmentation anthocyanique: faible

Densité des poils couchés: forte



Feuille adulte

Forme du limbe: pentagonale

Nombre de lobes: 3

Couleur de la face supérieure: vert moyen à foncé

Pigmentation des nervures: absente à très faible

Cloûre: moyenne

Forme des dents: à deux côtés rectilignes

Ouverture du sinus pétiolaire: largement ouvert

Densité des poils couchés (face inférieure): faible

Densité des poils dressés des nervures (face inférieure): nulle à très faible



Face inférieure

Jeune feuille

Couleur (face supérieure): vert avec spots anthocyaniques

Densité des poils couchés (face inférieure): moyenne



Face supérieure



Face inférieure

Rameau

Couleur de la face dorsale: vert et rouge


Couleur de la face ventrale: vert



Face dorsale



Face ventrale



Baie de référence
Chasselas

Grappe

Longueur: petite à moyenne

Compacité: moyenne

Pédoncule: moyen

Forme: conique

Nombre d'ailes: 1-2

Baie

Longueur: courte

Forme: sphérique

Couleur de l'épiderme:

bleu-noir

Intensité de la couleur de la pulpe: nulle à très faible