

Chasselas tétraploïde




Origine, importance

Le Chasselas tétraploïde n'est pas identifié en tant que tel dans les ampélographies romandes, il a certainement été assimilé aux différentes formes de Chasselas coulardes présentes dans le vignoble. Galet (2000) mentionne le Chasselas tétraploïde connu sous les appellations de Chasselas Diamant en Roumanie et de Chasselas Duc de Malakoff ou de Chasselas Vibert dans la collection ampélographique de Vassal (F). Le Chasselas tétraploïde est issu d'un accident génétique conduisant au doublement du jeu chromosomique dans le noyau des cellules ($2n=76$ au lieu de $2n=38$). Ce genre de mutation, relativement fréquente, n'est pas réservée qu'au Chasselas mais s'observe également chez la plupart des autres cépages.


Caractéristiques

La mutation tétraploïde du Chasselas s'accompagne d'une modification profonde des caractères végétatifs et génératifs. Les rameaux sont trapus avec des entre nœuds courts et irréguliers, les feuilles sont peu découpées et épaisses, les grappes sont la plupart du temps fortement coulées et les baies qui subsistent très grosses. La faible productivité du Chasselas tétraploïde ainsi que ses caractères végétatifs particuliers font qu'il a certainement été régulièrement éliminé du vignoble au même titre que les autres formes coulardes de Chasselas. Il ne subsiste qu'à l'état de curiosité dans les collections ampélographiques et accidentellement dans le vignoble.


Observations au conservatoire de Rivaz (moyennes 2012–2019)



Rameau herbacé face ventrale (à gauche) et dorsale (à droite).



Feuille adulte.



Baie (à droite) comparée à celle de référence du Chasselas fendant roux (à gauche)