

## Liste recommandée des variétés d'avoine pour la récolte 2002

J.-F. COLLAUD, R. SCHWÄRZEL et M. BERTOSSA, Station fédérale de recherches en production végétale de Changins, CH-1260 Nyon

M. MENZI et M. ANDERS, Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Reckenholz, CH-8046 Zurich

@ E-mail: jean-francois.collaud@rac.admin.ch  
Tél. (+41) 22/36 34 444.

La liste recommandée des variétés d'avoine n'a pas subi de changement par rapport à l'année passée. Elle comprend la variété d'automne Mirabel et les trois variétés de printemps Flämingsstern, Expander et Ebène. On rappellera que l'avoine d'automne est particulièrement sensible au froid nu et doit être cultivée dans des régions favorables.

Cinq nouvelles variétés d'avoine de printemps ont été inscrites au Catalogue national (Kanton, Flämingsstell, Bélinda, Adler et Chantilly). La commission technique n'a pas retenu ces variétés pour la liste recommandée, car le marché de l'avoine est très restreint et la disponibilité en semences insuffisante.

### Liste recommandée des variétés d'avoine pour la récolte 2002

Type	Hiver	Printemps		
Variété	MIRABEL	FLÄMINGSSTERN	EXPANDER	EBÈNE
Année d'homologation	1993	1999	1995	1990
Rendement	+++	++	++	+
Poids/hl	+++	Ø	Ø	++
Verse	+	+	+	+++
Précocité à l'épiaison	tp	mp	p	mp
Précocité à la récolte	p	p	p	mp
Hauteur des plantes	m	m	m	c
Oïdium	+	+	Ø	+
Utilisation en fourrage vert		++	++	-
Teneur en protéines	++	+	-	++
PMG	g	p	p	p

D'après les données des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz.

Légende: +++ = très bon  
++ = bon  
+ = moyen à bon  
Ø = moyen  
- = moyen à faible  
-- = faible  
--- = très faible

Poids de 1000 grains (PMG): p = petit; m = moyen; g = grand  
Précocité: tp = très précoce; p = précoce; mp = mi-précoce; mt = mi-tardif; t = tardif  
Hauteur des plantes: c = courte; m = moyenne; ml = moyenne à longue; l = longue; tl = très longue