

6 CONSEILS POUR UNE TRANSITION À L'HERBE EN TOUTE SÉCURITÉ

! 📷 Agroscope, Haras national suisse HNS, Bureau de conseils cheval

Les jours rallongent, la température augmente et l'herbe commence à pousser... le printemps est bien là et annonce le début de la saison de pâture! Les chevaux étant généralement nourris exclusivement avec du fourrage grossier tout au long de l'hiver, une transition à l'herbe en douceur est indispensable.

1. Éviter les changements brusques de régime alimentaire

Les chevaux sont très sensibles aux changements alimentaires. Une modification brusque de leur ration peut causer des problèmes de santé graves comme des coliques ou des fourbures. La mise en pâture au printemps doit être progressive pour permettre à la flore intestinale, habituée au foin, au préfané et à la paille en hiver, de s'adapter à l'herbe plus riche en sucres et protéines. Une transition d'au moins deux semaines est nécessaire, l'idéal étant trois à quatre semaines.


2. Augmenter progressivement le temps de pâture

Les deux premiers jours, il faudrait commencer avec 15 à 20 minutes de pâture, puis prolonger tous les deux jours de 15 minutes. Une fois que la période de pâture atteint une heure, l'extension peut se faire par demi-heure jusqu'à ce que la durée de pâture souhaitée soit atteinte. Si les chevaux ont de la diarrhée ou des maux de ventre, la durée de pâture devrait être raccourcie ou du moins pas prolongée, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Les chevaux qui ont accès au pâturage toute l'année peuvent s'adapter progressivement à leur nouvelle alimentation et n'ont donc pas besoin de mesures particulières lors de la mise au pâturage.

3. Distribuer du foin avant la mise au pâturage et adapter la ration

Il est recommandé de distribuer du foin avant de mettre les chevaux au pâturage, ce qui évitera qu'ils mangent de l'herbe fraîche avec frénésie. De plus, le foin permet de «nourrir» la flore intestinale qui ne

s'est pas encore complètement adaptée à l'herbe. Il est également conseillé de réduire la ration standard de foin et de grain en tenant compte de l'apport complémentaire en énergie et en protéines de l'herbe ingérée au pâturage.



Un frein d'alimentation bien ajusté permet à l'animal de boire et ne doit pas lui blesser la bouche. / Eine gut passende Fressbremse ermöglicht das Trinken und darf das Maul nicht verletzen.

4. Ne pas donner d'aliment concentré directement avant ou après la pâture

Il faut éviter de donner de l'aliment concentré immédiatement avant ou après la pâture. En effet, les céréales fournissent des glucides supplémentaires au système digestif qui doit déjà digérer la grande quantité de glucides contenus dans l'herbe.



Il est recommandé de distribuer du foin avant de mettre les chevaux au pâturage afin de limiter la frénésie d'ingestion d'herbe. / Vor den Weidegängen wird empfohlen, den Pferden Heu zu füttern, um die Gier auf das frische Gras zu mindern.

5. Limiter la consommation d'herbe

Pour les équidés ayant une tendance à l'embonpoint (notamment les races dites «rustiques», les poneys et les ânes), ainsi que pour les animaux sujets à la fourbure, la consommation d'herbe doit être fortement limitée tout au long de la saison de pâture. Bien souvent, il est nécessaire de restreindre la durée des sorties au pâturage et de choisir des pâtures avec peu de végétation. La prise de poids pendant la saison de pâture est bien souvent inévitable mais elle ne devrait pas dépasser 10% du poids idéal de l'animal. Le surpoids accumulé pendant la belle saison devra ensuite être perdu pendant l'hiver, en anticipation d'une nouvelle prise de poids à la prochaine saison de pâture.

6. Envisager l'utilisation d'un panier de pâturage

Le panier de pâturage constitue une solution intéressante pour limiter l'ingestion d'herbe chez un cheval en surpoids, sans devoir le séparer du reste du groupe. On trouve sur le marché de nombreux modèles, fabriqués dans des matériaux variés, présentant différentes formes et gammes de prix. Toutefois, l'utilisation d'un panier de pâturage requiert une grande attention de la part du détenteur ou de la détentrice. L'habituance doit se faire progressivement, afin de laisser au cheval le temps de s'adapter à cette restriction. Il est souvent

nécessaire d'essayer plusieurs modèles avant de trouver celui qui convient le mieux en termes de confort, d'ajustement et de solidité.

Il est recommandé de mettre l'eau à disposition dans un grand bac plutôt que dans un petit abreuvoir et de vérifier régulièrement que le cheval parvient à boire sans difficulté.

Le panier peut être utilisé lorsque la hauteur d'herbe se situe entre 3 et 15 cm. Si l'herbe est trop courte, le cheval risque d'user prématurément ses dents en tentant d'attraper des brins trop ras. Par ailleurs, des contrôles réguliers sont indispensables afin de détecter rapidement toute blessure cutanée, irritation ou abrasion dentaire liée au port du panier. Enfin, si malgré une mise en place progressive le cheval ne parvient pas à s'habituer au panier de pâturage et manifeste des signes de stress ou de frustration, il est préférable d'envisager d'autres stratégies de gestion du poids, mieux adaptées à son bien-être.