

LE GUIDE ARBO D'ACW

MALADIES	REMARQUES ET LUTTE
<p>Maladie des pochettes (<i>Taphrina pruni</i>)</p>  <p>Le champignon pénètre par les fleurs, déforme les jeunes fruits qui s'allongent tout en restant creux et sans noyau.</p>	<p>Bien que la maladie des pochettes survienne régulièrement dans les vergers de pruniers situés au-dessus de 600 m d'altitude, ce pathogène se manifeste également en plaine par printemps frais et humide. Deux applications de dithianon (9) ou de cuivre (10) au débourrement et dix jours plus tard combattent efficacement ce pathogène.</p>
<p>Rouille (<i>Tranzschelia pruni spinosa</i>)</p>  <p>En juillet et août, de petites taches jaunâtres apparaissent sur la face supérieure des feuilles, qui jaunissent et chutent prématurément. Au printemps, les feuilles des anémones se couvrent de petites fructifications jaunâtres en forme de cupule.</p>	<p>Le rouille du prunier est un champignon hétéroïque qui accomplit son cycle de développement en changeant de plante hôte. Il hiverne sous forme mycélienne dans les rhizomes de l'anémone de Caen (<i>Anemone coronaria</i>) et de l'anémone des bois à fleurs jaunes (<i>A. ranunculoides</i>). Sur les variétés de prunier sensibles (Fellenberg, pruneau de Bâle), un premier traitement entre mi- et fin juin, un deuxième entre mi- et fin juillet, combinés à la lutte contre le carpocapse, doivent être entrepris à l'aide de dithianon (9), de trifloxystrobine (5) ou de difénoconazol (7).</p>
<p>Moniliose (<i>Monilia laxa</i>, <i>M. fructigena</i>)</p>  <p>Les bouquets floraux et les rameaux infectés séchent. Les fruits brunissent et momifiés se couvrent de sporulations brunâtres (<i>M. fructigena</i>) ou grises (<i>M. laxa</i>).</p>	<p>Les printemps chauds et humides favorisent l'infection des inflorescences. Les variétés sensibles (Sultan, Président, Reine-claude verte) peuvent perdre leurs fruits peu après la floraison. Les fongicides efficaces contre la moniliose et la maladie criblée du cerisier peuvent également être appliqués sur les pruniers. Pour lutter contre la moniliose des fruits, la fenhexamide (6) est recommandée durant l'été dès que les fruits changent de couleur (délai d'attente: trois semaines avant la récolte).</p>
<p>Maladie criblée (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)</p>	<p>Voir cerisier</p>
<p>Sharka (<i>Plum pox virus</i>)</p>     <p>La sharka est la plus dangereuse virose des pruniers, abricotiers et pêchers. Elle engendre des taches sur les feuilles, parfois aussi sur les fruits et les noyaux, et rend les fruits immangeables. Elle peut également attaquer d'autres espèces de Prunus (domestiques ou sauvages). Les symptômes sur feuilles ne se marquent pas sur toutes les espèces et variétés et peuvent aussi varier d'intensité d'une année à l'autre. Les plantes qui ne présentent pas de symptômes peuvent porter le virus de manière latente et les vecteurs (pucerons) peuvent l'acquérir et le disséminer.</p> <p>La sharka est une maladie de quarantaine dont l'annonce est obligatoire auprès des services phytosanitaires cantonaux. Grâce à la campagne d'éradication menée dans les années septante, la Suisse était considérée comme exempte de sharka. Actuellement en Europe, seuls la Belgique, le Danemark, l'Estonie et la Suède sont considérés comme tels. En 2004, des attaques de sharka liées à du matériel végétal importé ont été observées dans plusieurs cantons. Depuis 2005, la sharka, à nouveau présente en Suisse, est contrôlée et combattue. Les efforts d'éradication se poursuivent pour que la Suisse soit à nouveau considérée comme exempte de cette virose.</p> <p>La lutte directe et curative n'est pas possible contre la sharka. Les plantes atteintes doivent être détruites (y compris le système racinaire) pour éviter l'expansion de la maladie. Il est donc nécessaire d'effectuer chaque année un contrôle rigoureux des symptômes foliaires du début de l'été jusqu'à la chute des feuilles – de juin à août et de préférence par temps couvert, l'observation est plus facile. Tous les arbres présentant des symptômes visuels, qui réagissent positivement au test rapide AgriStrip ou au diagnostic de laboratoire doivent être détruits immédiatement ou au plus tard à fin août. Il en va de même pour les arbres voisins qui touchent les arbres malades, voire pour toute la parcelle. C'est ainsi que la transmission par les pucerons peut être évitée. Si des pucerons ailés (vecteurs) se développent dans une culture attaquée par la sharka, ils doivent être traités dans la première quinzaine de septembre (délai d'attente de trois semaines) ou après récolte. Les repousses et les branches basses doivent impérativement être traitées également. Les mesures prophylactiques restent toutefois essentielles dans la lutte contre la sharka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – n'acheter que des plants certifiés – ne pas importer de plants provenant de régions infestées par la maladie. 	



Guide de traitements PRUNIER

1

MALADIES	MATIÈRES ACTIVES (les chiffres entre parenthèses renvoient à l'index phytosanitaire rose au centre du journal)	PÉRIODES									
		mars		avril		mai		juin		juillet	
		B 51	C 53	D 56	E 59	F 63	G 67	H 69	I 71	J 75	Baggiolini BBCH
		Débourr.		Préfloral		Floral		Postfloral		Eté	
Maladie des pochettes, maladie criblée	cuivre (10) dithianon (9)	■		■		■					
Moniliose des fleurs et maladie criblée	captane + ISS (7), ISS (7), azoxystrobine (5), trifloxystrobine (5)			■		■		■			
Moniliose des fruits	dicarboximides (3), cyprodinil + fludioxonil (4), benzimidazols (8), ISS (7), fenhexamide (6)									■	
Maladie criblée	captane, folpet, dithianon (9), soufre mouillable (11), ISS (7) dithiocarbamates (2)			■		■		■			
Rouille	trifloxystrobine (5), difénoconazol (7), dithianon (9) soufre mouillable (11)									■	

★★★★
LUTTE BIOLOGIQUE

Traitements préventifs recommandés

Traitements recommandés en cas de nécessité

Traitements possibles

LE GUIDE ARBO D'ACW

RAVAGEURS	REMARQUES ET LUTTE
<p>Carpocapse des prunes (<i>Cydia funebrana</i>)</p>  <p>Les fruits attaqués par les larves de la 1^{re} génération sont bleu-violet dans la zone du pédoncule et tombent prématurément. A la 2^e génération, un rejet gommeux apparaît souvent au point de pénétration. Les fruits attaqués mûrissent prématurément et deviennent mous.</p>	<p>Les dégâts de la 1^{re} génération du carpocapse des prunes sont généralement peu importants. Le suivi de la reprise du second vol au piège sexuel donne une bonne indication sur le moment optimal du traitement. En cas de doute, le contrôle visuel des pontes et des pénétrations permet aisément de prendre une décision. La lutte par confusion sexuelle est possible. Toutefois, l'efficacité n'est pas garantie dans les parcelles de moins de 3 ha, non isolées, entourées d'arbres ou d'arbustes même non-hôtes et lorsque la population initiale du ravageur est trop élevée.</p>
<p>Hyponomeute (<i>Hyponomeuta padellus</i>)</p>  <p>Les chenilles colonisent l'extrémité des rameaux où elles tissent leur nid et rongent les feuilles. Une forte attaque peut dépouiller totalement les rameaux.</p>	<p>Ce ravageur ne se multiplie généralement que dans les vergers non traités. La plupart des insecticides appliqués contre les noctuelles et arpeuteuses sont très efficaces contre les hyponomeutes.</p>
<p>Hoplocampe (<i>Hoplocampa flava</i> et <i>H. minuta</i>)</p>  <p>Trou de pénétration de la larve sur jeune pruneau. Les dégâts sont identiques à ceux de l'hoplocampe des pommes.</p>	<p>Si la charge en fruits est excessive, l'hoplocampe des prunes peut contribuer à l'éclaircissage. Une larve pouvant endommager de 3 à 5 fruits, un contrôle régulier est néanmoins nécessaire. La surveillance du vol est possible avec des pièges blancs Rebell. Le risque de dégâts est faible si, pendant le vol, on attrape moins de 80-100 hoplocampes. La lutte s'effectue immédiatement après la chute des pétales.</p>
<p>Pucerons divers</p>  <p>De fortes attaques du puceron vert du prunier provoquent souvent le dépérissement des extrémités des pousses.</p> <p>Le puceron farineux du prunier constitue d'importantes colonies à la face inférieure des feuilles après fleur et durant l'été. Sa présence ne provoque que peu de déformations, mais surtout des décolorations, la chute des feuilles et une forte production de miellat.</p>  <p>Le puceron vert du houblon s'observe également en été. Ces pucerons allongés, brillants et vert pâle forment des colonies lâches et produisent un abondant miellat, mais sans déformation des feuilles.</p>	<p>Du débourrement à la chute des pétales et surtout avant fleur, il faut surveiller le puceron vert du prunier. Une lutte spécifique pré- ou post-florale est préférable. Les propriétés systémiques de certains produits permettent d'atteindre les pucerons dans les feuilles enroulées après fleur et d'agir également contre l'hoplocampe. La lutte contre les autres pucerons du prunier s'effectue de la même façon.</p> <p>En été, le puceron farineux et le puceron du houblon (résistants au pirimicarbe) doivent être particulièrement surveillés. Dans les parcelles atteintes de sharka (voir p. 34), il est conseillé de traiter contre les pucerons en septembre afin de limiter l'expansion de cette dangereuse virose.</p>
<p>Acarions</p>  <p>Ponctuations jaunâtres sur la face supérieure d'une feuille dues aux ériophyides libres du prunier. Déformations du fruit après l'attaque précoce d'ériophyides à galles sur fleur et jeune fruit.</p>	<p>La lutte contre l'acarion rouge et l'acarion jaune est très rarement nécessaire, les typhlodromes maîtrisant généralement très bien ces deux ravageurs. La lutte contre les différentes espèces d'ériophyides libres du prunier est parfois justifiée. L'application de soufre mouillable (3-4 x) de la floraison à juin-juillet suffit généralement à limiter ces ravageurs. En cas de fortes infestations estivales, un acaricide efficace contre les ériophyides peut être appliqué. La lutte contre les ériophyides gallico-les se justifie dans les parcelles ayant présenté de graves attaques la saison précédente. Elle s'effectue au débourrement lors de la migration des acarions.</p>

 Guide de traitements PRUNIER		PÉRIODES										
		mars	avril		mai		juin	juillet		Baggiolini BBCH		
RAVAGEURS	MATIÈRES ACTIVES (les chiffres entre parenthèses renvoient à l'index phytosanitaire rose au centre du journal)	B 51	C 53	D 56	E 59	F 63	G 67	H 69	I 71	J 75		
		Débourr.		Préfloral		Floral		Postfloral		Été-fin saison		
Cheimatobies	BACILLUS THURINGIENSIS (33) diflubenzuron, téflubenzuron (37), thiocyclam (39), indoxacarbe (38)						★★					
+ pucerons + hypnometes	huiles diverses (50) diazinon, phosalone (42)								
Carpocapse des prunes	CONFUSION (31) fénoxycarbe (37) indoxacarbe (38) phosalone (42)						★★				
Hoplocampe	quassia (35), thiocyclam (39), acétamipride, thiaclopride (41) esters phosphoriques (42)										
Pucerons	pirimicarbe (40) thiaclopride, acétamipride (41)			=====			=====				
Cochenilles diaspines, pou de San José	huile minérale (50)	=====										
Cochenilles lécanines	huiles diverses (50)	=====										
Acarions	TYPHLODROMES	★★★★					★★★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★
Acarion rouge + acarion jaune	huile minérale (50) clofentézine (55) héxythiazox (55) clofentézine, héxythiazox (55) cyhexatin, METI (55)		=====				=====			
Eriophyides libres	soufre (56) huiles diverses (50) fenpyroximate (55)						=====			
Eriophyides gallico-	huiles diverses (50)	=====										

★★★★ LUTTE BIOLOGIQUE
 ===== Traitements recommandés en cas de nécessité
 ===== Traitements préventifs recommandés
 Traitements possibles