



Liste 2013-2014 des variétés recommandées de plantes fourragères

Rainer Frick¹, Mario Bertossa¹, Daniel Suter² et Hansueli Hirschi²

¹Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 1260 Nyon 1

²Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, 8046 Zurich

La «Liste des variétés recommandées de plantes fourragères» regroupe les variétés qui se sont montrées les meilleures dans le réseau d'essais des stations Agroscope. Elles ont été testées en culture pure et en association en divers lieux représentatifs des conditions de production en Suisse. Cette liste sert de base au choix des composants pour la constitution des mélanges standard.

I. Légumineuses

1. Luzerne (*Medicago sativa* L.)
2. Trèfle violet (*Trifolium pratense* L.)
3. Trèfle blanc (*Trifolium repens* L.)
4. Esparcette (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
5. Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L.)
6. Trèfle d'Alexandrie (*Trifolium alexandrinum* L.) et Trèfle de Perse (*Trifolium resupinatum* L.)

II. Graminées

1. Dactyle (*Dactylis glomerata* L.)
2. Fétuque des prés (*Festuca pratensis* Hudson)
3. Fétuque élevée (*Festuca arundinacea* Schreber)
4. Fétuque rouge (*Festuca rubra* L.)
5. Ray-grass Westerworld (*Lolium multiflorum* Lam. var. *westerworldicum* Mansh.)
6. Ray-grass hybride (*Lolium x hybridum* Hausskn.)
7. Ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* Beck)
8. Ray-grass anglais (*Lolium perenne* L.)
9. Pâturin des prés (*Poa pratensis* L.)
10. Fléole des prés (*Phleum pratense* L.)
11. Vulpin des prés (*Alopecurus pratensis* L.)
12. Bromes fourragers (*Bromus sitchensis* Trin., *Bromus stamineus* Desv. et *Bromus catharticus* Vahl)
13. Fromental (*Arrhenatherum elatius* L.)
14. Avoine jaunâtre (*Trisetum flavescens* L.)
15. Agrostides (*Agrostis gigantea* Roth, *Agrostis capillaris* L.)
16. Crételle des prés (*Cynosurus cristatus* L.)

III. Cultures dérobées

1. Avoine (*Avena sativa* L.) en fourrage vert
2. Seigle (*Secale cereale* L.) en fourrage vert
3. Crucifères (*Brassicaceae*) en fourrage vert

DESCRIPTION DES VARIÉTÉS

Les variétés recommandées sont décrites de la manière suivante:

- **Nom de la variété et représentant** (maison, pays)

2n = forme diploïde, 4n = forme tétraploïde

- **Année d'inscription sur la liste des variétés recommandées**

- **Indice de précocité**

L'indice de précocité représente la période à laquelle débute l'épiaison d'une graminée ou la floraison d'une légumineuse. Ce stade est caractérisé par l'apparition de 10 épis, ou fleurs, par mètre carré. Le premier chiffre indique le mois, le second la décade, et la lettre la partie de la décade (a = début, b = fin). L'indice de précocité est observé à Changins (altitude 430 m).

Exemples:

– Ray-grass anglais ARARA:
indice 43b = début épiaison du 26 au 30 avril

– Ray-grass anglais SORAYA:
indice 61a = début épiaison du 1er au 5 juin

- **Principales caractéristiques**

(voir l'échelle de notation dans le tableau 1)

- **Utilisation dans les mélanges standard**

Tableau 1 | Echelle de notation

Note	Vitesse d'installation Reprise au printemps	Force de concurrence Teneur en matière sèche	Souplesse des feuilles Grosseur des tiges	Rendement Digestibilité (DMO) Persistance	Résistance aux maladies, aux ravageurs, à la verse ou aux conditions défavorables du milieu
1	très rapide	très élevée	très fine	très bon	très résistante
2	rapide à très rapide	élevée à très élevée	fine à très fine	bon à très bon	résistante à très résistante
3	rapide	élevée	fine	bon	résistante
4	assez rapide	assez élevée	assez fine	assez bon	assez résistante
5	moyenne	moyenne	moyenne	moyen	moyenne
6	assez lente	assez faible	assez grossière	assez mauvais	assez sensible
7	lente	faible	grossière	mauvais	sensible
8	lente à très lente	faible à très faible	grossière à très grossière	mauvais à très mauvais	sensible à très sensible
9	très lente	très faible	très grossière	très mauvais	très sensible

«Seules les meilleures variétés donnent satisfaction!»

Ce principe est particulièrement valable pour les prairies temporaires. Cependant, les intérêts des producteurs de semences et de fourrages ne sont pas forcément convergents. Pour la production de semences, on préfère des plantes qui fournissent beaucoup de tiges fertiles contenant des graines facilement récoltables. Pour la production de fourrage, par contre, on favorise des plantes productives et persistantes avec beaucoup de feuilles. Celles-ci fournissent moins de semences et sont, pour cette raison, plus coûteuses. Au moment du choix d'un mélange «graminées-légumineuses», il peut être tentant de vouloir faire des économies. Mais cette intention ne peut amener que des pertes, même à court terme. Les frais supplémentaires liés à l'achat de semences de qualité sont compensés par des rendements plus élevés de trois à quatre décitonnes par hectare l'année du semis. Si, en plus, les mélanges bon marché se caractérisent par une mauvaise persistance, des grandes pertes sont possibles les années suivantes.

Les mélanges standard munis du label ADFC ne contiennent que des variétés figurant sur la «Liste des variétés recommandées de plantes fourragères». La composition du mélange et la pureté des semences sont contrôlées périodiquement par Agroscope.

I. Légumineuses

1. Luzerne (*Medicago sativa* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Rendement	Vitesse d'installation	Reprise au printemps	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Grosseur des tiges	Digestibilité (DMO)
							maladies foliaires	verticilliose		
Cannelle (R2n, FR)	2001	5,4	2,8	4,7	3,9	3,9	3,6	2,8	5,0	5,0
Capri (Desprez, FR)	1995	4,8	3,1	4,5	4,0	3,5	3,1	2,8	5,0	5,3
Fraver (Schmidt, FR)	2001	4,9	3,7	5,4	4,1	3,7	2,9	2,0	4,5	3,7
Robot** (CRA-FLC, IT)	1995	4,9	2,1	2,6	3,2	3,5	4,5	3,5	5,0	5,7
Sanditi (Barenbrug, NL)	1995	5,0	2,2	4,0	3,1	3,0	3,9	2,3	5,0	5,3
Timbale (GIE Grass, FR)	2007	4,6	2,7	4,3	4,0	3,4	3,8	2,8	4,5	4,7
Vanda (CVRV, VÚRV, SK)	2001	5,3	1,9	4,0	3,5	3,4	3,8	2,8	7,0	5,3

*Recommandée pour le Sud des Alpes.

**Variété à faible dormance hivernale qui ne convient pas aux zones avec risques de gel.

2. Trèfle violet (*Trifolium pratense* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à			
							sclérotiniose	tiges flétries	stemphyliose	taches de suie, oidium
A) Longue durée diploïde										
Dafila (DSP/ART, CH)	2008	53b	3,1	3,1	3,8	3,4	3,4	1,4	2,7	1,4
Formica* (DSP/ART, CH)	1993	53b	4,9	3,0	4,3	5,1	3,8	2,3	2,4	1,7
Lestris (DSP/ART, CH)	2009	53b	3,1	3,5	4,0	3,7	3,1	1,3	2,7	1,9
Merula (DSP/ART, CH)	2002	53b	4,1	3,2	4,2	3,8	3,1	1,7	2,2	1,8
Milvus (DSP/ART, CH)	1993	53b	3,8	3,2	4,1	4,1	3,2	1,8	2,8	2,2
Pastor** (DSP/ART, CH)	2010	53b	4,2	3,9	4,4	4,2	3,6	1,2	2,4	1,7
Pavo (DSP/ART, CH)	2002	53b	3,6	3,3	4,0	3,6	3,2	1,3	2,6	1,0
Corvus (DSP/ART, CH)	1998	61a	4,2	3,0	4,4	4,3	3,5	1,7	2,3	2,0
B) Longue durée tétraploïde										
Astur (DSP/ART, CH)	1998	53b	2,8	2,4	3,6	3,3	2,9	1,4	2,0	1,5
Elanus (DSP/ART, CH)	2008	53b	3,0	2,3	3,8	3,4	3,1	1,5	2,7	1,4
Fregata (DSP/ART, CH)	2008	53b	2,2	2,2	3,5	2,9	3,4	1,5	1,8	1,3
Larus (DSP/ART, CH)	1998	53b	3,0	2,2	4,1	3,6	3,1	1,4	2,2	1,8
Carbo (DSP/ART, CH)	2009	61a	2,5	2,3	3,6	2,7	3,0	1,2	1,9	1,2
C) Courte durée diploïde										
Global (Freudenberger, DE)	2008	61a	4,8	3,4	5,4	5,6	3,7	1,6	2,5	1,0
Monaco (DSP/ART, CH)	2011	61a	5,7	3,3	4,9	6,5	4,1	2,5	2,8	3,4
Slavoj (Agrogen, CZ)	2008	61b	5,9	3,6	5,0	6,5	4,2	2,1	3,5	3,3
Suez (Agrogen, CZ)	2002	61b	5,7	3,7	5,2	6,8	4,2	2,0	3,4	1,9
Diplomat (EURO GRASS, DE)	2008	62a	4,3	3,0	5,0	6,0	3,7	1,8	3,0	1,9
Merian (Carneau, FR)	2008	62a	5,9	4,3	4,6	6,4	3,8	1,8	2,9	1,9
D) Courte durée tétraploïde										
Tedi (Agri Obtentions, FR)	1998	53b	4,4	3,0	4,2	5,7	4,0	2,0	2,0	3,3
Maro (NPZ-Lembke, DE)	1998	62a	5,7	2,2	5,1	6,9	4,3	2,9	2,5	3,9
Sigord (CVRV, VÚRV, SK)	1980	62a	5,7	2,5	5,0	6,8	4,1	2,9	2,8	3,1
Taifun (SZ-Steinach, DE)	2008	62a	4,3	2,5	4,9	6,1	4,0	2,2	3,0	3,4
Titus (SZ-Steinach, DE)	1998	62a	5,3	2,4	4,7	6,9	4,0	3,0	2,9	4,6

*Variété à faible teneur en formononétine (substance dont l'action est œstrogène; en grandes quantités, elle peut provoquer des problèmes de fertilité chez les bovins et les ovins).

**Type de variété spécialement conçu pour la pâture.

3. Trèfle blanc (*Trifolium repens* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à	
						conditions hivernales	altitude
A) Variétés à feuilles petites à moyennes							
Hebe (Svalöf-Weibull, SE)	2000	5,9	3,5	5,8	4,8	3,7	6,7
Pepsi (DLF-Trifolium, DK)	2008	5,6	3,1	6,1	3,7	3,9	5,2
Rabbani (DLF-Trifolium, DK)	2008	5,4	3,1	5,9	4,0	4,5	5,5
Sonja (Svalöf-Weibull, SE)	1983	6,5	3,3	6,2	4,6	3,5	6,3
Tasman (Barenbrug, NL)	2006	4,6	3,3	6,1	3,3	3,4	5,2
Vysocan (Agrogen, CZ)	2000	5,0	3,3	5,7	4,8	4,4	6,2
B) Variétés à grosses feuilles							
Apis (DSP/ART, CH)	2000	4,0	4,3	6,0	3,3	3,6	6,2
Bombus (DSP/ART, CH)	2000	3,5	3,7	5,9	3,8	4,0	5,3
Fiona (DSP/ART, CH)	2008	3,4	3,3	6,3	3,7	3,3	4,7
Seminole (Cal West, US)	1995	4,5	2,8	5,9	4,4	4,0	5,1

4. Esparcette (*Onobrychis viciifolia* Scop.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à	
							conditions hivernales	maladies foliaires
Perdix (OV 0505) (DSP/ART)	2011	52a	5,2	2,8	5,0	6,2	5,3	2,3
Perly (DSP/ART, CH)	1992	52a	5,4	3,3	5,2	6,2	5,3	2,5
Višňovský (Agrogen, CZ)	1999	53a	4,7	2,3	3,7	5,5	6,4	4,2

5. Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à	
							conditions hivernales	maladies foliaires
Polom (CVRV, VÚRV, SK)	1999	53b	2,8	4,2	4,9	4,4	4,5	5,1
Lotar (OSEVA UNI, CZ)	1999	53b	3,4	2,3	5,2	4,7	4,4	5,1

6. Trèfles d'Alexandrie et de Perse (*Trifolium alexandrinum* L., *Trifolium resupinatum* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Rendement 1 ^{ère} coupe	Rendement total	Force de concurrence
A) Trèfle d'Alexandrie				
Elite II (Seedmark, AU)	2001	4,8	4,3	3,9
Miriam (Sumeran, IT)	1996	6,4	5,4	4,5
Sacromonte (CRA-FLC, IT)	1980	4,8	3,8	3,6
Tabor* (Agridera, IL)	1980	1,3	4,8	5,1
Tigri (Mediterranea, IT)	2001	5,4	4,6	4,7
Winner (Freudenberger, DE)	2001	4,4	4,0	5,1
B) Trèfle de Perse**				
Lightning (Seedmark, AU)	2001	2,9	3,1	5,4
Pasat (OSEVA UNI, CZ)	2008	4,3	3,0	5,6

*Tabor est une variété pour une seule coupe.

**Les trèfles de Perse sont plus sensibles à la maladie des taches de suie que les trèfles d'Alexandrie.

II. Graminées

1. Dactyle (*Dactylis glomerata* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Digestibilité (DMO)
							conditions hivernales	maladies foliaires	
A) Variétés précoces à mi-précoces									
Barexcel (Barenbrug, NL)	2003	52a	4,9	4,1	3,7	3,7	4,9	2,7	4,7
Loke (Svalöf-Weibull, SE)	1986	52a	4,4	4,3	3,9	4,1	5,8	3,4	4,7
Oberweihst (ZG, DE)	1976	52a	4,0	3,5	4,0	3,5	5,5	3,6	4,0
Padania (CRA-FLC, IT)	1997	52a	5,4	3,6	4,0	4,1	5,6	3,4	2,7
Reda (DSP/ART, CH)	1976	52a	3,8	5,0	4,1	3,7	5,2	2,9	5,7
B) Variétés mi-tardives à tardives									
Accord (R2n, FR)	1997	52b	5,0	4,4	4,2	3,4	5,6	2,0	5,3
Greenly (R2n, FR)	2003	52b	5,2	4,5	3,9	3,8	5,3	2,6	5,0
Lazuly (R2n, FR)	2008	52b	4,5	4,5	3,6	3,4	5,5	1,5	5,0
Prato (DSP/ART, CH)	1986	52b	5,1	4,8	3,9	3,7	5,7	3,1	6,0
Beluga (DSP/ART, CH)	2008	53a	4,3	4,0	3,9	3,8	5,1	2,3	4,7
Brennus (R2n, FR)	2008	53a	4,5	4,8	3,9	3,7	5,1	1,9	5,3
Foly (R2n, FR)	2003	53a	5,5	4,5	4,0	3,7	5,5	2,3	5,7
Intensiv (Barenbrug, NL)	2008	53a	4,4	4,2	3,7	4,0	4,6	3,3	5,3

2. Fétuque des prés (*Festuca pratensis* Hudson)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à			Digestibilité (DMO)
							conditions hivernales	maladies foliaires	altitude	
Cosmolit (SZ-Steinach, DE)	1998	52a	5,3	3,1	4,6	3,3	4,6	3,2	3,7	4,7
Paradisia (DSP/ART, CH)	2007	52b	4,7	3,2	3,5	3,3	5,1	2,9	3,8	5,3
Pradel (DSP/ART, CH)	1998	52b	4,4	3,7	4,1	3,5	4,8	3,3	4,2	5,7
Praniza (DSP/ART, CH)	2011	53a	3,9	2,7	3,1	3,2	4,6	2,7	4,2	5,0
Pardus (DSP/ART, CH)	2004	53a	4,8	3,2	3,9	2,9	5,2	3,1	4,4	5,0
Préval (DSP/ART, CH)	1993	53a	4,1	2,4	3,6	2,8	4,9	3,0	3,4	5,7

3. Fétuque élevée (*Festuca arundinacea* Schreber)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Souplesse des feuilles	Digestibilité (DMO)
							conditions hivernales	maladies foliaires		
Dulcia (R2n, FR)	2003	52b	4,2	4,2	4,3	3,1	4,3	2,3	4,1	5,3
Barolex (Barenbrug, NL)	2003	53a	5,4	4,7	4,5	3,2	4,5	3,1	4,7	4,7
Belfine (DSP/ART, CH)	2003	53a	4,8	5,1	4,3	3,3	4,7	3,7	4,1	5,0
Callina (R2n, FR)	2009	53a	4,1	4,1	4,4	2,8	4,2	2,0	4,1	5,0
Dauphine (DSP/ART, CH)	2009	53a	5,0	4,3	4,3	3,0	4,4	3,3	3,8	5,3
Elodie (Jouffray-Drillaud, FR)	2009	53a	4,5	3,9	4,4	3,4	4,1	2,3	5,8	4,3
Molva (DSP/ART, CH)	2003	53a	5,1	4,1	4,1	3,0	4,1	3,8	4,7	5,3
Otaria (DSP/ART, CH)	2009	53b	5,6	3,7	4,3	2,8	4,5	3,1	3,1	5,7

4. Fétuque rouge (*Festuca rubra* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		
							conditions hivernales	maladies foliaires	altitude
Tagera (Tagro, CZ)	1999	51a	5,4	4,3	3,5	4,5	5,5	2,2	4,3
Echo (DLF-Trifolium, DK)	1981	51b	3,8	3,6	4,3	3,6	4,7	2,4	4,5
Reverent (Freudenberger, DE)	1994	51b	4,6	4,6	3,5	3,1	5,6	2,4	4,7
Roland 21 (SZ-Steinach, DE)	1981	51b	5,0	4,1	3,9	4,2	4,4	2,4	3,5
Bargaret (Barenbrug, NL)	1999	52a	4,3	4,6	4,2	4,1	5,1	2,9	4,5
Pran Solas* (Schweizer, CH)	1999	52a	5,7	3,6	3,8	4,5	5,4	2,4	4,1

*Variété locale, admise uniquement pour l'utilisation en Suisse à des fins spécifiques.

5. Ray-grass Westerwold (*Lolium multiflorum* Lam. var. *westerwoldicum* Mansh.)

Variété (représentant)	Ploïdie	Inscrite depuis	Rendement 1 ^{ère} coupe	Rendement total	Force de concurrence	Résistance aux maladies foliaires	Teneur en matière sèche	Digestibilité (DMO)
Bartigra (Barenbrug, NL)	4n	2008	4,0	4,0	3,9	3,5	6,8	5,0
Cannibale (Carneau, FR)	4n	2008	3,5	4,0	4,2	4,0	6,9	5,0
Ceronte (Mediterranea, IT)	2n	2008	3,9	3,8	4,2	3,3	6,4	5,0
Imperio (EURO GRASS, DE)	2n	2008	3,3	3,5	4,0	3,2	3,0	6,0
Jivet (Životice, CZ)	4n	1994	4,2	4,3	4,0	3,5	7,2	5,0
Jumper (DLF-Trifolium, DK)	4n	2008	4,8	4,2	4,5	2,5	5,0	4,0
Melmondo (Freudenberger, DE)	4n	2008	4,2	4,0	4,2	3,7	5,0	4,0
Peleton (DLF-Trifolium, DK)	4n	2001	4,9	4,2	4,3	3,7	5,9	4,0
Primora (DLF-Trifolium, DK)	4n	1988	4,0	4,0	4,0	4,0	6,9	5,0
Speedyl (R2n, FR)	4n	2001	3,8	3,7	4,1	3,5	6,3	4,0

6. Ray-grass hybride (*Lolium x hybridum* Hausskn.)

Variété (représentant)	Ploidie	Inscrite depuis	Indice de précocité	Type*	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à			Digestibilité (DMO)
									conditions hivernales	maladies foliaires	flétrissement bactérien	
Ocadia (DSP/ART, CH)	4n	2010	52a	I/A	3,5	3,9	4,7	4,7	5,4	3,1	1,5	5,0
Palmeta (DSP/ART, CH)	4n	2010	52a	A	3,8	3,4	4,6	4,3	5,0	2,8	1,4	7,0
Sorex (DSP/ART, CH)	4n	2010	52a	A	4,0	4,0	5,0	4,4	4,9	3,3	1,5	4,7
Daboya (DSP/ART, CH)	4n	2010	52b	I/A	2,1	3,8	5,3	5,1	4,9	3,0	2,1	4,7
Dorcas (DSP/ART, CH)	4n	1995	52b	I/A	4,8	3,6	4,3	5,1	4,9	3,0	2,3	4,7
Enduro (R2n, FR)	4n	2005	52b	A	4,4	4,7	4,8	5,1	5,6	3,2	1,8	3,3
Leonis (DSP/ART, CH)	4n	2005	52b	I/A	2,8	4,2	4,7	5,0	4,7	2,8	2,2	6,0
Marmota (DSP/ART, CH)	4n	2005	52b	A	3,9	4,3	4,7	4,7	5,1	3,3	1,6	5,3
Rusa (DSP/ART, CH)	4n	2000	52b	I/A	3,4	4,4	5,3	5,0	5,3	3,5	2,1	6,3
Antilope (DSP/ART, CH)	4n	1995	53a	I/A	4,8	3,7	4,4	5,5	4,7	3,3	2,2	5,3
Ibex (DSP/ART, CH)	4n	2000	53a	I	3,8	3,4	4,4	5,5	4,9	3,4	2,4	7,3
Redunca (DSP/ART, CH)	4n	1995	53a	I	4,5	3,4	4,7	5,3	4,4	3,3	2,3	5,3
Tirna (DLF-Trifolium, DK)	4n	2000	53b	I/A	5,5	3,7	4,8	5,0	5,2	3,4	2,8	3,7

*Type de croissance: I = type ray-grass d'Italie; A = type ray-grass anglais; I/A = type intermédiaire.

7. Ray-grass d'Italie (*Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* Beck)

Variété (représentant)	Ploidie	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à			Digestibilité (DMO)
								conditions hivernales	maladies foliaires	flétrissement bactérien	
Alces (DSP/ART, CH)	4n	2000	52b	5,3	3,2	4,5	5,0	4,9	3,0	1,7	5,0
Axis (DSP/ART, CH)	2n	1990	52b	5,3	2,9	4,5	4,3	4,4	3,6	1,8	5,0
Morunga (DSP/ART, CH)	4n	2010	52b	3,1	2,9	4,0	3,5	3,9	2,5	1,6	5,0
Zebra (DSP/ART, CH)	4n	2010	52b	3,5	3,1	4,2	4,3	4,0	2,8	1,5	5,3
Caribu (DSP/ART, CH)	2n	2005	53a	3,6	2,9	3,4	4,1	4,5	3,6	2,5	5,3
Ellire (DSP/ART, CH)	4n	1985	53a	5,0	2,7	5,1	4,6	4,6	3,1	2,0	5,0
Elvis (DLF-Trifolium, DK)	4n	2010	53a	3,5	3,2	4,7	4,3	4,1	2,5	2,2	4,3
Gemini (ILVO, BE)	4n	2000	53a	4,4	2,8	5,5	4,7	4,4	3,5	1,5	5,3
Oryx (DSP/ART, CH)	2n	2000	53a	4,0	2,8	4,7	4,2	4,0	3,4	2,0	5,0
Rangifer (DSP/ART, CH)	2n	2000	53a	4,5	2,7	5,6	4,1	4,5	3,3	1,9	6,3
Tigris (DSP/ART, CH)	2n	2005	53a	3,9	2,5	4,2	4,3	3,9	3,4	1,8	6,0
Zebu (DSP/ART, CH)	4n	2000	53a	4,6	2,8	4,7	4,8	4,6	3,2	1,9	5,3
Midas (DSP/ART, CH)	4n	2010	53a	3,1	3,3	4,7	4,2	4,6	2,8	1,7	5,7

8. Ray-grass anglais (*Lolium perenne* L.)

Variété (représentant)	Ploidie	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à				Digestibilité (DMO)
								conditions hivernales	rouille	flétrissement bactérien	altitude	
A) Variétés précoces												
Arara (DSP/ART, CH)	2n	2007	43b	5,2	3,1	3,1	3,5	5,2	4,1	–	3,3	4,7
Arolus (DSP/ART, CH)	2n	2007	51a	5,0	3,3	3,0	3,4	5,0	4,1	–	4,0	6,0
Artesia (DSP/ART, CH)	4n	2006	51a	4,5	2,1	3,2	2,5	4,3	2,5	–	2,7	3,3
Arvicola (DSP/ART, CH)	4n	1996	51a	4,3	2,2	3,3	3,0	4,7	2,9	–	2,9	3,3
Salamandra (DSP/ART, CH)	4n	2001	52a	4,0	2,1	3,5	2,8	4,1	2,6	–	2,7	2,0
Lacerta (DSP/ART, CH)	4n	1996	52b	4,7	2,1	3,2	3,3	4,8	2,8	–	3,3	2,7
B) Variétés tardives												
AberDart (IBERS, UK)	2n	2006	53b	5,1	3,3	3,4	4,3	5,4	3,9	1,5	4,3	5,3
Alligator (DSP/ART, CH)	4n	2001	53b	3,6	2,7	4,4	3,4	5,1	3,6	1,3	3,8	4,0
Calibra (DLF-Trifolium, DK)	4n	2001	53b	5,5	2,4	4,5	3,7	5,1	3,4	1,9	3,7	4,0
Dexter 1 (Innoseeds, NL)	4n	2012	53b	3,8	3,0	4,0	3,2	4,8	3,2	2,0	4,1	4,3
Mercedes (SZ-Steinach, DE)	4n	2012	61a	4,3	2,3	3,8	2,5	5,2	2,7	2,0	3,9	4,3
Soraya (LP 0355) (DSP/ART, CH)	4n	2012	61a	4,5	2,3	3,7	3,0	4,8	2,4	1,6	3,2	5,0
Trivos (Euro Grass, DE)	4n	2012	61a	3,8	2,8	4,5	2,9	5,3	2,6	1,6	3,9	4,7
Vercade* (Carneau, FR)	4n	2009	61a	5,4	2,9	4,0	3,7	5,3	3,0	1,8	3,9	4,5
Barnauta (Barenbrug, NL)	4n	2006	61b	5,2	2,9	4,1	3,0	5,2	3,4	2,3	4,1	4,0
Elgon (DLF-Trifolium, DK)	4n	1996	62a	5,0	3,1	4,3	3,3	5,0	3,3	1,8	4,2	5,0

* Données évaluées et extrapolées dans d'autres séries d'essai.

Les variétés suivantes peuvent être commercialisées comme variétés recommandées jusqu'au 31.12.2014:

A) Variétés précoces: Arvella, 2n; Cavia, 2n; Lipresso, 2n

B) Variétés tardives: Premium, 2n

9. Pâturin des prés (*Poa pratensis* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Force de concurrence	Persistance	Vitesse d'installation	Résistance à			Digestibilité (DMO)
							conditions hivernales	rouille	altitude	
Likollo (Euro Grass, DE)	2007	51b	1,9	4,9	2,0	5,3	4,1	3,3	3,9	5,0
Nixe (SZ-Steinach, DE)	2007	51b	1,8	4,9	2,6	5,4	4,3	3,7	3,1	4,7
Lato (SZ-Steinach, DE)	1996	52a	1,4	4,4	2,9	4,2	4,2	4,7	3,6	4,0
Tommy (DLF-Trifolium, DK)	1990	52a	1,6	5,1	3,0	5,1	4,6	3,7	3,7	5,3

10. Fléole des prés (*Phleum pratense* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Digestibilité (DMO)
							maladies foliaires	altitude	
Tiller (DLF Trifolium, DK)	1987	53a	4,6	3,5	4,3	3,8	3,1	3,2	6,3
Odenwälder (ZG, DE)	1970	53b	4,5	2,9	4,3	3,1	3,1	2,8	5,7
Rasant (ZG, DE)	1983	53b	4,9	3,4	4,3	3,1	2,9	3,0	6,0
Toro (CRA-FLC, IT)	1987	53b	3,9	3,4	4,4	3,2	3,1	3,1	5,3
Phlewiola (ZG, DE)	1976	61b	4,6	3,9	4,5	3,6	2,9	3,2	4,3
Anjo (ILVO, BE)	2004	62a	4,2	4,4	4,9	3,5	2,6	4,4	5,0
Comer (ILVO, BE)	1999	62a	4,7	4,3	4,4	3,3	2,9	3,7	5,0
Moverdi (DLF-Trifolium, DK)	2004	62a	4,8	4,2	4,6	3,2	3,1	4,0	5,3

11. Vulpin des prés (*Alopecurus pratensis* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Digestibilité (DMO)
							maladies foliaires	altitude	
Alko (SZ-Steinach, DE)	1988	42b	4,6	3,8	3,2	3,1	3,1	3,4	4,7
Aloplex (DSP/ART, CH)	2003	42b	4,9	3,6	2,7	2,5	2,8	3,3	4,3

La variété suivante peut être commercialisée comme variété recommandée jusqu'au 31.12.2015: Vulpera.

12. Bromes fourragers (*Bromus* spp.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à		Digestibilité (DMO)
							maladies foliaires	conditions hivernales	
A) Brome sitchensis (<i>Bromus sitchensis</i> Trin.)									
Tacit* (Freudenberger, DE)	2007	53b	5,5	2,6	5,0	4,5	2,5	5,3	3,3
Hakari (R2n, FR)	1996	61a	6,4	2,7	5,4	4,5	2,6	4,6	2,3
B) Brome stamineus (<i>Bromus stamineus</i> Desv.)									
Gala (Ag Research, NZ)	1996	52a	7,5	3,0	6,6	3,4	3,7	6,3	7,0
Bareno (Barenbrug, NL)	2007	53b	4,0	3,8	6,4	3,0	4,5	6,7	6,3
C) Brome cathartique (<i>Bromus catharticus</i> Vahl)									
Rosabel (R2n, FR)	2007	52b	3,5	2,9	3,9	3,2	3,1	6,3	5,7

**B. marginatus* Nees ex Steud.

13. Fromental (*Arrhenatherum elatius* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Résistance à		Digestibilité (DMO)
						conditions hivernales	maladies foliaires	
Arone* (SZ-Steinach, DE)	2005	52b	5,4	2,8	5,4	5,3	3,2	4,9
Median* (Životice, CZ)	1999	52b	4,3	3,2	5,0	4,9	3,8	6,4

*Arone et Median ont une majorité d'épillets sans barbe.

14. Avoine jaunâtre (*Trisetum flavescens* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Résistance à			Digestibilité (DMO)
						conditions hivernales	maladies foliaires	altitude	
Gunther (HBLFA, AT)	2005	52b	4,3	4,1	6,2	4,8	3,4	4,0	5,7
Triset 51 (SZ-Steinach, DE)	1992	53a	4,9	3,5	7,1	5,5	3,3	5,3	4,7

15. Agrostides (*Agrostis* spp.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Résistance à		
						conditions hivernales	maladies foliaires	altitude
A) Agrostide blanche (<i>Agrostis gigantea</i> Roth)								
Janek (Agrogen, CZ)	2006	61a	4,1	4,2	6,4	3,4	4,3	5,2
Kita (HR Szelejewo, PL)	1992	61b	4,5	4,9	7,1	3,4	5,1	4,9
Rožnovský (OSEVA PRO, CZ)	1999	61b	4,3	3,6	6,4	2,7	4,6	5,0
B) Agrostide capillaire (<i>Agrostis capillaris</i> L.)								
Gudrun (HBLFA, AT)	2006	53b	7,5	5,9	7,3	4,4	2,7	3,4

16. Crételle des prés (*Cynosurus cristatus* L.)

Variété (représentant)	Inscrite depuis	Indice de précocité	Rendement	Vitesse d'installation	Force de concurrence	Persistance	Résistance à			Digestibilité (DMO)
							conditions hivernales	maladies foliaires	altitude	
Cresta (DSP/ART, CH)	2004	53a	6,3	5,4	5,6	5,3	4,9	4,3	3,7	4,3
Rožnovská (Tagro, CZ)	2004	53a	1,8	5,4	5,1	4,3	4,5	5,0	4,0	3,3
Lena (HBLFA, AT)	2009	53b	4,5	4,7	5,5	4,1	4,2	5,7	3,0	3,8

III. Cultures dérobées

Une culture dérobée a pour fonction de prolonger la période d'affouragement en vert en automne, ou de la faire débiter plus tôt au printemps, et de couvrir le sol entre deux cultures principales. Elle constitue une mesure de protection des sols contre l'érosion et de piégeage pour les nitrates. Afin de valoriser au mieux le fourrage produit par les cultures dérobées, il est important de planifier les semis de manière à pouvoir échelonner les récoltes.

1. Avoine (*Avena sativa* L.) en fourrage vert

Variété (représentant/origine)	Inscrite depuis	Rendement	Force de concurrence	Résistance à la rouille
Expander (DSP, CH / Edelhofer, AT)	1997	5,3	4,3	4,9
President (DSP, CH / Linz, AT)	2004	5,7	4,7	3,7
Triton (DSP, CH / Nordsaat, DE)	2008	4,7	3,6	4,2

2. Seigle (*Secale cereale* L.) en fourrage vert

Variété (représentant/origine)	Inscrite depuis	Vitesse d'installation	Rendement au printemps	Force de concurrence	Qualité du fourrage
Protector (Petersen, DE)	1994	3,0	2,0	2,9	5,0
Wiandi (KWS-Lochow, DE)	1998	4,0	3,0	2,8	5,0

3. Crucifères (*Brassicaceae*) en fourrage vert

Variété (représentant/origine)	Inscrite depuis	Vitesse d'installation	Rendement	Teneur en matière sèche
A) Colza fourrager (<i>Brassica napus</i> L.)				
Mikonos (Euro Grass, DE)	2012	4,3	5,0	4,4
Parapluie (Jouffray-Drillaud, FR)	2012	3,5	4,8	6,0
B) Navette d'hiver et Chou de Chine (<i>Brassica rapa</i> L.)				
Buko (KWS, DE)	1985	3,3	2,7	6,6
Chicon (Jouffray-Drillaud, FR)	2012	2,9	4,2	3,2

Les crucifères contiennent des glucosinolates qui, en grandes quantités dans la ration, peuvent provoquer des troubles de l'appétit et du métabolisme chez les animaux.

Utilisation des espèces dans les mélanges standard

Ce tableau indique dans quels mélanges standard sont utilisées les espèces pour lesquelles des variétés sont recommandées. Pour plus de précisions, se référer au document «Mélanges standard pour la production fourragère. Révision 2013–2016» (*Recherche Agronomique Suisse* 3 [10], 1–12, 2012).

Espèce	N° du mélange standard																																	
	101	102	106	108	151	155	200	210	230	240	300	301	310	320	323	325	330	340	430	420	440	431	442	444	460	462	480	481	485	450	451	455		
Luzerne						x								x	x	x																		
Trèfle violet							x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x										
Trèfle blanc									x	x			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
Lotier corniculé																														x		x	x	x
Trèfle d'Alexandrie			x	x			x																											
Trèfle de Perse			x	x																														
Dactyle								x		x	x	x	x	x	x	x	x			x			x								x	x		
Fétuque des prés											x	x	x		x		x	x					x		x				x		x	x	x	
Fétuque élevée																x								x			x				x			
Fétuque rouge																			x	x		x	x	x				x	x	x	x	x	x	
Ray-grass Westerwold		x	x	x	x	x		x														x	x	x										
Ray-grass hybride									x	x			x	x								x												
Ray-grass d'Italie				x	x	x	x	x	x																									
Ray-grass anglais									x			x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Pâturin des prés									x										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Fléole des prés										x		x	x	x			x	x	x			x	x	x		x	x	x						
Vulpin des prés																								x	x									
Fromental												x																				x		
Avoine jaunâtre																								x								x	x	x
Agrostide blanche																												x	x	x				
Agrostide capillaire																																		x
Crételle des prés																												x	x	x				x
Avoine en fourrage vert	x																																	

Références bibliographiques

I. Légumineuses

1. Luzerne

Mitt. Schweiz. Landw. 25, 1, 2–10, 1977
Mitt. Schweiz. Landw. 30, 5, 109–117, 1982
Revue suisse Agric. 18, 4, 205–209, 1986
Revue suisse Agric. 21, 5, 245–247, 1989
Revue suisse Agric. 27, 2, 107–110, 1995
Revue suisse Agric. 33, 4, 153–155, 2001
Revue suisse Agric. 39, 4, 189–192, 2007

2. Trèfle violet

Mitt. Schweiz. Landw. 18, 9, 160–166, 1970
Mitt. Schweiz. Landw. 21, 2, 25–34, 1973
Mitt. Schweiz. Landw. 27, 8, 145–151, 1979
Revue suisse Agric. 17, 4, 207–208, 1985
Revue suisse Agric. 20, 3, 149–151, 1988
Revue suisse Agric. 25, 3, 139–143, 1993
Agrarforschung 5, 4, 177–180, 1998
Revue suisse Agric. 34, 3, 55–58, 2002
Revue suisse Agric. 40, 3, 245–248, 2008

3. Trèfle blanc

Mitt. Schweiz. Landw. 25, 5, 103–110, 1977
Mitt. Schweiz. Landw. 28, 6, 130–133, 1980
Mitt. Schweiz. Landw. 32, 5, 96–101, 1984
Mitt. Schweiz. Landw. 35, 8, 203–208, 1987
Landw. Schweiz 3, 10, 559–565, 1990
Agrarforschung 2, 4, 133–135, 1995
Revue suisse Agric. 32, 3, 109–112, 2000
Agrarforschung 13, 6, 228–233, 2006

4. Esparsette

Revue suisse Agric. 24, 3, 159–163, 1992
Revue suisse Agric. 31, 2, 95–98, 1999
Agrarforschung Schweiz 2, 9, 396–401, 2011

5. Lotier corniculé

Revue suisse Agric. 24, 3, 159–163, 1992
Revue suisse Agric. 31, 2, 95–98, 1999
Agrarforschung Schweiz 2, 9, 396–401, 2011

6. Trèfle d'Alexandrie et de Perse

Revue suisse Agric. 12, 6, 235–239, 1980
Revue suisse Agric. 22, 6, 333–337, 1990
Agrarforschung 15, 9, 434–439, 2008

II. Graminées

1. Dactyle

Mitt. Schweiz. Landw. 17, 10, 174–179, 1969
Mitt. Schweiz. Landw. 23, 4, 57–68, 1975
Mitt. Schweiz. Landw. 27, 5, 97–108, 1979
Revue suisse Agric. 17, 4, 227–230, 1985
Revue suisse Agric. 18, 9, 181–189, 1986
Landw. Schweiz 4, 4, 183–188, 1991
Agrarforschung 4, 6, 251–254, 1997
Agrarforschung 10, 6, 226–230, 2003
Agrarforschung 15, 7, 326–331, 2008

2. Fétuque des prés

Mitt. Schweiz. Landw. 36, 5, 146–156, 1988
Landw. Schweiz. 6, 3, 177–181, 1993
Agrarforschung 5, 4, 177–180, 1998
Agrarforschung 11, 7, 274–279, 2004
Agrarforschung Schweiz 2, 6, 258–263, 2011

3. Fétuque élevée

Revue suisse Agric. 13, 6, 285–290, 1981
Mitt. Schweiz. Landw. 34, 9, 181–189, 1986
Landw. Schweiz. 4, 4, 183–188, 1991
Agrarforschung 4, 6, 251–254, 1997
Agrarforschung 10, 7, 270–275, 2003
Agrarforschung 16, 7, 250–255, 2009

4. Fétuque rouge

Revue suisse Agric. 15, 6, 299–304, 1983
Mitt. Schweiz. Landw. 36, 5, 146–156, 1988
Revue suisse Agric. 26, 3, 145–149, 1994
Agrarforschung 6, 2, 63–66, 1999
Agrarforschung 11, 7, 274–279, 2004
Agrarforschung Schweiz 2, 7–8, 320–327, 2011

5. Ray-grass Westerwold

Revue suisse Agric. 16, 4, 207–208, 1984
Revue suisse Agric. 21, 2, 85–88, 1989
Revue suisse Agric. 26, 2, 101–103, 1994
Agrarforschung 15, 9, 434–439, 2008

6. Ray-grass hybride

Mitt. Schweiz. Landw. 29, 9, 216–224, 1981
Revue suisse Agric. 20, 1, 35–38, 1988
Landw. Schweiz 3, 6, 279–285, 1990
Agrarforschung 2, 3, 104–107, 1995
Agrarforschung 7, 3, 124–129, 2000
Agrarforschung 12, 6, 242–247, 2005
Agrarforschung Schweiz 1, 9, 334–339, 2010

7. Ray-grass d'Italie

Mitt. Schweiz. Landw. 29, 9, 216–224, 1981
Mitt. Schweiz. Landw. 33, 7, 161–171, 1985
Landw. Schweiz 3, 6, 279–285, 1990
Agrarforschung 2, 3, 104–107, 1995
Agrarforschung 7, 3, 124–129, 2000
Agrarforschung 12, 6, 242–247, 2005
Agrarforschung Schweiz 1, 7/8, 280–285, 2010

8. Ray-grass anglais

Mitt. Schweiz. Landw. 27, 5, 97–108, 1979
Mitt. Schweiz. Landw. 31, 3, 73–81, 1983
Landw. Schweiz 4, 5, 241–245, 1991
Agrarforschung 3, 4, 153–156, 1996
Agrarforschung 8, 3, 130–135, 2001
Agrarforschung 13, 7, 272–277, 2006
Agrarforschung Schweiz 3, 9, 414–421, 2012

9. Pâturin des prés

Mitt. Schweiz. Landw. 29, 10, 235–243, 1981
Mitt. Schweiz. Landw. 27, 7, 161–171, 1985
Landw. Schweiz 3, 6, 279–285, 1990
Revue suisse Agric. 28, 2, 77–80, 1996
Agrarforschung 9, 9, 376–379, 2002
Agrarforschung 14, 6, 248–253, 2007

10. Fléole des prés

Mitt. Schweiz. Landw. 18, 10, 173–179, 1970
Mitt. Schweiz. Landw. 25, 1, 11–20, 1977
Revue suisse Agric. 17, 4, 200–201, 1988
Revue suisse Agric. 20, 11, 41–42, 1988
Revue suisse Agric. 26, 3, 145–149, 1994
Agrarforschung 6, 2, 63–66, 1999
Agrarforschung 11, 8, 342–347, 2004
Agrarforschung 16, 7, 250–255, 2009

11. Vulpin des prés

Mitt. Schweiz. Landw. 36, 5, 146–156, 1988
Revue suisse Agric. 28, 2, 77–80, 1996
Agrarforschung 10, 7, 270–275, 2003
Agrarforschung Schweiz 1, 9, 334–339, 2010

12. Bromes fourragers

Revue suisse Agric. 28, 1, 23–26, 1996
Revue suisse Agric. 39, 4, 189–192, 2007

13. Fromental

Revue suisse Agric. 24, 3, 159–163, 1992
Revue suisse Agric. 31, 2, 95–98, 1999
Agrarforschung 12, 7, 300–305, 2005

14. Avoine jaunâtre

Revue suisse Agric. 24, 3, 159–163, 1992
Revue suisse Agric. 31, 2, 95–98, 1999
Agrarforschung 12, 7, 300–305, 2005

15. Agrostides

Revue suisse Agric. 24, 3, 159–163, 1992
Revue suisse Agric. 31, 2, 95–98, 1999
Agrarforschung 13, 6, 228–233, 2006

16. Crételle des prés

Agrarforschung 11, 8, 342–347, 2004
Agrarforschung Schweiz 2, 7–8, 320–327, 2011