



Herbizideinsatz bei Korbblütlern 2014

Autoren

Martina Keller



Liste der bei Salaten (Asteraceen), Chicorée und Schwarzwurzeln bewilligten Herbizide 2014

Rechtlich verbindlich für einen korrekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind ausschliesslich die Originaldokumente der Zulassung (verfügbar bei den Firmen und beim BLW)!

Boden- und Boden/Blattherbizide (Nachbaueinschränkungen sind eingehend zu beachten!)

Kultur								Wartefrist	Handelspräparate (Firma)	Wirkstoffe	Aufwandmenge (pro Are) Anwendungshinweise
Salate gesät	Salate gepflanzt	Baby-Leaf (Asteraceen)	Chicorée	Schwarzwurzel	Topinambur	Kardy	Artischocke				
			VA/NA					*	Kaskadora (Omya)	Carbetamid	35 – 50 g (entspricht der total zugelassenen Aufwandmenge) direkt nach der Saat bis spätestens im 4- bis 6-Blattstadium der Kultur. Split-Behandlung in Kombination mit anderen im Chicoréeanbau bewilligten Herbiziden. Schwache Blattwirkung.
				VA				*	Lenacil (Schneider), Venzar (Bayer, Du Pont)	Lenacil	25 – 50 g direkt nach der Saat. Niedrige Aufwandmengen gelten für mittelschwere Böden, hohe für humusreiche Böden und Moorböden. Keine Anwendung auf sandigen, humusarmen Böden! Vorsicht ist auch auf sauren Böden geboten!
	VP			VA		VP	VP	*	Stomp 400 SC (Leu+Gygax), Hysan (Omya), Stomp Aqua (Syngenta)	Pendimethalin	Salate gepflanzt: 25 - 40 ml (Stomp Aqua 22 – 35 ml) vor der Pflanzung. Bei Pflanzung von Hand oder mit Maschinen, die nach dem Einstichprinzip arbeiten (Nockenpflanzmaschinen) oberflächliche Einarbeitung erforderlich. Kein Einsatz in Säkulturen oder Frühlulturen unter Flachabdeckung. Schwarzwurzeln: 20 - 40 ml (Stomp Aqua 17.5 – 35 ml) direkt nach der Saat, auf sauberen Boden. Kardy, Artischocke: 25 – 40 ml (Stomp Aqua 22 – 35 ml) vor der Pflanzung. Keine Anwendung auf Sandböden. Die niedrigen Aufwandmengen gelten für leichte Böden.
	VP			VA				*	Stomp SC (Syngenta)	Pendimethalin	Salate gepflanzt: 25 - 40 ml vor der Pflanzung. Bei Pflanzung von Hand oder mit Maschinen, die nach dem Einstichprinzip arbeiten (Nockenpflanzmaschinen) oberflächliche Einarbeitung erforderlich. Kein Einsatz in Säkulturen oder Frühlulturen unter Flachabdeckung. Schwarzwurzeln: 20 - 40 ml direkt nach der Saat, auf sauberen Boden. Keine Anwendung auf Sandböden. Die niedrigen Aufwandmengen gelten für leichte Böden.

Legende: VA: Vorauflauf
NA: Nachauflauf
VP: vor Pflanzung
NP nach Pflanzung
* Wartefrist durch die Anwendungsbestimmungen definiert.

Kultur							Wartefrist	Handelspräparate (Firma)	Wirkstoffe	Aufwandmenge (pro Are) Anwendungshinweise	
Salate gesät	Salate gepflanzt	Baby-Leaf (Asteraceen)	Chicorée	Schwarzwurzel	Topinambur	Kardy					Artischocke
			NA					*	Bolero (Leu + Gyax)	Imazamox	Einsatz ab 2-Blatt Stadium bis zum 4-Blatt-Stadium der Kultur. Maximale Gesamtaufwandmenge: 10 ml. Beim Einsatz im 2-Blattstadium Aufwandmenge reduzieren! Gefahr von vorübergehenden Wachstumshemmungen im Anschluss an die Herbizidbehandlung.
				VA				*	Pendimed (Médol), Pendimethalin Realchemie (Agro Seller), Pendimethalin SA 400 SC (Sintagro) Pendimethalin 400 SC (Schneider), Sitradol SC (Stähler), Terapur (Burri)	Pendimethalin	Schwarzwurzel: 20 - 40 ml direkt nach der Saat, auf sauberen Boden. Die niedrigen Aufwandmengen gelten für leichte Böden. Keine Behandlung auf Sandböden!
VA	NP		VA					*	Kerb Flo (Omya), Propyzamide 400 (Sintagro)	Propyzamid	25 – 37.5 ml direkt nach der Saat oder Pflanzung. Anwendung nur im Freiland. Keine Wirkung auf Klebern und Korbblütler wie Franzosenkraut, Kamille, Kreuzkraut. Bei Trockenheit Kultur nach der Behandlung beregnen.
VA	NP							*	Proper Flo (Schneider), Granat (Leu + Gyax)	Propyzamid	25 – 37.5 ml direkt nach der Saat oder Pflanzung. Anwendung nur im Freiland. Keine Wirkung auf Klebern und Korbblütler wie Franzosenkraut, Kamille, Kreuzkraut. Bei Trockenheit Kultur nach der Behandlung beregnen.
			NA					*	Dual Gold (Syngenta)	S-Metolachlor	Behandlung im Nachauflauf ab dem 2-Blattstadium der Kultur im Split-Verfahren nach einer Vorauflaufbehandlung mit anderen im Chicoréeanbau bewilligten Herbiziden. Total bewilligte Aufwandmenge: 13 ml. 1. Behandlung im 2-Blattstadium der Kultur mit 3 ml. 2. und 3. Behandlung im 4- und 6-Blattstadium mit je 5 ml.

Legende: VA: Vorauflauf
NA: Nachauflauf
VP: vor Pflanzung
NP nach Pflanzung
* Wartefrist durch die Anwendungsbestimmungen definiert.

Blattherbizide

Kultur							Wartefrist	Handelspräparate (Firma)	Wirkstoffe	Aufwandmenge (pro Are) Anwendungshinweise
Salate gesät	Salate gepflanzt	Baby-Leaf (Asteraceen)	Chicorée	Schwarzwurzel	Topinambur	Kardy				
			NA			NP	NP	*	Basta (Bayer, Omya)	Glufosinat Einsatz von 30 ml je Are effektiv behandelte Fläche zum Abbrennen von aufgelaufenen Unkräutern im Zwischenreihenbereich. Die Kultur darf nicht getroffen werden, Anwendung unter Abschirmung. Chicorée: maximal 1 Behandlung pro Kultur. Artischocke und Kardy: keine Anwendung nach Blühbeginn; maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
			NA					*	Debut (Stähler)	Triflursulfuron-methyl Bewilligte Aufwandmenge: 0.3 g ab dem 2-Blattstadium der Kultur. Maximal 2 Behandlungen im Abstand von 7 – 10 Tagen. Unterschiedliche Sortenempfindlichkeiten beachten! In Ergänzung zu anderen im Chicoréeanbau bewilligten Herbiziden haben Aufwandmengen von 0.1 g je Splitbehandlung eine gute Unkrautwirkung.
NA	NP	NA		NA		NP		6 / 8 Wo	Fusilade Max (Syngenta)	Fluazifop-P-butyl Salate (ohne Löwenzahn): 15 ml gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide. Anwendung spätestens bis zur beginnenden Kopfbildung; Wartefrist 6 Wochen. Endivien: 15 ml gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide, 30 ml gegen mehrjährige Ungräser. Anwendung Nachauflauf bzw. nach der Pflanzung, spätestens bis zur beginnenden Kopfbildung; Wartefrist 6 Wochen. Kardy: 15 ml gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide. Anwendung Nachauflauf im 2-3 Blattstadium der Ungräser. Wartefrist 6 Wochen. Schwarzwurzel: 15 ml gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide, 30 ml gegen mehrjährige Ungräser. Wartefrist 8 Wochen.
			NA	NA				8 Wo	Gallant 535 (Omya)	Haloxypop-R-Methylester Einjährige Ungräser: 3 – 4 ml Einjähriges Rispengras: 12 – 15 ml. Anwendung im 2- bis 3-Blattstadium. Mehrjährige Ungräser: 9 ml.
			NA	NA				8 Wo	Agil (Syngenta) Propaq (Schneider) Obsidio Rex (Renovita)	Propaquizafop Einjährige Ungräser: 10 ml

Legende: VA: Vorauf
NA: Nachauflauf
VP: vor Pflanzung
NP nach Pflanzung
* Wartefrist durch die Anwendungsbestimmungen definiert.

Kultur							Wartefrist	Handelspräparate (Firma)	Wirkstoffe	Aufwandmenge (pro Are) Anwendungshinweise
Salate gesät	Salate gepflanzt	Baby-Leaf (Asteraceen)	Chicorée	Schwarzwurzel	Topinambur	Kardy				
			NA					8 Wo	Targa Super (Bayer)	Quizalofop-P-ethyl Einjährige Ungräser, Ausfallgetreide: 7.5 – 12.5 ml
				NA	NA			4 Wo	Aramo (Leu+Gygax)	Ungräser: 10 – 20 ml. Höhere Aufwandmenge gegen einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide und Gemeine Quecke. Maximal 1 Anwendung pro Jahr.

Legende: VA: Voraufbau
NA: Nachaufbau
VP: vor Pflanzung
NP: nach Pflanzung
* Wartefrist durch die Anwendungsbestimmungen definiert.

Impressum

Herausgeber: Agroscope
Schloss 1, Postfach
8820 Wädenswil
www.agroscope.ch

Redaktion: Martina Keller

Gestaltung: Brigitte Baur

Copyright: Agroscope

Version: April 2014

Auskünfte: www.gemuesebau.agroscope.ch

ISSN: 2296-7214
