Omologazioni dei prodotti fitosanitari aggiornamento 1/2015

Gennaio 2015

Extension Orticoltura

Con il riesame mirato del 2014 di prodotti fitosanitari omologati molte indicazioni e condizioni sono state adattate. Una panoramica delle sostanze attive verificate e le conseguenti modifiche per l'orticoltura, come pure la data delle modifiche è consultabile sulla homepage dell'UFAG http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/01867/index.html?lang=it nel documento «Programma di riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati (riesame mirato)». È presente anche una lista relativa alle sostanze attive verificate nel 2013.

Indicazioni dettagliate sull'applicazione dei prodotti fitosanitari qui elencati sono disponibili su DATAphyto, la banca dati dei prodotti fitosanitari per l'orticoltura (www.dataphyto.agroscope.ch), oppure nell'indice fitosanitario dell'UFAG (http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de).

Nel corso dell'aggiornamento del DATAphyto sono stati adattati a quelle dell'UFAG le definizioni colturali per le cipolle. Le tipologie delle cipolle sono da ora così definite: Cipolla a mazzi, cipolla da consumo, e cipolla dolce spagnola (finora cipolla piantata d con cipolline, cipolla seminata, e cipolla trapiantata). Se si cercano prodotti omologati per tutte le cipolle, compresi quelli che non omologati per le cipolle a mazzi (cipollotte), il termine per la ricerca corretto è «cipolla da consumo», e non «cipolle (tutte)».

Insetticidi: nuove indicazioni

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Audienz (Omya, W 6020)	Spinosad (44.2 %)	Aglio, scalogno: tripidi Erbe aromatiche: coleotteri fogliari
Applaud (Omya, W 4156)	Buprofezina (25 %)	Peperonici (serra): cicaline, mosca bianca
Kanemite (Stähler, W 6632) ***Capito Milben-Stop*** (Stähler, W 6632-1)	Acequinocyl (15.8 %)	Pomodori, cetrioli, melanzane (serra): acari
Parexan N (Omya, W 5959)	Piretrina (47.5 %) + olio di sesamo raff. (20 %)	Cicoria belga: acari predatori durante la forzatura.
Fury 10 EW (Omya, W 5953)	Zeta-Cipermetrina (9.6 %)	Pastinaca, prezzemolo tuberoso: mosca della carota
Fastac Perlen (Leu+Gygax, W 5702)	Alpha-Cipermetrina (15 %)	Pastinaca, prezzemolo tuberoso: mosca della carota

Agroscope gutes Essen, gesunde Umwelt

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Agroscope

Insetticidi: nuove indicazioni (seguito)

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Gazelle SG (Stähler, W 6581)	Acetamiprida (20 %)	Brassicacee in campo aperto: afide ceroso delle brassicacee Peperoncini (serra): afidi, mosche bianche
Cypermétrine (Médol, W 4491) ***Cypermethrin*** (Sintagro, W 4343) ***Cypermethrin S*** (Schneiter, W 4976) ***Cypermethrin*** (Omya, W 4774)	Cipermetrina (10–11 %)	Pastinaca, prezzemolo tuberoso: mosca della carota
Decis (Omya, W2372) ***Deltamethrin*** (Sintagro, W 6319) ***Decis Protech*** (Bayer, W 6381)	Deltametrina	Pastinaca, prezzemolo tuberoso: mosca della carota
Karate Zeon (Syngenta, W 6098) ***Kendo*** (Syngenta, W 6098-1) ***Ravane 50*** (Schneiter, W 6382) ***Kaiso EG*** (Nufarm, W 6953) ***TAK 50 EG*** (Stähler, W 6953-1)	Lambda-Cialotrina	Finocchio, pastinaca, prezzemolo tuberoso: mosca della carota
Techno (Leu+Gygax, W 6998)	Lambda-Cialotrina (4.81%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Ravane 50 (Schneiter)
Format (Leu+Gygax, W 6701-2	Dimetoato (37.7%)	Indicazioni omologate sono analoge a quelle per Danadim Progress (Stähler).
Affirm (Syngenta, W 6748)	Emamectin-benzoato (0.95 %)	Cavoli da foglia, cappuccio,cavolfiore, cavolino di Bruxelles: nottue, tignola del cavolo, cavolaia Cucurbitacee: nottue Pomodori: tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*)

Insetticidi (modifiche dopo il riesame mirato)

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Lannate 25 WP (DuPont, Leu+Gygax, W 1752) ***Methomyl LG*** (Leu+Gygax, W 4413) ***Methomyl 25 WP*** (Omya, W 2993)	Methomyl (25 %)	**Per molte colture l'omologazione è stata revocata** Lattughe, spinacio, coste: omologazione solo per colture in serra Piselli, fagiolini: autorizzati solo 2 trattamenti per coltura Per le rimanenti colture, i dosaggio è stato ridotto oppure per molte è definito il momento dell'applicazione.
Pirimor (Syngenta, W 1899) (Stähler W1899-1) (Leu+Gygax, W 5105) ***Pirimicarb*** (Omya, W 4541) ***Pirimicarb 50 WG*** (Sintagro, W 4665) (Burri, W 5339) (Schneiter, W 4367)	Pirimicarb (50 %)	**Omologazione contro afidi non è più valida per l'orticoltura in generale. Si invita a informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** Asparago, rabarbaro: solamente per un trattamento post-raccolta. Insalate (Asteraceae): trattamento delle piantine contro l'afide delle radici dell'insalata solo in serra da giugno ad agosto, termine d'attesa 6 settimane. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.
Cypermethrin (Omya, W 4774) (Sintagro, W 4343) ***Cypermétrine*** (Médol, W 4491) ***Cypermethrin S*** (Schneiter, W 4976)	Cipermetrina (10–11 %)	**Le omologazioni contro altiche e sminturi non sono più valide per l'orticoltura in generale. Si invita a informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** **Brassicacee: applicazione contro il meligete della colza proibita dopo il 6.11.2016, in seguito alla revoca dell'omologazione.** Lotta contro la mosca della carota: trattare solamente durante il volo (a dipendenza del numero critico di catture) con intervalli di almeno 7 giorni. Asparago, rabarbaro: solamente interventi post-raccolta. Il dosaggio d'applicazione è stato dimezzato per tutte le colture. Con questo prodotto, oppure con un altro contenente la stessa sostanza attiva massimo 2 trattamenti per coltura, eccezion fatta per la lotta contro la mosca della carota. Nuove direttive per la protezione delle api. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.
Fury 10 EW (Omya, W 5953)	Zeta-Cipermetrina (9.6 %)	**L'omologazione contro altiche e sminturi non sono più valide per l'orticoltura in generale. Si invita ai informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** Asparago, rabarbaro: solo interventi post-raccolta. Lotta contro la mosca della carota: trattare solamente durante il volo (a dipendenza del numero critico di catture) con intervalli di almeno 7 giorni. Il dosaggio d'applicazione è stato ridotto nella maggior parte delle colture. Con questo prodotto, oppure con un altro contenente la stessa sostanza attiva massimo 2 trattamenti per coltura, eccezion fatta per i piselli contro la sitona del pisello (max. 1 trattamento) e per la lotta contro la mosca della carota. Nuove direttive per la protezione delle api. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.

Insetticidi (modifiche dopo il riesame mirato)

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Fastac Perlen (Leu+Gygax, W 5702)	Alpha-Cipermetrina (15 %)	**Omologazione contro altiche e nottue non è più valida per l'orticoltura in generale. Si invita a informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** Asparago, rabarbaro: solo interventi post-raccolta. Lotta contro la mosca della carota: trattare solamente durante il volo (a dipendenza del numero di catture critico) con intervalli di almeno 7 giorni. Con questo prodotto, oppure con un altro contenente la stessa sostanza attiva massimo 2 trattamenti per coltura, eccezion fatta per piselli contro la sitona del pisello (max. 1 trattamento) e per la lotta contro la mosca della carota. Nuove direttive per la protezione delle api. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza con le acque di superficie e biotopi.
Decis (Omya, W 2372) ***Deltamethrin*** (Sintagro, W 6319) ***Decis Protech*** (Bayer, W 6381)	Deltamethrin	**Omologazione contro altiche e nottue non è più valida per l'orticoltura in generale. Si invita a informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** Quantità d'applicazione contro mosca bianca in serra è stata ridotta della metà. Asparago, rabarbaro: solo interventi post-raccolta. Cavoli da foglia: il dosaggio d'applicazione contro le nottue è stata ridotta. Nuove direttive per la protezione delle api. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza con le acque di superficie.
Karate Zeon (Syngenta, W 6098) ***Kendo*** (Syngenta, W 6098-1) ***Ravane 50*** (Schneiter, W 6382) ***Kaiso EG*** (Nufarm, W 6953) ***TAK 50 EG*** (Stähler, W 6953-1)	Lambda - Cyhalothrin	**Omologazione contro altiche e nottue non è più valida per l'orticoltura in generale. Si invita a informarsi riguardo omologazioni per le diverse colture orticole, il numero massimo d'interventi e i termini d'attesa consultando DATAphyto oppure attraverso la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG.** Asparago: solo interventi post-raccolta
Prodotti (ditta)	**Sostanze attive**	**Nuove indicazioni / annotazioni**
Gazelle SG (Stähler, W 6581))	Acetamiprid (20 %)	Cetrioli (campo aperto), porro, cipolle: Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie. Insalate (Asteraceae), porro, cipolle: massimo 2 trattamenti per parcella e anno con prodotti dello stesso gruppo di sostanze attive.
Gaucho (Bayer, W 5110)	Imidacloprid (70 %)	**Cipolle a mazzi (cipollotte): applicazione proibita dopo il 7.11.2016.** Cipolle e cipolle dolci, porro: solo per la produzione di piantine per colture piantate.

Fungicidi: nuove indicazioni

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Fezan (Sipcam, W 6589) (Stähler, W 6589-2) ***Ethosan*** (Omya, W 6589-3)	Tebuconazolo (24.2%)	piselli: antracnosi del pisello
Horizont 250 EW (Bayer, W 5468)	Tebuconazolo (25.8 %)	**L'omologazionesulle colture orticole è stata revocata a eccezione di quella su piselli.** Piselli: marciume grigio, antracnosi
Moon Experience (Bayer, W 6856)	Tebuconazolo (17.6 %) + Fluopiram (17.6 %)	Cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolino di Bruxelles (campo aperto): Micosferella del cavolo
Signum (BASF, W 6994)	Boscalid (26.7 %) + Piraclostrobina (6.7 %)	Melanzana: oidio, marciume grigio Broccoletti (campo aperto): Alternaria Cicoria belga (campo aperto): Alternaria, oidio, ruggine Carota (campo aperto): Alternaria, oidio
Amistar (Syngenta, W 5481) (Stähler, W 5481-2) ***Hortosan*** (Syngenta, W 5481-1) ***Ortiva*** (Syngenta, W 5481-3)	Azoxistrobina (22.9 %)	Costa: macchie fogliari da Cercospora e Ramularia
Slick (Syngenta) ***Bogard*** (L+G, W 5056-1) ***Slick*** (Stähler W 5056) ***Sico*** (Bayer W 5056-3)	Difenoconazolo (24.8 %)	Erbe aromatiche, pastinaca, rabarbaro: macchie fogliari Cicoria belga (produzione della radice): Alternaria, oidio, ruggine (Puccinia) Zucchina, patisson, Rondini: termine d'**attesa** ridotto a **3 giorni**.
Virexa (Leu+Gygax, W 6523-1) ***Sandora*** (Omya, W 6523-2	Mancozeb (60%) + Mandipropamid (5%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Revus MZ (Syngenta).
Bonita (Leu+Gygax, W 6978)	Mancozeb (34.3%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Mancozeb liquido (Schneiter)
Daco 500 (Stähler, W 2831-2)	Chlorothalonil (40.65 %)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Rover (Stähler).

Fungicidi: (modifiche dopo il riesame mirato)

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Fezan (Sipcam, W 6589) (Stähler, W 6589-2) ***Ethosan*** (Omya, W 6589-3)	Tebuconazole (24.2%)	Carote: quantità massima d'applicazione è stata ridotta a 0.6 l/ha. Massimo 3 trattamenti per coltura con questo prodotto o con un altro contenente la stessa sostanza attiva, rispettando un intervallo di 2-3 settimane Asparago, fagioli, piselli: massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o con un altro contenente la stessa sostanza attiva. Asparago: dosaggio massimo d'applicazione ridotto a 1 l/ha. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.
Horizont 250 EW (Syngenta, W 5468)	Tebuconazolo (25.8 %)	**L'omologazione per l'uso di è stato revocata per l'orticoltura con eccezione di quella per i piselli.** Piselli: Max. 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o con un altro contenente la stessa sostanza attiva.
Moon Experience (Bayer, W 6357)	Tebuconazolo (17.6 %) + Fluopyram (17.6 %)	**Cavolo rapa: applicazione proibita dopo il 16.9.2016 in seguito alla revoca dell'omologazione.** Porro (campo aperto): massimo 1 trattamento per coltura con questo prodotto. Complessivamente non più di tre interventi o con un prodotto contenente la sostanza attiva tebuconazolo. Cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carote (campo aperto): massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto. Complessivamente non più di 3 interventi con un prodotto contenente la sostanza attiva tebuconazolo.
Nativo (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo (50 %) + Trifloxistrobina (25 %)	Cavolfiori: masimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o con un altro contenente la sostanza attiva Tebuconazolo. Tutte le altre colture: massimo 3 trattamenti per coltura con questo prodotto o con un altro contenente la sostanza attiva Tebuconazolo. Cicoria belga: termine d'attesa 3 settimane. cetrioli per sottaceto, patisson, rondini, zucchina, meloni, zucche, zucche oleifere, angurie (campo aperto), carote: il dosaggio è stato ridotto. Melanzane, cetrioli, peperoni, pomodori (serrail dosaggio è stato ridotto. Porro: Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie. Asparago: applicazione: giovani colture non in produzione e colture in produzione a raccolta terminata, massimo. 3 trattamenti per parcella e anno con questo prodotto o con un altro contenente la sostanza attiva Tebuconazolo. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.
Ibiza SC (Schneiter, W 6601) ***Mapro*** (Syngenta, W 6782) ***Zignal*** (Stähler, W 6747)	Fluazinam	Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.
Proplant (Agriphar, W 5609)	Propamocarb-hydrochlorid (66.5%)	**Per l'orticoltura non è più valida l'omologazione generale. Nuovo: il trattamento di semente, semine, terricci di semina e piantine contro malattie del vivaio è autorizzato solamente in serra per lattughe e cetrioli.** Lattughe: nuovo: max. 2 trattamenti per coltura.

Fungicidi: altre modifiche

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Armicarb (Stähler, W 6432)	Bicarbonato di potassio (85 %)	Cetrioli, pomodori: quantità massima d'applicazione ridotta a 0.3 % (3 kg/ha).
Mancozeb 75 WG (Sintagro, W 5398)	Mancozeb (75 %)	Orticoltura in generale: applicazioni contro malattie del suolo fino allo stadio 12 (BBCH). Brassicacee: applicazione contro la peronospora allo stadio 11-16 (BBCH).

Erbicidi: nuove indicazioni e modifiche dopo la verifica mirata

Prodotti (ditta)	Sostanze attive	Nuove indicazioni / annotazioni
Kusak (Omya, W 4931)	Bentazone (40 %)	Mais dolce: malerbe annuali
Callisto (Syngenta, W 6003)	Mesotrione (9.1 %)	Mais dolce: malerbe a foglia larga e graminacee
Golaprex Basic (Stähler, W 6168-2)	Prosulfocarb (78.4 %)	Cipolle: malerbe a foglia larga e graminacee annuali
Spectrum (Stähler, W 6075-1)	Dimetenamid-P (64 %)	Fagioli con baccello: malerbe a foglia larga e graminacee annuali
Barala (Omya, W 6523-2)	Diquat (17 %)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Reglone (Syngenta).
Agil (Leu+Gygax, W 6969)	Propaquizafop (9.6%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Agil (Syngenta), in aggiunta: Fagiolini con baccello: malerbe annuali a foglia larga
Pyrazon (Leu+Gygax, W 7001)	Cloridazono (65%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Pyramin DF (Leu+Gygax)
Lentagran (Leu+Gygax, W 6855)	Pyridate (45%)	Indicazioni omologate analoghe a quelle per Pyridate 45 WP (Schneiter)
Bandur (Bayer, W 6149)	Aclonifen (49.6%)	Lenticchie: malerbe a foglia larga e graminacee annuali Piselli, aglio piantate, cipolle da cipolline, scalogno piantato: quantità massima d'applicazione ridotta a 4 l/ha. Nuove direttive relative alle distanze di sicurezza dalle acque di superficie.

Sostanze attive e prodotti la cui verifica è conclusa

Le sostanze attive qui elencate sono state verificate e le loro indicazioni adattate. Stellen Sie deshalb vor dem Einsatz dieser Pflanzenschutzmittel sicher, dass Ihre Unterlagen zur korrekten Anwendung der Produkte aktuell sind.
Agroscope übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit der nachfolgenden Liste.

Fungicidi

Sostanza attiva	Prodotti	Ditta	Numero W
Cyprodinil	Switch	Syngenta	5218
	Play	Syngenta	5218-1
Cymoxanil	Cymoxanil WG	Schneiter	6693
	Remiltine pépite	Syngenta	4713
	Mancozeb-Cymox	Schneiter	5747
	Mancozeb Combi	Sintagro	5207
	Curzate M WG	Omya, DuPont	6425
Dimetomorf	Forum	Leu+Gygax	5602
	Acrobat MZ WG	Syngenta	5210
Fluazinam	Ibiza SC	Schneiter	6601
	Mapro	ISK, Syngenta	6782
	Zignal	Stähler	6747
Fosetil-Al	Aliette WG	Bayer	6325
	Alial 80 WG	Stähler	6754
Propamocarb	Previcur Engery	Bayer	6357
	Previcur N	Syngenta	2479
	Plüssol A	Omya	5927
	Proplant	Agriphar	5609
Protioconazole	Fandango	Bayer, Stähler	6508
Zolfo	Thiovit Jet	Syngenta	18
	Sufralo	Stähler	18-1
	Capito Bio-Schwefel	Stähler	18-2
	Solfovit WG	Bayer	4458-1
	Fluidosoufre	Fénaco	2671
	und weitere	Und weitere	Und weitere
Tebuconazolo	Nativo	Bayer	6588
	Fezan	Sipcam, Stähler	6589, 6589-2
	Ethosan	Omya	6589-3
	Horizont 250 EW	Syngenta	5468
	Moon Experience	Bayer	6357

Erbicidi

Sostanza attiva	Prodotti	Ditta	Numero W
Aclonifen	Bandur	Bayer, Syngenta	6149
Cloridazon	Pyramin DF	Leu+Gygax, BASF	5163, 2937
	Chloridazon 65 WG	Schneiter	6745
	Chloridazon DF	Stähler	5039
	Jumper	Omya	6288
	Chloridazon 65	Sintagro	5196
	Ravel fluid	Burri	2482
	Chloridazon 430 SC	Agrichem	6276
Glufosinate	Basta	Bayer	6261
	Basta	Omya	2772
Ioxinil	Topper	Omya	2845
	Fortuna	Omya	6324
Metamitron	Bettix triple	Stähler	6288
	Sugaro trio	Syngenta	6288-1
	Mentor Star	Omya	4845
	e altri	e altre	
Metazaclor	Butisan S	Leu+Gygax, BASF	5064, 2592
	Bredola	Omya	6643
	Rapsan 500 SC	Schneiter	6349
	Devrinol Plus	Stähler	2808
Napropamide	Nikkel	Omya	4786
	Devrinol Plus	Stähler	2808
Prosulfocarb	Boxer	Syngenta , Bayer	6168

Insetticidi

Sostanza attiva	Prodotti	Ditta	Numero W
Acetamiprid	Gazelle SG	Stähler	5947
Alfa-Cipermetrina	Fastac Perlen	Leu+Gygax	5702
Bifentrin	Talstar SC	Stähler	6043
Cipermetrina	Cypermétrine	Médol	4491
	Cypermethrin S	Schneiter	4976
	Cypermethrin	Omya, Sintagro	4774, 4343
Deltametrina	Decis	Omya	2372
	Deltamethrin	Sintagro	6319
	Decis Protech	Bayer	6381
Imidacloprid	Gaucho	Bayer	5110
Indoxacarb	Steward	Stähler	
Lambda-Cialotrina	Karate Zeon	Syngenta	6098
	Kendo	Syngenta	6098-1
	Ravane 50	Schneiter	6382
	Kaiso EG	Nufarm	6953
	TAK 50 EG	Stähler	6953-1
Metomil	Lannate 25 WP	DuPont, Leu + Gygax	1752
	Methomyl 25 WP	Omya	2993
	Methomyl LG	Leu + Gygax	4413
Pirimicarb	Pirimicarb	Omya	4541
	Pirimicarb 50 WG	Schneiter, Sintagro, Burri, Amreco	4367, 4665, 5339, 5171
	Pirimor	Syngenta, Stähler, Leu+Gygax	1899, 1899, 5105
Spiridiclofen	Envidor	Bayer	6155
Tiacloprid	Biscaya	Bayer	6401
Tiametoxam	Actara	Syngenta	6192
	Cruiser	Syngenta	6195
Zeta-Cipermetrina	Fury 10 EW	Omya	5953

Il periodo concesso per l'utilizzo di diversi prodotti scade nel 2015

Nella seguente tabella sono riassunti i prodotti per i quali l'omologazione è stata revocata e il conseguente periodo concesso per l'utilizzo delle scorte scadrà nel 2015.
Agroscope non assicura la completezza della seguente lista:

Prodotto	Numero W	Sostanza attiva	Da utilizzare entro il
Trifluralin (Omya) Trifluralin S (Schneiter)	W 2015 W 4529	Trifluralin	01.02.2015
Agrichem Cloridazon 430 SC (Agrichem)	W 6276	Cloridazon	10.10.2015
Agrichem Etofumesate 200 EC (Agrichem)	W 6621	Etofumesate	10.10.2015
Agrichem Glifosato 360 SL (Agrichem)	W 6334	Glifosato	23.10.2015
Fluidosoufre (fenaco)	W 2671	zolfo	07.11.2015
Agrichem Fenmedifam 160 EC (Agrichem)	W 6331	Fenmedifam	17.12.2015
Mission (Agrichem)	W 6442	Diquat	17.12.2015
Mission (Agrichem)	W 6442	Diquat	17.12.2015
Metriphar 70 WG (Agrichem)	W 5737	Metribuzin	17.12.2015
FZB24 WG (Bayer)	W 6006	Bacillus subtilis	31.12.2015

Sigla editoriale

Editore: Agroscope
Schloss 1, Casella postale
8820 Wädenswil
www.agroscope.ch

Redazione: Brigitte Baur

Grafica: Brigitte Baur

Copyright: Agroscope