

# Nerolo

Disponible dès 2021



## Synonymes

En Suisse: aucun.

## Origine

Cépage obtenu à la Station de recherche Agroscope à Pully en 1995, à partir d'un croisement entre Nebbiolo et Gamaret (code de sélection MRAC 1817).

## Phénologie

**Débourrement:** précoce.

**Maturité:** 2<sup>e</sup> époque, entre Merlot et Cabernet franc.

Profite avantageusement de vendanges retardées, qui améliorent la structure, la qualité des tannins ainsi que la complexité des vins.

## Importance et répartition

En raison de son homologation très récente (2017), ce cépage n'est pour l'instant présent qu'en Suisse, dans le cadre d'un réseau de parcelles expérimentales.

## Aptitudes culturales et agronomiques

**Caractères végétatifs:** vigueur moyenne. Port érigé, entre-nœuds longs.

**Potentiel de production:** moyen, peu productif sur les yeux de base, grappes de dimension moyenne.

**Maladies, ravageurs, carences, accidents physiologiques:** sensibilité extrêmement faible à la pourriture (au moins comme Gamaret).

**Terroirs de prédilection:** une bonne maturation du raisin nécessite de bonnes zones viticoles où le Merlot arrive régulièrement à maturité; la plasticité d'adaptation de ce cépage reste malgré tout assez large.

## Potentiel œnologique

**Moût:** neutre, sucré avec une acidité assez soutenue.

**Vin:** très structuré à l'attaque souple et vineuse, tannins très présents, charpentés et fermes. Bon potentiel de garde. Bouquet complexe de fruits rouges (cerise, eau de vie de framboise), notes épicées de poivre et mentholées, caractère empyreumatique (cuir, café).

## Extrémité du rameau

**Ouverture:** complètement ouverte

**Pigmentation anthocyanique:** nulle à très faible

**Densité des poils couchés:** forte



## Feuille adulte

**Forme du limbe:** orbiculaire

**Nombre de lobes:** 5

**Couleur de la face supérieure:** vert moyen

**Pigmentation des nervures:** nulle à très faible

**Cloûre:** moyenne

**Forme des dents:** mélange de côtés rectilignes et convexes

**Ouverture du sinus pétiolaire:** demi-ouvert

**Densité des poils couchés (face inférieure):** nulle à très faible

**Densité des poils dressés des nervures (face inférieure):** nulle à très faible

## Jeune feuille

**Couleur (face supérieure):** vert

**Densité des poils couchés (face inférieure):** moyenne



Face supérieure



Face inférieure

## Rameau

**Couleur de la face dorsale:** vert et rouge

**Couleur de la face ventrale:** vert




Face dorsale



Face ventrale

Echelle en cm  
0  
5  
10  
15  
20  
25



Face inférieure

Echelle en cm  
0  
5  
10  
15  
20  
25



Baie de référence  
Chasselas



## Grappe

**Longueur:** petite

**Compacité:** compacte

**Pédoncule:** court

**Forme:** conique

**Nombre d'ailes:** 0-1

## Baie

**Longueur:** courte

**Forme:** sphérique

**Couleur de l'épiderme:**

bleu-noir

**Intensité de la couleur**

**de la pulpe:** nulle à très faible